

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-127
2014 წლის 2 ივლისი

ქ. თბილისი

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებით (ვებგვერდი, 30/10/2013, სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.032.016125) დამტკიცებულ „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგში“, დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მინისტრი

შალვა ფიფია

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგ“-ის:

1. პირველ მუხლს დაემატოს 40¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„40¹. კს - კაპსულირებული სუსპენზია“.

2. მე-2 მუხლის:

ა) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) დაემატოს 9¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

9 ¹ .	ამპლიფი 150, მკს 150 გ/ლ (ქლორანტრაილიპროლი 100 გ/ლ+ლაზმბა- ციგლოტრინი 50გ/ლ) (თ), (1) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1022	0.3-0.4	თესლოვნები	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი ქერცლფრთიანი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას) ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	25 (3-4)	10(4)
		0.3-04	კურკოვნები	„	„	25 (2-3)	10(4)



		0.3-0.4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	25(2-3)	10(4)
					ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა		
		0.4- 0.6	თხილი კაკალი	თხილის ნაყოფჭამია ვაშლის ნაყოფჭამია ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	25(2-3)	10(4)
					ხარჯვა-1000-1700 ლ/ჰა		
		0.25-0.4	ბოსტნეული (პამიდორი, წიწაკა, კომბოსტო)	კოლორადოს ხოჭო ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნებლის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	25(2)	10(4)
					ხარჯვა-500-800 ლ/ჰა		
		0.25 -0.4	სიმინდი	შვედური ბუზი სიმინდის ფარვანა შემოდგომის ნათესების ხვატარი ბამბის ხვატარი	„	25(2)	10(4)
		0.2-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500 ლ/ჰა	25(2-3)	10(4)
		0.2-0.3	კომბოსტო	კომბოსტოს თეთრულა ხვატრები	„	25(2)	10(4)

გ) 28-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28.	გრანდი 5, ეკ 50 გ/ლ (ლაზბდა- ციპალატრინი) (თ), (1) “ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ” ჩინეთი 618/14	0.4-0.8	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ტკიპები, ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები		20(2)	10(4)
		0.1-0.2					



			კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.1	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		30 (1)	10(4)

დ) დაემატოს 28¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28 ¹ .	დეკარდი 25 ეკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1065	0.25- 0.5	ხორბალი, ქერი	მაცნე კუსებურა, ჭიანჭურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5-0.6	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(3)	-(3)
		0.15- 0.45	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა ბამბის ხვატარი		20(2)	7(3)
		0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
		0.2-0.3		კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.3-0.5	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლელები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.4-0.5	ბოსტნეული	მომღრღნელი ხვატარები		15(1)	7(3)
		1,0		კოლორადოს ხოჭო, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		
		0.5-1.0	ვამლი, მსხალი	ნაყოფაშიები, ბუგრები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფაშია		20(2)	7(3)
		0.4-0.5	თხილი	არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (1)	7(3)
		0,15- 0.45	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი ზეთისხილის ცხვიერგმელა		20(2)	7(3)



		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	15(1)	7(3)
		0.25-0.4	შაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)

ე) 29-ე და 30-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	დეტა 12,5 გვ 125 გ/ლ (დეტამეტრინი)						
29.	(თ), (2) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 619/13	0.1-0.14	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	-(-)
		0.05	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.03-0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.04	ლობიო, ბარდა	მეზარცვლები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.05-0.08	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.03-0.06		კოლორადოს ხოჭო			7(3)
		0.06	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები		20(2)	
		0.06-0.1	საძოვრები, კელური მცენარეულობა	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენისას	20(1)	7(3)
		0.06-0.1	ჯვარყვავილოვანი კულტურები	რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.05-0.07	ვაშლი	ნაყოფჭამიები ^ა ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ბუგრები		30(2)	7(3)
		0.12	მსხალი	მსხლის ფსილა		30(2)	7(3)
		0.1-0.15	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.06	სტაფილო	სტაფილოს ბუზი		20(1)	7(3)
		0.1	თამბაქო	ბუგრები		20(1)	7(3)
		0.1	იონჯა	ბაღლინჯო, ბუგრები, ცვირგრძელები		30(1)	7(3)
		0.1	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	



		0.05-0.1 0,1	საზამთრო ნესვი	მღრღნელები, ხვატრები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0.1	ჩაი	ჩაის ბუერი	შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი	-(2)	7(3)
		0.04-0.06	სამკურნა ლო მცენარეები (ასკილი, მაღაყურ ტენა, ლენცოფა, ლაგანდა, შმაგა, მრავალმა რღვა, ბაყაყურა, ბარამზო	ფოთლებისა და ღეროების მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
30.	დეტარინი 2,5 გგ 25გ/ლ (დეტამეტრინი) (თ), (2) "ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს." თურქეთი 601/13	0.25	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუერები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0.5-0.7	სიმინდი	ზამზის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2 0.15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)
		0.2	ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუერები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუერები, რწყილები		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	მაქრის ჭარხალი	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.4 0,5	საძოვრები	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები) (უფროსი ასაკის მატლები)		20(1)	7(3)
		0.3-0.5	ჯვარყვავილო- ვანი კულტურები	რწყილები		30(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუერები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)



		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.3	სტაფილო	სტაფილოს ზუზი		20(1)	7(3)
		0.5	თამბაქო	ბუგრები		20(1)	10(3)
		0.5-1.0	იონჯა	ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელეები, სქელფეხა		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფკამია		20(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		3-4	ჩაი	ჩაის ბუგრი	შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი	-(2)	7(3)
		0.2	ფიჭვი	ფიჭვის ქერქის ბაღლინჯო	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს. მოზარდეულის მე- 3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. თიხვას შეზღუდვა არ აქვს	-(1)	7(3)
		0.4-0.8	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მავნებლების კომპლექსი (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	7(3)

ვ) დამატოს 40¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

40 ¹ .	ეკო ოილ სპრეი, წზე 820 გ/ლ (პარაფინის მინერალური ზეთი 820 გ/ლ) „მაქტემიმ ქემიკალ ვორკს, მაი-ს წვერი“ ისრაელი 1064	18-24	ვაშლი, მსხალი, კომში	ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები, ცრუფარიანები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10 - 12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარ/ვა-1200 ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენება არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარ/ვა-1000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)	
		25-30						
		18-24	ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, ალუბალი, გარგარი	ფარიანები, ტკიპები, ფსილები, ბუგრები, რწყილები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10 - 12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარ/ვა-1200 ლ/ჰა შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარ/ვა-1000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)	
		25-30						
		10-15						



		15	ვაზი	ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები, რწყილები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარჯვა-800 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)	
		30-35	ციტრუსები	ფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები, ბუგრები, თრიფსების, მენადლე ჩრჩილების	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა -2000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)	
		18-24	ბურმა, მოცხარი	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების	შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა -1200 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)	
		25-30	კაკალი, თხილი, ნუში	ფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარჯვა -1000 ლ/ჰა			
		18-24	ზეთისხილი	ცრუფარიანები, ჩრჩილები	„	20(1-2)	7 (3)	

		12 -15	დეკორატიული მცენარეები, ტყის ჯიშები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით ხარჯვა -800-1000 ლ/ჰა	20(1-2)	7 (3)	
--	--	--------	-------------------------------------	-----------	--	---------	-------	--

ზ) დაემატოს 41¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

		0,3	პამიდორი, კიტრი	ბაღრის ბუერი ფრთათეთრა				
--	--	-----	-----------------	------------------------	--	--	--	--

ესააპე 20 ხგ



41 ¹ .	200 გ/კგ (აგეტამბირიდი) (თ), (3)	0,35	(ლია გრუნტი)	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
	“სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1052	0,15-0,3	პამიდორი, კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	3(1)	1(-)
		0,15	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ატმის ბუგრი		3(1)	1(-)
		0,15	საზამთრო	ატმის ბუგრი		10(1)	1(-)
		0,05-0,075	ხორბალი	ბაღლინჯი, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(-)
		0,15-0,35		პურის ზუზულა		14(1)	-(-)
		0,06 0,1-0,1.25	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჭიამაია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		2,4-3,0	ვამლი	მწვანე ბუგრი		25(1)	-(-)

თ) დავმატოს 43¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

43 ¹ .	ეფდალ დელმეტრინი 25 გკ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1010	0,25-0,35	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,5-0,7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი,		20(2)	-(3)



				სიმინდის ფარვანა			
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
		0.2		კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.3-0.4	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3-0.4	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები		20(2)	7(3)
		0.3-0.5	ჯვარყვავილო-ვანი კულტურები	რწყილები		30(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0.5	თხილი	არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (1)	7(3)
		0.6-0.9	ჩაი	ფოთლის მწუწნი მავნებლები		30(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0.5	თამბაქო	ბუგრები		20(1)	10(3)

ი) დამატოს 44¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

44 ¹ .	ეფდალ კიბეტრინი 25 გვ 250 გ/ლ (ციპერმეტრინი) (თ) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმე სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1053	0.35	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა გამზის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	-(3)
				ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		
		0.2-0.3	ხორბალი			20(2)	7(3)



		0,3-0.4	შაქრის კარხალი	მომღრღნელი ხვატრები მდელის ფარვანა ბუგრები		-(4)	7(3)
		0.2-0.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი ბუგრები	20(2)		7 (3)
		0.35	სოიო	მდელის ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია	20(2)	-(3)	
		0,4-0.5	მზესუმზირა	ხარაბუზა მზესუმზირას ალურა	20(2)	-(3)	
		0,2	კომბოსტო	თეთრულეები, ჩრჩილები, ხვატრები	25(3)	-(3)	
		1.2-1.6	ფრთათეთრა		3(2)	7(3)	
		0.8	კიტრი, პამიდორი	ბუგრები, თრიფსები			
			წიწაკა (დახურული გრუნტი)				
			სტაფილო	სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები			
		0.5			20(2)	-(3)	



კ) დავმატოს 49¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

49 ¹ .	ეფდალ ტბუსაი, სფ 200 გ/კგ (ტბუფენიარადი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1011	0,75-1,5		ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა ობობა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩენისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		1,2-1,5	მსხალი	მსხლის ფსილა	„	14 (2)	7(3)
		1,0	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვაზის ქერის ტკიპა	„	14 (2)	7(3)
		0,5-0,6	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)
		1,2-1,6	ციტრუსები	ტკიპები	„	20 (2)	7(3)
		0,5-1,0	ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა	ტკიპები	„	- (2-3)	7(3)

ლ) დავმატოს 56¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

56 ¹ .	ვერტიკალი 40 ვკ 400 გ/ლ (დიმეთიოატი) (1) „სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელური იმაღალტ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1056	1. 5-2,1	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და გრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფქამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილქამია, მსხლის ბაღლინჯო, მაყურა, პეწიანა	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ შესხურება ყვავილობამდე	30(2) 30(1)	10(4) 10(4)
		2,1	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, ადმოსავლური ნაყოფქამია, ტკიპები	შესხურება ყვავი- ლობის შემდეგ	30(1)	10(4)
		1,2	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)



		1.3		კოლორადოს ხოჭო			
		1.3-1.5	ხორბალი, ქვაყვი, ქერი, შვრია	მაგნე კუსებურა, ჭიჭურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბადლინჯოები	30(2)		10(4)
		0.8-1.1	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები	30(2)		10(4)
		0.8-1.2	შაქრის ჭარხალი სუფრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები	30(2)		10(4)
		1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები	30(1)		10(4)
		2.0-2.5	ვაზი	კოქციდები ტკიპები, ფოთლიზვევები,	30(2)		10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები	40(2)		10(4)
		1,8-2,25	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი, ბადლინჯო, ზეთისხილის ჭიჭინოზელა, ზეთისხილის ცხვირგრძელა, ზეთისხილის ხოჭო, ზეთისხილის ბუზი	21 (2)		10(4)
		0,8-1,0	დეკორატიული მცენარეები	ბუგრები ტკიპები	10(2)		10(4)
		0,6-0,8	ვარდი	ვარდის ბუგრი, ვარდის ხერხია	10(2)		10(4)

მ) დაემატოს 59¹ -59³ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

59 ¹ .	იაკუზა 20 სფ 200 გ/კგ (ტებუფენაირადი) (თ), (3) "სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ჯორჯიანი ჯორჯიანი იმალატ პარკი სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1054	0.45-06 0,35-0.45	ვაშლი	ზეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა ობობა ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩენისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		1,2-1.5	მსხალი	მსხლის ფსილა	„	14 (2)	7(3)



		0.5	ვაზი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ვაზის ქეჩის ტკიპა	„	14 (2)	7(3)	
		0.25-0.35	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)	
		0.5-0.8	ციტრუსები	ტკიპები	„	20 (2)	7(3)	
		0.35-0,4	ვარდი, მინაკი, ქრინანტემა	ტკიპები	„	- (2-3)	7(3)	
		0,35-0,4	ლობიო	წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (2)	7(3)	
		0.3	მარწყვი	კუნელის ტკიპა	„	10 (2)	7(3)	
59 ² .	იზოლდესისი 2,5 გგ 25გ/ლ (დელტამეტრინი) (თ), (2) „მეტროპოლექსია სან. ვე ტიპ. ლტდ სტი.“ თურქეთი 1074	0.25-0,35	ხორბალი, ქერი	მაგნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)	
		0.5-0.7	სიმინდი	ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა		20(2)	-(3)	
		0.25	მზესუმზირა	მდელოს ფარვანა, ბამბის ხვატარი		20(2)	7(3)	
		0.1-0.2 0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7(3)	
		0.3-0.4	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)	
		0.25-0.4	ბოსტნეული	მომღრღნელი ხვატრები, ბამბის ხვატარი, კოლორადოს ხოჭო ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები, თრიფსები, ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)	
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჰამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ხერხები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)	
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლიხვევიები		30(2)	7(3)	
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჰამია		20(2)	7(3)	



59 ³ .	იზოლატე 5 ეკ	0.2					
	50 გ/ლ (ლამბდაციგალოტრინი (თ), (1) „მეტროპოლიქიმია სან. ვე ტიკ- ლტდ სტი.“ თურქეთი 1075	0.15-0.2		პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინოზებლები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა, ცხვირგმელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0,25	ხორბალი, ქერი	პურის ბზუალა			
		0.25	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა, ხვატრები		30(1)	10(4)
		0.4-0.75	სოიო	ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ხვატრები		30(2)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მავნებელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.2-0.3		კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.15	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1-0.25	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)

5) დამატოს 63¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

63 ¹ .	ინსექტიციდი ქეი, ეკ (პარაფინის ზეთი 830 გ/ლ) “ინდუსტრიალ ქლიმიკა ქეი ს.ა.” ესპანეთი 1043	9--18	ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი ვაშლი, მსხალი	ფვარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები გრუფარიანები	შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1200-1800 ლ/ჰა პრეპარატის გამოყენება არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს	20(1-2)	7(3)
		10-15	ვაზი	ფვარიანები, ტკიპები, ბუგრები, გრუფარიანები	შესხურება ზამთრის ბოლომდე 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		20-37,5	ციტრუსები	ფვარიანები, ტკიპები, გრუფარიანები	შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე (1-2). ხარჯვა- 1200-2500 ლ/ჰა	20(1-2)	7(3)
				ფვარიანები, ტკიპების, ბუგრების	შესხურება შემოდგომიდან		



		25-30	კაკალი, თხილი, ნუში	და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები	ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		12-27	დეკორატიული მცენარეები	ფარიანები	შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით	20(1-2)	7(3)
		12-27	ზეთისხილი	კოკციდები		20(1-2)	7(3)

ო) დაემატოს 64¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

64 ¹ .	კავანა 5 ევ	0.2					
	50 გ/ლ	0.15-0.2		პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიკინოზები,			
	(ლამბდაციპლოტრინი			რწყილები, მანე კუსებურა, ბუგრები, ხერხები, ჭიანჭურბელა, ცხვირგრძელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
	(თ), (1) "სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალექტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1057	0,25	ხორბალი, ქერი	პურის ბზუალა			
		0.25	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა, ხვატრები		30(1)	10(4)
		0.4-0.75	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მანეზელთა კომპლექსი		20(2)	10(4)
		0,3	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი		20(1)	10(4)
		0,75	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა		30 (1-2)	10(4)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	10(4)
		0.2-0.3		კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.15	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		30(1)	10(4)
		0.1-0,25	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ბამბის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხოიარე ბალები, ქალაქის მწვანე ნარგავი, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევები, ტკიპები		30(2)	10(4)



		0,5	შაქრის ქარხნალი	ჭარხლის ფაროსანა		30(1)	10(4)

პ) 65-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	კაიზო, წზგრ						
	50 გ/კგ						
	(ლამზდა- ციჰალოტრინი)			ნაყოფჰამიეზი,			
65.	(თ), (1)	0.4-0.8	ვაშლი	ფოთლიზვევიეზი, ტკიპეზი,	შესხურემა ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2)	10(4)
	"ნუფარიმი გმზხ და კო კგ"			ვაშლის ყვავილჰამია			
	ავსტრია						
	597/13						
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიზვევიეზი, ტკიპეზი		30(2)	10(4)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კკოლორადოს ხოჰო		20(2)	10(4)
		0.1	ჰამიდორი	კოლორადოს ხოჰო		30 (1)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კკომბოსტოს ხვატარი,კომბოსტოს თეთრულა კომბოსტოს ჩრჩილი		30 (1)	10(4)
				ჰიჰინოზელეზი			
		0.2	ხორბალი, ქერი	ხორბლის ხოჰოეზი, თრიფსეზი, რწყილეზი, მავნე კუსეზულა, ბუგრეზი, ხერხიეზი, ჰიაწურბელა	შესხურემა ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	-(-)
		0.2	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(1)	10(4)
		0.4	სოიო	აბლაბუდიანი ტკიპა		30(1)	10(4)
		0.3-0.4	კურკოვნეზის და თესლოვნეზის სანერგეეზი	ფოთლიზვევიეზი, ბუგრეზი, ტკიპეზი		-(2)	10(4)
		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბაღეზი, ქალა-ჰის მწვანე ნარგაოზა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლეზი	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.1-0.15	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულე-ზის მიწეზი	კალიეზი (არაჯოგური ფორმეზი, ჯოგური ფორმეზის უმცროსი ასაკის მატლეზი)		30(1)	10(4)
				კალიეზი (ჯოგური ფორმეზი,			



		0.4		ზრდასრული მატლები და იმაგო)		30(1)	10(4)
			სამკურნალო მცენარეები				
		0.1-0.12	(ბელადონა (შმაგა)	კოლორადოს ხოჭო		20(1)	10(4)
		0.1-0.12	შავბალახა (სათესლე ნაკვეთები)	ჭიჭინოზები, ტკიპები		-(2)	10(4)
		0.1-0.15	ასკილი (ნერგები)	ცხვირგრძელები, ჭიჭინოზები, ტკიპები და სხვ.	შესხურება ნერგებზე	-(2)	10(4)
		0.15	ხბოშებლა	ცხვირგრძელები, რწყილები		-(1)	10(4)
		0.1-0.15	ალბური კრიალოსანა	ცხვირგრძელები, რწყილები		-(1)	10(4)
		0.4	ლავანდა	ჭიჭინოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	10(4)
		0.3	ხარისვარდა	ცხვირგრძელები		30(2)	10(4)
		2.5-5 მლ/მ2	წიწვოვან ბის მერქანი	მერქნის მავნებლების მატლების წინააღმდეგ	დამზადებულ მერქნის დამუშავება (მტაბელების)	-(1)	10(4)
		0.4 გ/მ2	ჩაუტვირთ ავი სასაწყობო შენობები და მარცვალ გადასამუ შავებელი მანქანა- ია რადები	მავნებლები შენახვის პერიოდში	შესხურება. ხარჭვის ნორმა 50 მლ 1 მ2-ზე. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მე-3 დღეს.	-(-)	-(-)
		0.8 გ/მ2	საწყობების და მარცვალ გადასამუ შავებელი საწარმოე ბის ტერიტორია		შესხურება. ხარჭვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(-)	3(3)

ჟ) დამატოს 68¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

68 ¹ .	კინძიუსი, უშშ 8 გ/ლ (ბეტა-ციპერმეტრინი (1)	1,5-2	სამორეზი, ველური მცენარეულობა	კალიები (უმცროსი სასასაკისასაკის მატლ ი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მასობრივი გამოჩენის პერიოდში	10(1)	7(3)
	“აგრო-ქემი კვტ” უნგრეთი 1021	2	”	კალიები (უმცროსი ასაკის)))))))მატლები)	”	10(1)	7(3)



--	--	--	--	--	--	--	--

კორაგენი, სკ	200 გ/ლ	(ქლორანტრანილიპროლი)	73 ¹ .	(თ)	0.15-0,3	ვაშლი , მსხალი	მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი ქერცლფრთიანი მაგნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მაგნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მაგნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	14 (2)	7(3)	
	„დუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ..“							ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა			
	შვეიცარია										
	1033										
					0.15-0,2	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მაგნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მაგნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	14(2)	7(3)	
								ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა			
					0,2-0,6	თხილი კაკალი	თხილის ნაყოფჭამია, ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მაგნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მაგნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	14(2)	7(3)	
								ხარჯვა-1000-1700 ლ/ჰა			
					0,25-0,55	ფოთლოვანი ბოსტნეული (არაგვარყვავილოვანი)	კომბოსტოს ჩრჩილი ბამბის ხვატარი, კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი, ქარხლის ალურა, თამბაქოს ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით მაგნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მაგნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)	14(2)	7(3)	
								ხარჯვა-400 ლ/ჰა			
					0,04-0,06	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა	14(2)	7(3)	
					0,04-0,06						
					0,10-0,15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა	14(2)	7(3)	

		0,15-0,4		ალურები				
		0,25-0,4	ნესვი, გოგრა, საზამთრო	ხვატარი კარადრინა, კომპოსტოს ხვატარი, ჭარხლის ალურა	„	7(2)	7(3)	
		0,4-0,5		ციცქნა- ჩრჩილები, თამბაქოს ფრთათეთრა				
		0,1-0,2	შხესუმზირა	მომღრნელი ხვატრები, შხესუმზირას ალურა მდელოს ფარვანა შხესუმზირას ხარბუზა შხესუმზირას ქაცვუზა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 200-700 ლ/ჰა	20(2)	7(3)	
		0,1 -0,2	სიმინდი	შვედური ბუზი სიმინდის ფარვანა შემოდგომის ნათესების ხვატარი ბამბის ხვატარი	„	7(2)	7(3)	
		0,25-0,4	სამკურნალო მცენარეები	ბამბის ხვატარი, ხვატარი კარადრინა, კომპოსტოს ხვატარი, ბალახის ხვატარი, სამხრეთის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა	14(2)	7(3)	

ს) 87-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ტ) 88-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

88.	მასაი, წხვ 200 გ/კგ (ტებუფენაირადი) (თ), (3) “ზასფი სე” გერმანია 589/13	0.375-0.5	ვაშლი	ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩენისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
-----	---	-----------	-------	-------------------------------------	--	--------	------



		0.25-0.375		ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა			
			ვაზი	ვაზის ქერის ტკიპა	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში	14 (2)	7(3)
		0.375-0.5					
		0.25-0.375	კიტრი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ტკიპები	ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში-	10 (2)	7(3)
		0.4	კიტრი პამიდორი (დახურული გრუნტი)	ტკიპები		5 (2)	7(3)
		0.6-0.8	ციტრუსები	ტკიპები		20 (2)	7(3)
		0.375	ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა	ტკიპები		- (2-3)	7(3)

უ) 92-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

92.	მიდაში, წხვ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 620/13	0,15-0,2	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყურძნის ჭიის მატლების მიმართ	30(2)	7(3)
		0.15-0.2	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია ვაშლის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფჭამიას მატლების მიმართ.	25(2)	7(3)
		0.1		კალიფორ ნიის ფარიანა, მენალზე ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	7(3)
		0.07-0.1	ატამი	აღმოსა ვლური ნაყოფჭამია ატმის ბუგრი		20(1-2)	7(3)
		0.2	ციტრუსები	ციტრუსო ვანტა ფრთათეთრა ნარინჯი		25(2-4)	7(3)



				სფერი (ჩაის) ბუგრი			
		0.06-0.08	პომიდორი კიტრი	ბამბის ხვატარი, Bზაღის ბუგრი		15(1)	7(3)
		0.04-0.05	საზამთრო	ბუგრები		20(1-2)	7(3)
		0.06-0.08	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	7(3)
		80-120 გ/მ2	მრავალწლიანი კულტურების სანერგეები			-(1)	30(30)

ფ) 95-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

95.	მოსეტამი 20 წზფ 200 გ/კგ (აცეტამიპრიდი) (თ), (3) " საფა ტარიმი ა.ს." თურქეთი 659/14	0.2	პამიდორი, კიტრი (ღია გრუნტი)	ბაღის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე	20(1)	1(-)
-----	--	-----	---	-------------	--	-------	------

		0.25		ბამბის ხვატარი		20(1)	1(-)
		0.15-0.3	პამიდორი, კიტრი (დახურული გრუნტი)	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(1)	1(-)
		0.05-0.075	ხორბალი	ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა	აღმონაცენის შესხურება	28(1)	-(1)
		0.15-0.35		პურის ბზუალა		14(1)	-(1)
		0.06	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14(1)	3(3)
		0.1-0.125		კარტოფილის ჭიამაია		14(1)	3(3)
		0.06-0.1	სამოვრები კალიებით დასახლებულ-ი მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეუ-ლობა	კალიები	შესხურება მავნეების მატლის განვითარების სტადიაში	28(1)	3(3)



ქ) 99-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

99.	ობერონი სკ 240	0.5		ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას 10 დღიანი ინტერვალთ	3(2-4)	7(3)
	240 გ/ლ		პამიდორი				
	(სპირომესიფენი)		კიტრი				
	“გაიერ კროპსაიენსი აგ”		წიწკა				
	გერმანია		ლობიო				
	648/14						
		0.5	საზამთრო, წესვი	ტკიპები		-(2-4)	7(3)
		0.5	მარწყვი	ტკიპები		-(2-4)	7(3)
		0.5	ხეხილი	ტკიპები		-(2-4)	

ღ) 107-ე და 108-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

107.	პიროელექტრა 48 ევ	2	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები		40 (2)	10(4)
	480 გ/ლ						
	(ქლორპირიფოსი)						
	(თ), (1)						
	“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”						
	ჩინეთი						
	621/14						
		1.5-2	ვაზი	ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (2)	7 (3)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	7 (3)
		2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		30 (2)	7 (3)
108.	პოლიგორი, ევ	1.1-1.9	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)
	400 გ/ლ						
	(დიმეთიატი)						
	(1)						
	“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”						
	თურქეთი						
	602/13						
		1.1-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნული (სათესლე	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები,		30(2)	13(4)



ყ) დამატოს 108¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:



		0.25	შესუშხირა	მდელოს ფარვანა		20(2)	7(3)
		0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20(2)	7(3)
		0.2		კარტოფილის ჩრჩილი			
		0.3-0.4	სოია, ლობიო, ბარდა	მემარცვლიები, ბუგრები , ხვატრები	შესხურება ყვავილობის დასაწყისში	20(1)	7(3)
		0.25-0.4	პამიდორი	მომღრღნელი ხვატარები კოლორადოს ხოჭო, ფრთათეთრა, ბუგრები, კოლოფთის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	7(3)
		0.3-0.4	კომბოსტო	ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები		20(2)	7(3)
		0.5-1.0	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ჩრჩილები,, ხერხიები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.4-0.6	ვაზი	ფოთლისხვეციები		30(2)	7(3)
		0.5	ატამი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია		20(2)	7(3)
		0.5	თხილი კაკალი	არაფარდი პარკიხვეცია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	7(3)
		0.4-0.45	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი ზეთისხილის ცრუფარანა		21(2)	7(3)
		0.6-0.9	ჩაი	ფოთლის მწუწნი მავნებლები		30(2)	7(3)
		0.25-0.5	საზამთრო, ნესვი	მომღრღნელი ხვატარები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე	-(1)	7(3)
		0.25	შაქრის ჭარხალი	ხვატრები, რწყილები, ფაროსანა, ცხვირგრძელა ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21 (1)	7(3)

შ) 109-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

109.	პრიზანი 4, ევ 480 გ/ლ (კლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 603/13	0.3 0.5	საძოვრები, არასასოფლო-	კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10 (4)
			სამეურნეო დანიშნულე-ბის სავარგულები	(უმცროსი ასაკის მატლები)			
				ნაყოფჭამიები,			



		2	ვაშლი	ლემიჭამიები, ფოთლიხვევები, ჩრჩილები, ფარიანები, ბუგრები, ტკიპები		40 (2)	10 (4)
		2	ატამი	ცრუფარიანები		60 (1)	10 (4)
		1.2-1.8	ვაზი	ყურძნის ჭია, ცრუფარიანები, ტკიპები		60 (2)	10 (4)
		2	ციტრუსები	ფარიანები ცრუფარიანები		40 (2)	10 (4)
		1.5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები		30 (2)	13 (4)
		2-2.5					
		1.5-2	შაქრის ქარხალი	ცხვირგრძელები, ხვატარები, ციცქნა, ფაროსნები მდელოს ფარვანა, რწყილები ბუგრი		30 (2)	- (4)
		0.8					
		1.5	იონჯა	ფიტონომუსი		25 (1)	10(4)

ჩ) 111-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

111.	პროპანტი 57 გვ 570 გ/ლ (პროპანტი) “ნაწილინგ ესსენც ფაინ- ქემიკლ კო ლტდ” ჩინეთი 622/14	1.2-1.8	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	7(3)
		3.0	ვაშლი			30(2)	7(3)
		1.6-2.4	ალუბალი, ბალი		შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(2)	7(3)
		4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	60(2)	

ც) 115-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

115.	რიგოპეტრინი 25, გვ 250 გ/ლ (გიპერპეტრინი) (თ) (1) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”	0.15 0.32	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
------	---	----------------------	---------	--	----------------------------------	-------	------



თურქეთი	604/13						
		0.2	ხორბალი	ბუგრები, მავნე კუსებულა, ქაწურბელა, რწყილები, თრიფსები		20(2)	7(3)
		0.4	შაქრის ქარხალი	მომდრდნელი ხვატრები		-(4)	7(3)
		0.15-0.2		მდელოს ფარვანა		20(1)	7(3)
		0.5	შაქრის ქარხალი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		-(4)	7(3)
		0.1-0.2		კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჭიამია			
		0.16	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი		20(2)	7 (3)
		0.5	კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)	ბუგრები		7(3)	-(3)
		0.35	სოიო	მდელოს ფარვანა სოიოს ნაყოფჭამია, შრავალჭამია ფოთოლჭამია		20(2)	-(3)
		0.15-0.25	ჯვარყვავი	რაფსის ყვავილჭამია		-(3)	-(3)
		0.15-0.2	რაფსი, მდოგვი	რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვან-თა რწყილები ბაღლინჯილები, თეთრულელები, ბუგრები		-(3)	7(3)
		0.16	კომბოსტო	თეთრულელები, ჩრჩილები, ხვატრები		25(3)	-(3)
		0.25	იონჯა	ფიტონომუსი		20(2)	2(-)
		1.2-1.6	პიტრი	ფრთათეთრა			
			პამიდორი			3(2)	7(3)
		0.65-0.8	წიწაკა (დახურული გრუნტი)	ბუგრები, თრიფსები			
		0.26-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები		25(3)	7(3)
		0.16-0.35	ვაშლი	ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები		25(3)	7(3)



		0.24-0.32	საზამთრო, ნესვი, პამიდორი	მომღრღნელი ხვატრები	შესხურება გაზაფხულზე	20(1)	7(3)
		0.06	ნესვი	ბახჩელის ჭიამია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
		0.5	სტაფილო	სტაფილოს ზუზი, ფოთლის რწყილები	„	20(2)	-(-)
		0.1	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	ოქროვდა, ფოთლის და წიწვის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს	-(1)	-(-)
		0.01-0.05	მუხა	არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევები, მზომელები		-(1)	1(1)
		0.05	ნაძვი	ჩვეულებრივი ნაძვის ხერხია		-(1)	1(1)
		0.08	ფიჭვი	ფიჭვის მეფისე		-(1)	1(1)
		0.016	ფიჭვი	ფიჭვის წითური ხერხია		-(1)	1(1)
		0.04	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)		-(1)	-(-)
		0.04-0.1	ფიჭვი	ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა	ნერგების შესხურება დარგვის წინ	-(1)	-(-)
		2-4 მლ/მ2	წიწვოვნები	მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები	შესხურება შტაბელუბად დაწყობილ მერქანზე	-(1)	-(-)
		3 მლ/მ2	ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები	მერქნის მავნებლები	ინიექცია ქერქის ქვეშ (ნაჩვენებია 1 მ2 ქერქის ზედაპირისათვის საჭირო დოზა)	-(1)	-(-)
		0.05-0.1	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	არაფარდი პარკხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები	მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით	7(1)	-(3)
		0.1-0.15	სამოვრები, ველური მცენარეულობა, კალოებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენის პერიოდში	20(1)	1(1)
		0.8 მლ/მ2	ჩაუტვრთავი სასაწყობო შენობა-ნაგე- ბოებში და მარცვალ- გადასამუშა ვებელი მანქანა- იარაღები	მავნებლები შენახვის პირობებში, ტკიპების გარდა	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე. საწყობების ჩატვრთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 1 დღე-ღამის შემდეგ დამუშავებიდან	-(1)	1(1)
		1.6 მლ/მ2	სასაწყობო და მარცვალგადა სამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(1)	1(1)



			მარცვლოვ				
		24 მლ/ტ	ნების მარცვლი, სამარცვლე პარკოსნების თესლი		შესხურება. ხარჯის ნორმა 500 მლ 1 ტ მარცვალზე. მარცვლის გა-მოყენება სასურსათე ან საფურაჟე მიზნით	-(1)	

მ) დამატოს 117¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

117 ¹ .	სანსირო 550 გვ 500+50 გ/ლ (ქლორპირიფოსი+ ციპერმეტრინი) (თ), (1) "სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1059	1.5	ვაშლი, ატამი	ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	7(3)
		0.75-1.0	ხორბალი	ჭია წურბელა, პურის ზხულა		30(1)	10(4)
		0.5-0.75	ქერი	მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო		30(1)	10(4)
		0.75-1.0	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა		30(2-3)	
		0.5-1.0	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	10(4)
		1.5 2.2-2.6	ციტრუსები	ფარიანები, გრუფარიანები მენადმე ჩრჩილი		40(1)	10(4)
		1.5	ვაზი	ფარიანები, გრუფარიანები		30(1)	10(4)



წ)დაემატოს 130¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

130 ¹ .	ტაფანა 100 გ/ლ (ალფა- ციპერმეტრინი) (თ), (1)	0,2	სიმინდი	სიმინდის ღეროს ფარვანა ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით	15(3)	-(4)
	“სანსეტ ქიმიკატარში ურუნღური ვე ალელური იმაღალ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1055	0.1-0.15	ხორბალი, ქერი	მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინობლები, თრიფსები, რწყილები, ჭიანჭურბელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	
		0.25-0.35	ვაზი	ფოთლიხვევები		25(2)	-(4)
		0.2-0.35	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია, ვაშლის ჩრჩილი, ფოთლიხვევები ამერიკული თეთრი პეპელა		25(2)	10(4)
		0,4	ზეთისხილი	ზეთისხილის ბუზი		25(2)	10(4)
		0,35-0,4	თხილი			25(2)	10(4)
		0.1-0,3	ბარდა, ლობიო	ბუგრები ბაღინჯოები მემარცვლები	შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ	20(1)	10(4)
		0.1	შაქრის და სუფრის ჭარხალი	ჭარხლის ფოთლის ბუგრი, ჭარხლის მენაღმე ბუზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.1 0.1-0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები კარტოფილის ჩრჩილი	„	20(2)	
		0,15-0,2	ბოსტნეული	მთიბელები	„	15(2)	10(4)
		0,25	პამიდორი	ხვატარი	„	20(2)	10(4)

კ)დაემატოს 132¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	0.2						
--	-----	--	--	--	--	--	--



132 ¹ .	ტეკვანდო კაპსულა, კს 50 გ/ლ (ლამზადაციგალოტრინი (თ), (1) "საფა ტარიმ ა.ს." თურქეთი 1004			ხორბლის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მანვე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა პურის ბზუალა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(1)	-(-)
		0,25					
		0.2-0,25	სიმინდი	სიმინდის ფარვანა, სიმინდის ხვატარი		30(1)	10(4)
		0.4-0.8	ვაშლი	მანვებელთა კომპლექსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20-25 დღიანი ინტერვალით	20(2)	10(4)
		0,3-0,5	ზეთისხილი	ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ცრუფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	
		0,75	თხილი	თხილის ცხვირგრძელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, როცა თხილის დიამეტრი მიაღწევს 3-4 მმ	20(2)	10(4)
		0.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	10(4)
		0.1	კომბოსტო	კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები		20(1)	10(4)
		0.1-0,2	პამიდორი	კოლორადოს ხოჭო		20(1)	10(4)
		0.2-0.4	ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბალები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები. თხილი	ამერიკული თეთრი პეპელა		-(2)	10(4)
		0.3-0.4	ვაზი	ფოთლიხვევიები, ტკიპები		30(3)	10(4)
		0,1	შაქრის ჭარხალი	რწყილები			
		0.15-0,2	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულე- ბის მიწები	კალიები (არაჯოგური ფორმები, ჯოგური ფორმების უმცროსი ასაკის მატლები)		20(1)	10(4)
		0.25-0.45	"	კალიები (ჯოგური ფორმები, ზრდასრული მატლები და იმავი)		30(1)	10(4)

ბ) დაემატოს 136¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

136 ¹ .	ფაინსულფური 80 წდგრ 800 გ/კგ	6-7,5	თესლოვანი ხეხილი	ტკიპები	"	7(2)	4(1)
--------------------	--	-------	---------------------	---------	---	------	------



	(გოგირდი) (3)	12-15	ციტრუსი		„	7(2)	4(1)
	“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 1050						

ჯ) დაემატოს 140¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

140 ¹ .	ფლუმბიტი, სვ 200 გ/ლ (დიფლოვიდაზინი) (თ),(3)	0,35-0,5	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მავნეობის ზღვრის გათვალისწინებით. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	28(1)	7(3)
	“აგრო-ქემი კვტ” უნგრეთი 1003	0,4-0,5	ვაშლი, მსხალი	“	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში მავნებლის მავნეობის ზღვრის გათვალისწინებით ან ზაფხულში.. ხარჯვა-800- 1500 ლ/ჰა	28(1)	7(3)
		0,4-0,5	ატამი, ქლიავი, ვაშლატამა	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მავნეობის ზღვრის გათვალისწინებით. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	28(1-2)	7(3)
		0,5	კაკალი	“	შესხურება ზამთრის პერიოდის შემდეგ . ხარჯვა-800 ლ/ჰა	28(1)	7(3)
		0,5	მარწყვი	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ცვეილოზამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა	28(1)	7(3)

პ) 152-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

152.	ჰექტოლინეუმი, მზე 700 გ/ლ (მინერალური ზეთი) (თ), (1) “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 605/13	25-30	ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ატამი	ფარიანების, ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრე- ბის, ფსილების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები	შესხურება კვირტების გახსნამდე გაზაფხულზე, ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4°C დაბალი	-(1)	3(1)
		30-45	ციტრუსები	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფრთათეთრა	შესხურება მცენარის მოსვენების სტადიაში. ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4°C დაბალი, 3-4% კონცენტრაციით	-(1)	3(1)



		10-15	ვაზი	ფარიანების და ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების მოზამთრე ფაზები	შესხურება გაზაფხულზე კვირტების გახსნამდე	-(1)	7(3)
		20-30	ვაშლი, მსხალი,	ცრუფარიანები	შესხურება ზაფხულში როცა გა-მოჩნდება მოხეტიალე მატლები, შესაძლებელია რომელიმე ფოსფოროვანი პრეპარატის შერევა	21(1)	7(3)
		10-25	დეკორა-ტიული მცენარეები				

3. მე-4 მუხლს დამატოს 1¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1 ¹ .	ეფდალ ფენოსი 400 , გკ 400 გ/ლ (ფენამიფოსი) (თ), (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1035	7,5	ხახვი	ნემატოდები (გარდა კოლუმბიის გალებიანი ფესვის ნემატოდისა)	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე ან დარგვამდე მექანიკურად (ზედაპირული დადისკვით) . ხარჯვა 250 ლ/ჰა	80(1)	10(3)
		4,0	ბარდა	ნემატოდები (გარდა კოლუმბიის გალებიანი ფესვის ნემატოდისა)	ნიადაგის შესხურება პირდაპირ დათესვის შემდეგ, მაგრამ კულტურის აღმოცენებამდე. ხარჯვა 250 ლ/ჰა	90(1)	10(3)
		3,0	თამბაქო	ფესვის გალიანი ნემატოდები თამბაქოს ტკიპა	მიმართული ფოთლოვანი შესხურება მცენარეების ზრდის წერტილის ქვემოთ დარგვიდან 3 კვირის შემდეგ. განმეორებითი შესხურება 5-6 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	42(2)	10(3)

4.მე-5 მუხლის:

ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.	აირონი, წდგრ 280 გ/კგ (სპილენძის ჰიდროქსიდი 140+სპილენძის ქლორჟანგი 140) (თ), (3) “იზაგრო სპა”	2-4	ვაზი	ჰრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე	პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით	25 (4)	3(1)
----	---	-----	------	----------------------------------	--	--------	------



იტალია							
649/14							

		2-5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	„	25(3)	3(1)
		6-8	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე	-(1)	3(1)
		4.5-10.5	ატამი გარგარი ქლიავი ალუბალი	ფითლის სიხუჭუჭე ბაქტერიული სილაქვე ბაქტერიული ნეკროზი	„	-(1)	3(1)
		1,2-3,2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით	15(4)	3(1)
		1,2-3,2	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	15(4)	3(1)
		2,0-4	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი	„	20 (4)	3(1)
		3.5-4	ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	„	21(3)	3(1)
		3	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	15 (3)	3(1)

ბ) დამატოს 7¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

7 ¹ .	ალექტო, წდგრ 618 გ/კგ (მეთირამი 570 + ციმოქსალინი 48 გ/კგ)	2.0	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალთ. გამოიყენება სხვა ქიმიური კლასის ფუნგიციდებთან მორიგეობით	28 (3-4)	7(3)
	(თ) „საფა ტარიმი ა.ს.“	1.0-1,2	პამიდორი	ფიტოფტოროზი		21 (2-3)	7(3)
	თურქეთი 1005	1.0-1,2	კიტრი, გოგრა, ნესვი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალთ.	21(2-3)	7(3)
		1,0-1,2	საზამთრო	ალტერნარიოზი	„	14 (2-3)	7(3)
		1.0-1,2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	„	28 (2-3)	7(3)



გ) მე-17 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

17.	ზაისტარი, სფ სფ 250 გ/კგ (ტრიადიმეფონი) „სინოხემ ნინგზო ლტდ“ ჩინეთი 1025	0.35-0.5	ვაშლი	ნაცარი, ქევი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,02% სამუშაო ხსნარით	20(6)	7(3)
		0.35-0.5	ვაზი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიღამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,02% სამუშაო ხსნარით	30(6)	7(3)
		0.1-0.2	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,01-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.2-0.6	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,01% სამუშაო ხსნარით	5(2)	5(3)
		1-4	პამიდორი (დახურული გრუნტი)	“	“	10(2)	7(3)
		0.6-1	შაქრის ჯარხალი	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	-(3)
		0.75	ვარდი დეკორა- ტიული (დახურული გრუნტი)	ჟანგა, ნაცარი, ლაქიანობეზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით	5(1)	7(3)

დ) დაემატოს 22¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

22 ¹ .	ზორდო სალდეკო 20 სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხ ედვით) (სპილენძის სულფატი- კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „სალეს უაი დერივადოს დე კობრე ს.ა.“ პერუ 1020	20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქევი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა- 1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)



		5-20	ციტრუსი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 2500 ლ/ჰა	20 (4)	3(1)
		3-6	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4-6	პამიდორი, ბადრიჯანი	“	“	10(4)	3(1)
		4-6	შაქრის, სუფრის ქარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	7(3)	3(1)
		8-15	თესლოვანი ხეხილი	ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		6-8	კურკოვანი ხეხილი	“	“		3(1)
		8-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		5	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)

ე) 24 -ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ვ) 33-ე და 34-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

33.	დითიშეგა 75 წზგრ 750 გ/ჰგ (დითიანწი) (თ) “ნანჯინგ ესსენც ფაინ- ქემიკლ კო ლტდ” ჩინეთი	0.5-0.7	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა	შესხურება 0,05% სამუშაო ხსნარით ვეგეტაციის პე- რიოდში ასკოსპო- რების ფრენამდე და 0,03% სამუშაო ხსნარით ასკოსპო- რების ფრენის შემდეგ	20(2-5)	7(3)
-----	--	---------	---------------	--	--	---------	------



	623/14						
		0.5-0.7	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	30(2-66)	7(3)
		0.5-0.7	ატამი, გარგარი	ფოთლეზის სიხუჭუჭე, კლასტროსპორიოზი, კლატოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით (1000 ლ/ჰა)	15(3)	7(3)
34.	დიმანკო 9+60 სფ 90+ 600 გ/ჰგ (დიმეტომორფი+ მანკოცები)	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
		2	ვაზი	ჭრაქი	"	40(3)	7(3)
	"ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ" ჩინეთი 624/14	2	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	"	40(3)	7(3)
		2	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	"	15(3)	7(3)

ზ) დაემატოს 39¹ და 39² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

39 ¹ .	ერვლანტი 100 ევ 100 გ/ლ (პენკონაზოლი) (თ), (2) "სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1068	0.3	კიტრი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	7(2-3)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	"	20(4)	7(3)
		0.25-0,3	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	21(3-4)	7(3)
		0.4	ვარდი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5% სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	-(3-4)	3(-)
39 ² .	ერფრუტი 50 სფ 450+50 გ/ჰგ (მანკოცები+ ციმოქსანილი)	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)



	(თ)						
	“სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ზრუნული ვე ალელური იმაღატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”						
თურქეთი	2,5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)	
1066							
	2,5-3	გოგროვანები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)	

თ) დაემატოს 40¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

40 ¹ .	ეფდალ დიფენარო 30 ეკ 300 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი 150 გ/ლ+ პროპიკონაზოლი 150 გ/ლ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1067	0,4-0,5	ხორბალი, ქერი	ნაკარი, ღეროს, მურა, ყვითელი ჯანგა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპოროზი, პირენოფოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას	21 (1-2)	-(3)	
		0,25-0,4	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)	
		0,3-0,4	სოია	ჯანგა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7(3)	

ი) დაემატოს 42¹- 42³ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

42 ¹ .	ეფდალ კაპტანი 50 სგ 500 გ/კგ (კაპტანი) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1013	3-5	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქევი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით	40(4)	7(3)	
		3-4	ვაზი	ჭრაჭი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	30(4)	7(3)	



		3-4	ატამი, გარგარი, ალუბალი, ნუში,	ფოთლის სიხუჭუჭე ანთრაქნოზი,	“	30(3)	7(3)	
		2.5-3	კიტრი, პამიდორი, წიწაკა (ღია გრუნტში)	ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)	
		0.2-0.3	კიტრი (ღია გრუნტი)		პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ ნაკვეთზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)		
		0.3	კიტრი (დახურული გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი		2(2)	2(2)	
		0,3	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის მანძილზე 7-14 დღიანი ინტერვალით	2(2)	2(2)	
42 ² .	ეფდალ კრესდითი 50 წზგ 500 გ/კგ (კრეზოქსიმ მეთილი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1028	0.3-0.5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები	პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი	35(3)	7(3)	
		0.2-0.3	კიტრი (ღია გრუნტი)		პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ ნაკვეთზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)		
		0.3	კიტრი (დახურული გრუნტი)	პერინისპოროზი, ნაცარი		2(2)	2(2)	
		0,3	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის მანძილზე 7-14 დღიანი ინტერვალით	2(2)	2(2)	
42 ³ .	ეფდალ ლოქსინი წდგრ 500 გ/კგ (ტრიფლოქსისტრობინი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1029	0,15-0,25	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის	14(2-3)	7(3)	



					დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღმეტებოდეს სამს.		
		0,15-0,3	გარგარი, ვაშლატამა ატამი ქლიავი	ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით.	10(2-3)	7(3)
		0,15-0,2	ალუბალი ბალი	ნაცარი ფოთლის ლაქიანობა	ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღმეტებოდეს სამს.		
		0.25-0.3	ვაზი	ჭრაქი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით.	35(2-3)	7(3)
		0.14		ნაცარი, შავი სიდამპლე	ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, არ უნდა აღმეტებოდეს სამს		

კ) დემატოს 43¹ - 43² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

43 ¹ .	ეფდალ მანტალაქსი, სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0,6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	2,5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის	21(4)	7(3)



	თურქეთი				პერიოდში		
	1012						
		2-2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	„	14(4)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	„	10(3)	7(3)

43 ² .	ეფდალ მოკანი, სფ 439.5 გ/კგ (სპილენძის ქლორფანგი 397,5 + ციმოქსანილი 42) „ტარკიმ ზიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1034	2-3	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		2.5	კიტრი	პერონოსპოროზი	„	5(3)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	5(3)	7(3)
		2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	5(3)	7(3)

ლ) დავმატოს 44¹ -44² პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

44 ¹ .	ეფდალ პიროქსოში 76 სფ 700-60 გ/კგ (Pპროპინზი+ციმოქსანილი)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი	“	30(3)	7(3)
	„ტარკიმ ზიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1060	1.25	კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	20(3-4)	7(3)
44 ² .	ეფდალ პროკარი 722 წხ 722 გ/ლ (პროპამოკარიზი პიდრელორიდი) (თ)	7.5 მლ/მ ²	თამბაქო	ფესვის სიდამ-პლეები (პითიუმის გვარის სოკოებით გამოწვეული)	ნიადაგში შეტანა დათესვის წინ და 30 დღის შემდეგ. ხარჯვა-3-4 ლ/მ ²	14(2)	7(3)



	„ტარკიმ ზიტკი კორუმა სანაი 33 ტიკარეტ ა.ს.“						
	თურქეთი	2,5	გოგროვნები		შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით.	3(2)	7(3)
	1036	2,0	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	ხარჯვა-500-1500 ლ		
		300 მლ/მცე	“	ფესვის სიღამპლეები	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ 0,25% სამუშაო ხსნარით	-(1)	-(3)
		ნარე		ჭრაქი			
		300 მლ/მცენარე	“	“	მორწყვა ჩითილების გადარგვის შემდეგ 0,15% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი (დახურული გრუნტი)	“	ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ 0,25% სამუშაო ხსნარით.	-(1)	-(3)
		2	საზამთრო ნესვი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500-1500 ლ	3(2)	7(3)
		2-4 ლ/ მ2	კიტრი, პამიდორი კომბოსტო წინაკა ბადრიჯანი საზამთრო	ფესვის და ღეროს სიღამპლეები	ჩითილების მორწყვა 0,15% სამუშაო ხსნარით 3-4 კვირის ინტერვალით	3(2)	7(3)
		0,5 ლ/100 კგ თესლზე	მზესუმზირა	ჭრაქი	თესლის დამუშავება თესვამდე	-(1)	-(3)

მ) 48-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

48.	ექსპერტ ტიმი, სფ									
	439,5 გ/კგ									
	(სპილენძის ქლორფანი 397,5 +									
	ციმოქსანილი 42)	2-3	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)		30(4)	7(3)
	“ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”									
	თურქეთი									
	637/13									



		1,2	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ, სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა		7(3)
--	--	-----	---------	-----------------------------	--	--	------

ო) დამატოს 61¹- 61³ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

61 ¹ .	იზოლბლუ ბორდომისი, სფ (200 გ/კგ სპილენძის მის ედვით) (სპილენძის სულფატი-კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) „მეტროპოლიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.“ თურქეთი 1076	6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)
		4-6	კამიდორი	“	“	15(4)	3(1)
		4-6	ხახვი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფე-რი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	15(3)	3(1)
		8-15	თესლოვანი ხეხილი	ქევი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	25(6)	3(1)
		6,5-15	ატამი გარგარი	ფოთლის სიხუჭუჭე კლასტეროსპოროზი		25(2)	3(1)
		7-13	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)



		20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქევი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, ფოთლის სიხუქუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
61 ² .	იზოლდიფეკორი 250 გ/ლ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) „მეტროპოლიქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.“ თურქეთი 1077	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაგარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა-ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვა-ლით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
61 ³ .	იზოლპროპინები 70 სგ 700 გ/ჰგ (პროპინები) (თ), (1)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
	„მეტროპოლიქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.“ თურქეთი 1078	2,4-3,5	ვაშლი, მსხალი	ქევი	“	30(3)	7(3)
		1,0-1,5	მზესუმზირა	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (2)	10(3)
		1.5-2	გოგროვნები	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
		1.5-2	კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) რიზოქტონიოზი ფესვის ფუნარიოზული სიდამპლე,		20(4)	7(3)
		1,0-1,5	ხახვი	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	კომბოსტო	პერონოსპოროზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ნესვი, საზამთრო	ანთრაქნოზი		20(2)	7(3)
		1,0-1,5	ბარდა, ლობიო	ანთრაქნოზი, ჟანგა, ასკობიტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		1,0-1,5	ვარდი, მიხაკი	ჟანგა		-(3)	-(3)



პ) 63-ე და 64-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

63.	იროკო 40 წდგრ 400 გ/კგ	1. 5-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში .	15(5)	7(3)
	(სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით)	2.5-3.0	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	“აიკუვი სა” ესპანეთი 647/14	1.2-2.7	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		1.2-2.7	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		1.2-2.7	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		3-4	ატამი	ჟანგა. სიდამპლეები. ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(2)	7(3)
		4-5	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		1.2-2.8	ხმოსტნეული კულტურები	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
64.	ინფინიტო სკ 687,5 687.5 გ/ლ (ფლუოპიკოლიდი 62.5+ პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი 625) ((3))	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი სიმპტომების გამოჩენისას 7 დღიანი ინტერვალით	14 (2-4)	10(3)
	“ზაიერ კროსაიენს აგ” გერმანია 650/14	1.2-1.6	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	10 (2-3)	10(3)
		1.6	კომბოსტო	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	14 (2)	10(3)
		1.2	ხახვი	პერონოსპოროზი		14 (3)	10(3)



ქ) დაემატოს 67¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

67 ¹ .	კამბაზი მც, სფ 90+ 600 გ/კგ (დიმეთომორფი+ მანკოცები)	2-2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%- იანი სამუშაო ხსნარით	20(2-3)	7(3)
	„სანსეტ კიშიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1070	2.5	ვაზი	ჭრაქი	„	30(3)	7(3)
		2-2.5	პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	20(3)	7(3)
		2-2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	„	15(3)	7(3)
		2	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	15(2)	7(3)

რ) დაემატოს 70¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

70 ¹ .	კარპაზი 50 წებრ, 500 გ/კგ (ციპროდინილი) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1014	0,4	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		0,2	ნაცარი				
		0,4	ატამი, გარგარი ქლიავი, ალოზაღი, ბალი	მმონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი	„	28(4)	7(3)
		0.7	ვაზი	ნნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი	„	20(3)	7(3)



ს)72-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ტ) დაემატოს 73¹ და 73² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

73 ¹ .	კვარტეტი 70 სფ 700 გ/კგ (თიოფანატ-მეთილი) (თ),(3) "ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს." თურქეთი 1047	1	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით	21 (2)	7(3)
		1-2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი მონილიოზი	"	20 (5)	7(3)
		1	ალუბალი	კოკომიკოზი	"	20(4)	7(3)
			გარგარი	სკლეროტინია			
		0,8-1	შავი მოცხარი	ნაცარი, ანთრაქნოზი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,1% სამუშაო ხსნარით. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე	-(2)	7(3)
		2,9	ატამი	ნაცარი, ქეცი, მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3% სამუშაო ხსნარით	30 (1)	7(3)
		0,8-1	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით	7(4)	-(3)
		1-1,2	საგაზაფხულო და საშემოდგმო ზორბალი, ქერი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(2)	-(3)
		0,6-0,8	შაქრის ჭარხალი	ნაცარი, ცერკოსპოროზი	"	20(3)	7(3)
	კინგკოზები 8-45, სფ 800 გ/კგ						



73 ² .	(მანკეები) (თ) „სანსეტ ქიმიკატარი ურუნლერი ვე ალექტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1048	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მკროსპოროზი ალტერნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	28(4-5)	7(3)
		2.0-3.,0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღის ინტერვალით	28 (2)	7(3)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღის ინტერვალით	14 (3)	7 (3)
		1,2-1,6	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	„	20 (3)	7 (3)
		1,2-1,6	საზამთრო, ნესვი	ანთრაქნოზი	„	7 (3)	7 (3)
		1,2-1,6	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	28 (3)	7(3)
		1.0-1.2	კარტოფილი (სათესლე)	ჭრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	7(3)
		1,0-1,2	ლობიო, მარდა	ანთრაქნოზი, ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	28 (3)	7(3)

უ) 77-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

77.	კოლისი, სკ 100 გ/ლ + 200 გ/ლ (კრეზოქსიმ-მეთილი + ზოსკალიდი) (თ) „ზასფი სე“ გერმანია 592/13	0.4	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	50(3)	7(3)		50 (3)	7(3)
-----	--	-----	------	-----------------------------------	-------------------------------	-------	------	--	--------	------

ფ) დავმატოს 77¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

კონრადი, სკ				პრეპარატი გამოიყენება		
-------------	--	--	--	-----------------------	--	--



250 გ/ლ							
77 ¹ .	(აზოქსისტრობინი) (თ), (3) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1006	0.6	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი	მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16 დღიანი ინტერვალით. სამუშაო ხსნარის ხარჯის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	5(2)	5(3)
		0,6	წიწკა (დაბურული გრუნტი)	ნაცარი	„	3(2)	3(3)
		0.5-0.6	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერიენსპოროზი, ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 14- 16 დღიანი ინტერვალით. ხარჯის ნორმა 800 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა	3(2)	3(3)
		0,75	საზამთრო	ალტერნარია	„	3(2)	3(3)
		0.8	ვაზი	ჭრაქი, ნაცარი ფომოპისი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისერიმობის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯის ნორმა 1000 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილური ნაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.	25(2)	7(3)

ქ) 78-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

78.	კონსენტო სკ 450 450 გ/ლ (ფენამიდონი 75+ პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი 375)	1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი მაკროსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების სიმპტომების გამოჩენისას 7 დღიანი ინტერვალით	7(3)	7(3)
	(თ) „ზაიერ კროსაიენს აგ“	2	კომბოსტო	ჭრაქი	„	7(2-3)	7(3)
	გერმანია 651/14	1.5-2	პამიდორი კიტრი	ანთრაქნოზი პერონოსპოროზი ბაქტერიოზი	„	7(2-3)	7(3)
		1.5-2	ხაზვი, ნიორი	პერონოსპოროზი	„	7 (2-3)	7(3)



				ალტერნატიული			
		2	საზამთრო, ნესვი	კრაქი	“	7 (2-3)	7(3)

დ) დამატოს 78¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

				ქევი, მონილიოზი, ბაქტერიული კიბო,		-(1)	
		18-28		ანთრაქნოზი	შესუბრება მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა		
	კოპერ -ქსუნთ -N , ზგ	18-23		ფესვის ყელისა და ვარჯის სიდამპლე			
	271,5 გ/ლ						
	(სპილენძდამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი, 93 გ/ლ (თ), (3)	9	ვაშლი,		შესუბრება შემოდგომაზე მოსავლის აღების შემდეგ ან ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერებამდე ხარჯვა-400 ლ/ჰა (15-20 ლიტრი თითოეულ ხეზე და მის გარშემო ნიადაგზე.		3(1)
78 ¹ .	“ მინერალ რესერვ ენდ დეველოპმენტ, ქემიკალ სპეციალიტის დივიზი, ინკ.”						
	აშშ						
	1046			ბაქტერიული სიდამწვრე	შესუბრება ყვავილობის პერიოდში 10% ყვავილელების გახსნიდან 7 დღის ინტერვალით ყვავილობის დამთავრებამდე		
		2-5					
						- (2)	
				ბაქტერიული სიდამწვრე		- (2)	
		2,5-5			შესუბრება ყვავილობის პერიოდში 10% ყვავილელების გახსნიდან 5- 7 დღის ინტერვალთ		



		მსხალი				3(1)
	19-28		ყვავილელების ბაქტერიული ჭკნობა	შესხურება გვიან შემოდგომაზე	-(1)	
	18-28	გარგარი	კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი	შესხურება შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე და 7 დღის ინტერვალით.. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	-(2-3)	3(1)
	19-28	ატამი ვაშლატამა	ბაქტერიული ლაქიანობა, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე და 7-10 დღის ინტერვალით.. ხარჯვა 1500 ლ/ჰა	21 (2-4)	3(1)
	15					
	6		კვირტების ბაქტერიული ჭკნობა, ნაყოფის ლაქიანობა	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, გვიან შემოდგომაზე და ზამთრის ბოლოს. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(3)	
		აღუბალი				3(1)
	2-3		მონილიოზი	შესხურება ყვავილეების გაშლის და ყვავილობის ფაზაში 7 დღის ინტერვალით. . ხარჯვა-400 ლ/ჰა	21 (2-3)	
	19-28	ქლიავი, ტყემალი	ბაქტერიული ნეკროზი, ბაქტერიული კიბო , მონილიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და გაზაფხულზე მწვანე კონუსის და ვარდისფერი კოკორი ფაზაში 7 დღის ინტერვალით..	21(2-3)	3(1)
	18-28		მონილიოზი,			
		ნუში		შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას და 7 დღის ინტერვალით	20 (3)	
						3(1)



		18-23		კლასტეროსპორიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე 3-4 კვირის ინტერვალით კვირტების დაბერვამდე	-(3)	
		19-28	თბილი	ბაქტერიული კიბო, მერენის ნეკროზი	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ და თებერვლიდან აპრილის დასაწყისამდე	20(1-3)	
		19-28	კაკალი	კაკლის ნეკროზი	შესხურება ყვავილელების გამოჩენიდან ყვავილობის დაწყებამდე 7 დღის ინტერვალით	20(2-3)	
		19	კივი	ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1 თვის ინტერვალით. ხაჯვა-1500 ლ/ჰა	20 (3)	
		2-3	ზეთის ხილი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე 1 თვის ინტერვალით. ხაჯვა-400 ლ/ჰა	20(2-4)	3(1)
		18-23	კენკროვნები	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქეები, ყვითელი ჭანგა, ბაქტერიული კიბო	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ,	-(1)	3(1)
		5-14			შესხურება კვირტების გახსნისას და 10-14 დღიანი ინტერვალთ	15(2-3)	
		11,5-23	მოცხარი, ხურტკმელი	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქეები	შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალთ	-(3)	3(1)
		9-23	მოცი	ალტერნარიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე და 4 კვირის შემდეგ	-(2)	3(1)
		3,5-5	მარწყვი	ფოთლის ლაქიანობა, ფოთლის სიდამწვრე	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებიდან მოსავლის აღებამდე 7 -10 დღის ინტერვალთ	15(2-4)	3(1)
		4,5-5	ვაზი	ჭრაქი, ნაგარი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კვირტების გახსნისას, 4-6 ფოთლის ფაზაში და 7-10 დღიანი ინტერვალთ	25(4-6)	3(1)
		1-2					
						30 (2-4)	
		1-2		სკეზი, ლაქიანობა, მელანოზი, ვარდისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილეების გაშლის წინ და ყვავილობის შემდეგ 7 დღიანი ინტერვალთ. ხაჯვა-400 ლ/ჰა		
			ციტრუსი				3(1)



		5-14		მონილიოზი	შესხურება შემოდგომაზე 7 დღიანი ინტერვალით.		
						-(2)	
		5-7	სტაფილო	ალტერნარიოზი ფიტოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მცენარეების 12-15 სმ სიმაღლისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით	10(3-4)	3(1)
		3,5-7	ხახვი	ჭრაქი, ალტერნარიოზი	„	10 (2-4)	3(1)
		5	მწვანე ხახვი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კარგად დაფენსვინებულ მცენარეზე და 7-10 დღიანი ინტერვალით	10 (3)	3(1)
		5-7	ნიახური	ბაქტერიული კიბო, ცერკოსპოროზი, სეპტორიოზი	„	10 (2)	3(1)
		7	კამა, ცერეცო, ოხრახუში	ფომოფისი, რიზოქტონია, ჭკნობა, ბაქტერიული კიბო	„	10 (3)	3(1)
		3,5	ისპანახი	ანთრაქნოზი, ცერკოსპოროზი, ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დააგადების გამოჩენისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით	10(3)	3(1)
		2,5-5		ფოთლის შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე			
			კომპოსტო ყველა სახის	„		10(2-3)	3(1)
		1,2-2,5		პერონოსპოროზი			
		3,5 -5	გოგროვნები, ხახველი კულტურები	პერონოსპოროზი , ალტერნარიოზი,, ანთრაქნოზი,, ბაქტერიული ლაქიანობა, შავი სიდამპლე	„	10(2-4)	3(1)
		5	ბადრიჯანი				
		65 მლ/100 კვ.მ.	ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)	ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პროფილაქტიკური და 7- 10 დღიანი ინტერვალით	10(4)	3(1)
		3,5-7	წიწაკა				
		65-95 მლ /100 კვ.მ.	წიწაკა	ბაქტერიული ლაქიანობა ცერკოსპოროზი	შესხურება აღმოდინების შემდეგ ან გადარგვის შემდეგ და 7-10 დღიანი ინტერვალით .	10(4)	3(1)



			(დაბურული გრუნტი)				
		3,5-6	პამიდორი	მურა კუთხოვანი ლაქიანობა, ფოთლის ბაქტერიული სიდამწვრე		10(3-4)	
		65 -95 მლ /100 კვ.მ.	პამიდორი	ფიტოფტოროზი , ალტერნარიოზი, მაკროსპორიოზი	”		3(1)
			(დაბურული გრუნტი)				
		3,5-7	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, მაკროსპორიოზი, როზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით .	15(3-4)	3(1)
		3,5-7	შაქრის ჯარბალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7 დღიანი ინტერვალით	15(2-3)	3(1)
		5-11,5	თამბაქო	ფოთლის კუთხოვანი ლაქიანობა, პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი	მცენარეების შესხურება დაავადების გამოჩენისას და 10 დღის ინტერვალით	15(2-4)	
		9,5-14		პიტომი, ცერკოსპოროზი, ბაქტერიული კიბო	ნიადაგის შესხურება გადარგვამდე და ჩითილების გადარგვის შემდეგ,	-(1-2)	3(1)
		3,5-5		ჰელმინტოსპორიოზი , სეპტორიოზი		20(2)	
			ხორბალი, ქერი , შვრია		შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თავთავის გამოჩენისას და 10 დღის შემდეგ		3(1)
		5		თავთავის ფუზარიოზი, ბაქტერიული ჭკნობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 10 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	
		5	სიმინდი	ბაქტერიული სიდამწვლე, ბაქტერიული ჭკნობა, ბაქტერიული ზოლიანობა, ღეროს სიდაპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გამოჩენისას და 7 დღიანი ინტერვალით	20(2-3)	3(1)
		2,5-7	პარკოსნები	ბაქტერიული კიბო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას მცენარეების 7-12 სმ სიმაღლისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით	20(2-4)	3(1)
		2,5-5	იონჯა	ალტერნარიოზი	შესხურება მოსავლის აღებამდე 10-14 დღით ადრე და 30 დღის ინტერვალით	14 (1-2)	3(1)
		1	დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები	ბაქტერიოზები, ალტერნარიოზი, ცერკოსპოროზი, ფიტოფტოროზი,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პროფილაქტიკური და 14 დღიანი	15(4)	3(1)



				ანთრაქნოზი, ტოტების სიღამალები, ჭრაქი, ქევი	ინტერვალით . ხაჯვა- 900 ლ/ჰა		
		5	სოკი	წიწვის ჯანგა	შესხურება კვირტების გახსნისას და 3-4 კვირის ინტერვალით	-(1-2)	3(1)
		14	მუხა	სფეროსებრი ხავსი	შესხურება გაზაფხულზე ხავსის აქტური ზრდის დაწყებისას , ხარვეზა - 16-18 ლ /ბის სიმაღლის გრძელ მეტრზე	-(1)	3(1)

ყ) 80-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

80.	კორუ სუპერი 50 სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ ციმოქსანილი) (თ)	2.5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფსისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	24 (3)	7 (3)
	“აგრიკო გრუპ ოლდ” ბულგარეთი 645/13	2.5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2.5-3	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)

შ) 87-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

87.	კუპერვალი 20 სფ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	2,4-6	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(სპილენძის სულფატი+ კალციუმის ჰიდროქსიდი)	4-6	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(თ), (1) “აიკუვი სა.” ესპანეთი 648/14	2,4-6	კიტრი	პერონოსპო	“ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(4)	7(3)
		7-15	თესლოვანი ხეხილი	ქევი,ნაყოფის სიღამალები,	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		7-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)
		6-7,2	კურკოვანი ხეხილი	ქანგები, სიღამალები, ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	7(3)



		5-20	ციტრუსი	ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25(4)	7(3)

ჩ) დაემატოს 101¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

101 ¹ .	მაიონი70 სგ 700 გ/კგ (პროპინები) „სანსეტ ქიმია ტარიმ ურულერი ვე ალელური იმლ. პაზ. სან. ვე ტის. ლტდ. სტი“	1.5-2	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი მაკროსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)	
	თურქეთი 1049	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი, ფომოფსისი	“	30(3-4)	7(3)	
		3-3,75	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	„	28(5)	7(3)	
		1, 5-2	კომბოსტო	პერონოსპოროზი	„	20(2-3)	7(3)	
		1.5-2	პამიდორი, ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	7(3)	
		1-1.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	“	20(3)	7(3)	
		1-1.25	საზამთრო, ნესვი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	25(3-4)	7(3)	
		1-1,5	ხახვი	პერონოსპოროზი	„	20(3)	7(3)	
		1-1, 5	ლობიო	ანთრაქნოზი, ნაცარი	„	20(3)	7(3)	
		5-6.25	ციტრუსი	ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით	40(4)	7(3)	

ც) 107-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

107.	მანვოსილი 80, სგ 800 გ/კგ (მანვოცები) (თ) “აგრიკო გრუპ ლტდ.” ბულგარეთი 598/13	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	20(5)	7(3)	
------	---	---------	--	--	--	-------	------	--



		2.0-3.0	ვაზი	ჭრაკი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქევი	“	40 (2)	7(3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)

ბ) 109-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

109.	მანგოზი 80, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ) “მარდა კროპქემ ლიმიტედ.”	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფთიოროზი, მაკროსპორიოზი ალტერნირიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით	20(5)	7(3)
	ინდოეთი 625/13	2.0-3.0	ვაზი	ჭრაკი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ვაშლი, მსხალი	ქევი	“	40 (2)	7(3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		2-2.5	კარტოფილი, (სათესლე)	რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(-)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)

წ) დამატოს 109¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

109 ¹ .	მაესალინი, სფ 400+40 გ/კგ (მანკოცები+ ციმოქსანილი) (თ)	2.5-3	ვაზი	ჭრაკი ფომოფისი შავი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500-1000 ლ/ჰა	28 (3-5)	7 (3)
--------------------	--	-------	------	--	---	----------	-------



„ოქსონ იტალია სპა“				ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა	10 (3-4)	7(3)
იტალია	2,5-3		პამიდორი, ბადრიჯანი	ალტერნარიოზი			
1019							
	2,5-3		გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	10 (3-4)	7(3)
	2,5-3		კარტოფილი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა	14 (4-5)	7(3)
	4-5		ხახვი	პერონოსპოროზი ალტერნარიოზი ჭანგა	„	14 (4)	7(3)

ჟ) 110-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

110.	მაქსიმო, წდგრ 40+640 გ/ჰგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2- 2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
	„მარდა კროპქემ ლიმიტედ.“ ინდოეთი 626/13	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	21(4)	7(3)
		2.5	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	„	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი	„	10(3)	7(3)
		2.5	ხახვი	„	„	15(3)	7(3)

ხ) დამატოს 113¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

113 ¹ .	მელტები 72 სგ 80+640 გ/ჰგ (მეტალაქსილი + მანკოცები)	2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ყვავილობის შემდგ 10-12 დღიანი ინტერვალზე	30(3-4)	7(3)
	„სანსეტ ქიშია ტარიმ ურულერი ვე ალექტური იმლ. პაზ. სან. ვე ტის. ლტდ. სტი“			ფიტოფტოროზი,	შესხურება ბუტონების გამოჩენიდან 10-12		



	თურქეთი	2.5	კარტოფილი	მკეროსპორიოზი	დღიანი ინტერვალებით	20(3)	7(3)
	1071						
			კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპორიოზი		14 (3)	
		2.5	პამიდორი(ღია გრუნტი)		შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		7(3)
				ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი		14(4)	

ჯ) 119-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

119.	მისტიკი 250, ზნე						
	250 გ/ლ	0.5	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (2-3)	7(3)
	(ტეზუკონაზოლი)						
	(3)					35 (3)	
	"ნიუფარმი გმზხ და კო კგ"	0.4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		7(3)
	ავსტრია						
	1040						
		0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ფუზარიოზი, ბადისებრი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით	51(1)	7(3)

3) დავმატოს 127¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	ორვეგო, კს						
	525 გ/ლ						
127 ¹ .	(დიმეტომორფი 225+ ამეტოკტრადინი 300 გ/ლ)				შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გამოვლინებისას 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა	20(3)	7(3)
	"ზასფი სე"	0,7-1	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი			
	გერმანია						
	1079						
		0,7-1	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	"	20(3)	7(3)



		0,7-1	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	2 0(2)	7(3)

3¹)128-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

3²) დაემატოს 129¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

129 ¹ .	ჩოსიქლორი 35 წგრ 350 გ/კგ (სპილენძის ქლორფანგი)	2.5-3.2	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი) სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა- 600 ლ/ჰა	20(4-5)	3(1)
	“მანიკა ს.პ.ა.” იტალია 1032	3.2-4	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.5-3.2	პამიდორი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა	“	20(4)	3(1)
		2.5-3	კიტრი, ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		2.5-3	კომბოსტო	ბაქტერიოზი, ალტერნარიოზი	“	20(3)	3(1)
		2.5	წიწკა, ბადრიჯანი	ალტერნარიოზი	”	20(3)	3(1)
		2.5-3	ხახვი, ნიორი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		3,2-4	მზესუმზირა	ბაქტერიოზი	“	20(3)	3(1)
		4-6			შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის დამთავრების შემდეგ. .ხარჯვა-1500 ლ/ჰა		
		10—17	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეცი, მონილოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე. .ხარჯვა-1200 ლ/ჰა	20(4)	3(1)
		4-6			შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		
		12-16	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიქოზი, მონილიოზი, ფითილის სიხუჭუჭე, ბაქტერიოზი, სკლეროტინიოზი	შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა-1500 ლ/ჰა	20(4)	3(1)



		4-6	ზეთისხილი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება გვიან შემოდგომაზე.	20(4)	3(1)
		6	კივი	სიდამპლეები	მცენარის ქვედა ნაწილის შესხურება 10-15 ლ ხსნარით	20(4)	3(1)
		4-7,5	თხილი, კაკალი, ნუში	ციტოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		3-6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი ,მაღი სიდამპლე	“	30(5)	3(1)
		10-12.5	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ფიტოსპოროზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი, მალსეკო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა- 2500 ლ/ჰა	35(3)	3(1)
		1,75-2,5	მარწყვი	სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა- 500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		3,2-4	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		4-6	დეკორატიული კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქავეები, ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(2)	3(1)
		1.75-2,5					
		2,5-3	ბარდა, ლობიო	ჭრაქი, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი, ჟანგა	”	20(3)	3(1)
		2,5-3	ფოთლოვანი ბოსტნეული	ჭრაქი, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი, ჟანგა, ცერკოსპორა	”	20(3)	3(1)

3³) 133-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

133.	პენფორსი 100, ევ 100 გ/ლ (პენვონაზოლი)	0.15	კიტრი (ღია გრუნტი)	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით	20(2)	7(3)
	(თ), (2) “აგრიკო გრუპ იოდ“ ბულგარეთი 639/13	0.25-0.4	კიტრი (დაბურული გრუნტი)	ნაცარი	“	3(3)	7(3)
		0.2-0.4	მაღი მოცხარი	ამერიკული ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით	20(4)	7(3)
		0.15-0.25	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო	20(3)	7(3)



					ხსნარით		
		0.5-1	ატამი	ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე	“	20(4)	7(3)
		0.3-0.5	მარწყვი	ნაცარი	შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ალუბალი (სადედე)	კოკომიკოზი	შესხურება ვმგებტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	შავი მოცხარი (სადედეები, სანერგეები)	ნაცარი	“	-(4)	7(3)
		0.3-0.6	ჟოლო	მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვმგებტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		0.3-0.4	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვმგებტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
		0.4-1	ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები	ნაცარი, ჟანგა	შესხურება ვმგებტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით	3(3-4)	3(-)
		0.15-0.2	სამკურნალო მუწარები (ფუტკარა)	ნაცარი, ჟანგა	სათესლე ნაკვეთების შესხურება	-(2)	7(3)

3⁴) დამატოს 141¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

141 ¹ .	პოლიტიგლია მანიაკ 20 წდგრ (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	3-6	კარტოფილი, პამიდორო, წიწყა, ბადროჯანი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვმგებტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
	(ზორდოს ნარევი 20% - სპილენძის სულფატი+ კალციუმის ჰიდროქსიდი)	3-6	კიტრი ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი სეპტორიოზი ანთრაქნოზი	“	10(4) 20 (30)	7(3)
(თ), (1) “მანიაკ ს.პ.ა.” იტალია 1031		2-3	ხახვი, ნიორი სტაფილო, კომბოსტო	პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი,	“	15 (3) 7(3)	7(3)
		6	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	“	15(3)	3(1)
		2.8-5	მარწყვი	ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი	“	15(3)	7(3)
		10-20		ქეცი, ნაყოფის სიდამპლე,	შესხურება მცენარის	-(1)	



		9-19	თესლოვანი ხეხილი	სეპტორიოზი, მოწილიოზი, ტოტების კიბო, ალტერნარია	მოსვენების პერიოდში შესხურება ვგეტაციის პერიოდში:	15(4)	7(3)
		7,5-10 12-14	თხილი, კაკალი, ნუში		შესხურება ფოთლების ცვენისას და კვირტების გახსნისას შესხურება ვგეტაციის პერიოდში	-(1) 25(3-4)	7(3)
		8-12	ვაზი	ჭრაქი, ესკორიოზი, შავი სიდამპლე	შესხურება ვგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობის შემდეგ , მტევნების შეკვრისას	25(3-4)	7(3)
		14-24	კურკოვანი ხეხილი	აატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მოწილიოზი, ჩანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი	შესხურება მცენარის მოსვენების პერიოდში	-(1))	7(3)
		12-20	ზეთისხილი	ფუმაგო (სიშავე)	შესხურება ვგეტაციის პერიოდში	20(2)	7(3)
		15-25	ციტრუსი	მეჭეჩიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი მზაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლბობა	მცენარის შემოდგომას, ზამთრის ბოლოს, გაზაფხულზე	25(4)	7(3)
		8 კივი 5-6		ლბობა ბაქტერიოზი	მცენარის ქვედა ნაწილის შესხურება 10-15 ლ სსნარი შესხურება ფოთლების ცვენისას	20(2)	7(3)
		2.5-4	ყვავილები, დეკორატიული კულტურები	ჩანგა, ლაქიანობები, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი	შესხურება ვგეტაციის პერიოდში	-(2)	3(1)

პ⁵) 149-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს

პ⁶) 151-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

151.	პროფაილერი წდგრ 71.1 711 გ/კგ (ფლუოპიკოლიდი 44.4+ალუმინის ფოსფორი 666.7) "ზაიერ კროსაიენსი აგ" გერმანია	2.5	ვაზი	ნნაცრისფერი სიდამპლე ჭრაქი	შესხურება ვგეტაციის პერიოდში 8-14 დღიანი ინტერვალით	28 (3)	7(3)
------	--	-----	------	-----------------------------------	---	--------	------



	653/14						
--	--------	--	--	--	--	--	--

3⁷) დაემატოს 154¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	რეეს ტაბი 500 სკ							
154 ¹ .	500 გ/ლ (მანდიპროპამიდი 250 + დიფენოკონაზოლი 250 გ/ლ) (თ) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 1016	0,6	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-200-600 ლ/ჰა	15(4)	-(3)	
		0,6	პამიდორი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-200 -400 ლ/ჰა	15(4)		

3⁸) 156-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	რეეს დუღი სკ						
156.	497 გ/ლ (თიოფანატ-მეთილი 310+ეპოქსიკონაზოლი 187) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 593/13	0.4-0.6	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	ნაცარი, მურა და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, ყვითელი ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (1)	7(3)
		0.4-0.6	ქერი	ნაცარი, ჯულჯა და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, ზადისებური ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები, ფუზარიოზი	“	35 (1)	7(3)
		0.4-0.6	შაქრის ჰარხალი	ცერკოსპოროზი ნაცარი რამულარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პროფილაქტიკის მიზნით ან დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, შემდეგი - 14-16 დღიანი ინტერვალთ	25 (1-2)	7(3)



		0.4-0.6	ბარდა	ასკოზიტოზი, ჭანგა, ნაცარი	“	21 (1-2)	7(3)
				ფოთლების ლაქიანობა			

პ⁹) 164-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

164.	როდოდოლიტ სუპერი, წზე 250 გ/ლ (ტეზუონაზოლი) (3)	0.4-0.5	ვაშლი, მსხალი	ნაცარი	შესხურება ვპგტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	30 (2-3)	7(3)
	“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 640/13	0.5 0.4-0.5	ატამი, ქლიავი, გარგარი ალუბალი, ბალი	ნაცარი	“	30(2-3)	7(3)
		0.4	ვაზი	ნაცარი	“	30 (2-3)	7(3)
		0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მშურა, ყვითელი, ღეროს ჭანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ფუზარიუმი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ლაქიანობა	შესხურება ვპგტაციის პერიოდში, დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით	30(2)	7(3)
		0.4	სამარცვლე პარკოსნები	ნაცარი	შესხურება ვპგტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით	35(2)	7(3)
		0.45	ზეთივანი კულტურები (მზესუმზირა, რავსი)	ნაცარი	“	30 (2)	7(3)
		0.45	კომპოსტო სტაფილო ხახვი, ნიორი პამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა კიტრი	ნაცარი, ალტერნარიოზი, „ ფოთლის ლაქიანობა	“	21(2)	7(3)



166.	როგონე 50 სგ 500 გ/კგ (იპროდიონი)	0.15	სტაფილო	თეთრი, შავი, მურა სიდამპლეები, ფუზარიოზი, თესლის ოზი, ფომოზი	ძირხვევნების დამუშავება შენახვამდე	-(2)	7(3)
	“საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 584/13	1.5	“	მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი, ალტერნარიოზი	სათესლე ნაკვეთებში ნათესების შესხურება 0,5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	7(3)
		-	კიტრი, პამიდორი (დახურული გრუნტი)	თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლეები	დაზიანებული ლეროების წასმა (ცარცთან ან კირთან ნარევით 1:2 ან 1:1)	-(1)	-(-)
		0.5	პამიდორი	ალტერნარიოზი ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		0.4	კიტრი	სკლეროტინიოზი	“	7 (2)	7(3)
		0.4	ბოსტნეული	ნაცრისფერი სიდამპლე	“	15 (2)	7(3)
		1.0 –1.5	ვაზი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15% სამუშაო ხსნარით	30(3-4)	7(3)
		1.5-1.8	გარგარი	მონილიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით	15 (2)	7(3)
		1.2	მარწყვი	ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ 0,25% სამუშაო ხსნარით. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე	-(2)	7(3)
		1.2	ტიტა	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით	-(4)	7(3)
		0.4-0.8 1.2-2.1	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	აღმონაცენტა ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე, ცილინდროსპო-როზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	აღმონაცენტა და წერგების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	-(3-4)	7(3)

3¹¹) 168-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

168.	საკოზები მ-45, სგ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ)	1.2-1.6	კარტოფილი პამიდორი	ფიტოფთოროზი, მაცროსპოროიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური,	20(5)	7(3)
------	--	---------	---------------------------	-----------------------------	---	-------	------



	„საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 600/13		(ღია გრუნტი)	ალტერნოზი	შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით		
		2.0-3,0	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით	30(6)	7(3)
		2.5-3	ხეხილი	ქევი	“	40 (2)	7(3)
		1.2-1.6	კიტრი (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10 (3)	7 (3)
		2.5-3	ციტრუსები	ანთრაქნოზი	“	40 (4)	7(3)
		1.0-1.2	ჩკარტოფილი (სათესლე)	ჭრაქი რიზოქტონიოზი	ტუბერების დამუშავება	-(1)	-(3)

3¹²⁾ დამატოს 168¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

168 ¹ .	საშბიტი, სკ 300 გ/ლ (კრეზოქსიმ-მეთილი 100+ დიფენოკონაზოლი 200 გ/ლ)	0,3	ვაშლი , მსხალი	ნაცარი, ქევი, ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	7(3)
	შპს „ კომპანია „უკრაინა“ უკრაინა შპს „გეოუკრაინა“	0.2	ატამი	ნაცარი, მონილიოზი	“	21(2)	7(3)
	საქართველო 1041	0,3	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი	„	20(4)	7(3)

3¹³⁾ დამატოს 172¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

172 ¹ .	საფვონილი 500 სკ 500 გ/ლ (ქლორტალონილი) (თ) „საფა ტარიმ ა.ს.“ თურქეთი 1015	3	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	20(3)	7(3)
--------------------	---	---	----------------	--------------	---	-------	------



		2,5	გოგროვნები	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3%- იანი სამუშაო ხსნარით 8-10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	3 (3)
		2.0-2,5	პამიდორი	ფიტოფტოროზი, მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 - 12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	3(3)
		2-3	ვაზი	ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი	"	30(3-4)	7(9)
		3-3,5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	20(4)	3(3)
		3	გარგარი	ფოთლის ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში შესხურება მოსვენების პერიოდში	56 (2) -(1)	3(3)

3¹⁴) 175-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

175.	სკალა სკ 400 400 გ/ლ (პირიმეთანალი) "ზაიერ კროპსაიენს აგ" გერმანია 654/14	1.2 2-2.5	ვაზი	ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე ჭრაქი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა	21 (2)	7(3)
		0.75 1.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი მონილიოზი	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება კვირტების დაბერვიდან ყვავილობის დამთავრებამდე 7- 12 დღიანი ინტერვალით. ყვავილობის პერიოდში გამოყენება არ არის დაშვებული. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა	56 (2-3)	7(3)
		1.5-2	პამიდორი	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა	14 (2)	7(3)
		1.5-2	ლობიო, ბარდა	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ყვავილობის	14(2)	7(3)



				ასკობიტოზი	დაწყებამდე და ყვავილობის შემდეგ, ხარჯვა- 600-1000 ლ/ჰა		
		2	მარწყვი	ნაცრისფერი სიდამპლე	პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დაწყებამდე 7-12 დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-1000-2000 ლ/ჰა	3 (2-3)	7(3)

3¹⁵) დამატოს 183¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

183 ¹ .	სპილენძის შაბიამანი, ხფ 980 გ/კგ (სპილენძის II სულფატი პენტაჰიდრატი) (თ), (1) ლსს „ურალელექტრომედი“ რუსეთი 144/05/14	8-10	მოცხარი, ხურტკმელა	ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქეები	შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით	-(1)	3(1)
		15-20	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ფილოს-ტიქტოზი, სილაქეები, მონილიოზი, ხმოზა	“	-(1)	3(1)
		10-15	გარგარი, ატამი, ქლიავე, ალუბალი, ზალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლას-ტეროსპო-რიოზი, მონილიოზი	“	-(1)	3(1)
		-	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ძირის და ტოტების სიდამპლეები	გადანაჰრების, ჭრილობების, ფულუროების დეზინფექცია 3- 5% სამუშაო ხსნარით	-(2)	3(1)

3¹⁶) დამატოს 185¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

185 ¹ .	სტრაფისკ 500 გ/ლ (ციპროდინილი) (თ) შპს „კომპანია „ უკრაინა უკრაინა შპს „გეოუკრაინა“	0,4	ვაშლი, მსხალი	ქევი, ნაგარი, მონილიოზი, ფოთლის ლაქიანოზა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
--------------------	--	-----	------------------	---	----------------------------------	-------	------



საქართველო	1042						
		0.3	ატამი გარგარი, ქლიაფი, ალუბალი, ბალი	ნაგარი,მატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი	“	25(3)	7(3)
		0,4-0.7	ვაზი	ნაგარი,ნაგრისფერი სიღამპლე, ჭრაქი,	“	30(3)	7(3)

3¹⁷)190-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

190.	სულფოლაკი 80 წდგრ 800გ /კგ (გოგირდი)	3-5	ვაზი	ნაგარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	1(4)	7(3)
		3-6	ვაშლი	ნაგარი	„	1(4)	7(3)
	„აგრომტულნი გმზხ“ გერმანია 646/14	3-5	თესლოვანი ხეხილი	ნაგარი	„	1(4)	7(3)
		2-3	კიტრი, პამიდორი, კარტოფილი	ალტერნარიოზი,სილაქავეები, ანთრაქნოზი	„	1(4)	7(3)
		4-5	კურკოვანი ხეხილი	ნაგარი	„	1(4)	7(3)
		3-6	ციტრუსი	ნაგარი	„	1(4)	7(3)
		2	ვარდი	ნაგარი		1(4)	7(3)

3¹⁸)დაემატოს 192¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

192 ¹ .	სუპერ სტარი, სფ 450+50 გ/კგ (მანკოცები+ ციმოქსანილი) (თ) „სინოხემ ნინგზო ლტდ“ ჩინეთი 1026	2,5-3	ვაზი	ჭრაქი ფომოფისი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით	25 (3)	7 (3)
		3	ვაშლი		„	25 (3)	7(3)
		2.5-3	პამიდორი	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10- 12 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)



		2.5-3	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7- 10 დღიანი ინტერვალით	14 (3)	7(3)
		2.5-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	14 (2)	7(3)

3¹⁹)200-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	ტერსელი, წდგრ 160 გ/კგ (დითიანონი 120 + პირაკლოსტრობინი 40)						
200.	(თ), (3) “ზასფი სე” გერმანია 594/13	2-2.5	ვაშლი, მსხალი	ქეცი ნაცარი სიდამპლეები შენახვის პერიოდში	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით	30 (3)	7(3)

3²⁰) 207-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	ტროპერი 72, სფ 80+640 გ/კგ (მეტალაქსილი 80 + მანკოცები 640)						
207.	“ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 607/13	2.5	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5- 0,6% სამუშაო ხსნარით	14(3)	7(3)
		2.5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(4)	7(3)
		2.5	ჰამიდორი (დია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი	“	14(4)	7(3)
		2.5	კიტრი	ჭრაქი	“	10 (3)	7(3)
		2.5	ხახვი	“	“	20(3)	7(3)

3²¹)დემატოს 210¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

210 ¹ .	ფაინსულფური 80 წდგრ 800 გ/კგ	4-5	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(4-6)	4(1)
--------------------	--	-----	------	--------	-------------------------------------	--------	------



	(გოგირდი) (3)	5-6	ვაშლი, მსხალი	“	“	7(1-6)	4(1)
	“პექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 1050	2-3	კიტრი, პამიდორი	“		7(1-5)	1(1)
		2-3	დეკორატიული მცენარეები	“	“	7(2-4)	4(1)

პ²²⁾ 215-ე და 216-ე პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

პ²³⁾ 220-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

220.	ფუნგიკონგი, სფ 700 გ/კგ (პროპინები)	2-2.5	ვაზი	ჭრაქი	“	30(2-3)	7(3)
	(თ), (1) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”	2-3	ვაშლი	ქეცი, მონილიოზი	“	30(2-4)	7(3)
	ინდოეთი 627/13	1.2-2.25	კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)	ჭრაქი, ფიტოფტორა	“	20(3)	7(3)
		1.5-2.5	ნესვი, საზამთრო	ჭრაქი	“	30(3-4)	7(3)
		5-6	ციტრუსები	ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ოზი	შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამ- დე და მეორე ვეგე- ტაციის დასაწყისში.	1(4)	10(3)
		1.2-2.25	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(4)	7(3)

222.	ფუნეისი 25 , გვ 250 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი) “ნანჯინგ ესსენგ ფაინ- ქემიკლ კო ლტდ” ჩინეთი 628/14	0.15-0.2	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა-ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვა-ლით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით	20(2-4)	7(3)
------	---	----------	---------------	--------------	---	---------	------

პ²⁴⁾ 222-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

პ²⁵⁾ 232-ე და 233-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:



232.	ჰექტარზე ბავირი, სფ 500 გ/კგ (სპილენძის ქლორფანგი) “ჰექტარზე ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 641/13	2.4-3.2	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(5)	3(1)
		3.2-4	შაქრის ჯარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.4-3.2	პამიდორი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		2.4	კიტრი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(3)	3(1)
		2.4	ხახვი	პერონოსპოროზი	“	20(3)	3(1)
		4-8	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქეგი, მონილოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით	20(4)	3(1)
		4-8	ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	კლასტეროსპო-რიოზი, კოკომიკოზი, მონილოზი, ფოთლის სიხუტუჭე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(4)	3(1)
		6	ვაზი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი	“	30(6)	3(1)
		0.4-0.8	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგე)	აღმონაცენთა ჩაწოლა, ნერგე-ბის ფესვის სიღამპლე, ფლორტების ფუზარიოზი, ბაქტერიოზი	აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0,4% სამუშაო ხსნარით	-(3)	3(1)
		2.8-4.0	თუთა (ახალგაზრდა პლანტაციები)	“	“	-(4)	3(1)
		1.5-2	დეკორა-ტიული კულტურები, ყვავილები	ჟანგა, სილაქეები	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	-(2)	3(1)
		12-15	ციტრუსები	ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(3)	3(1)
233.	ჰექტარზე ბორდო 20 სფ 740 გ/კგ (სპილენძის სულფატი-კალციუმის ჰიდროქსიდი) (თ), (1) “ჰექტარზე ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი	6-8	კარტოფილი	ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპო-რიოზი)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა	15(5)	3(1)



642/13							
		4-6	პამიდორი	“	“	8(4)	3(1)
		6-8	შაქრის, სუფრის ქარხალი	ცერკოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 300-500 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		6-8	თამბაქო	პერონოსპოროზი	“	15(3)	3(1)
		4-6	ხაზვი	პერონოსპო როზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	15(3)	3(1)
		4-6	ნესვი, საზამთრო	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 400-500 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		4-6	კიტრი	ანთრაქნოზი, პერონოსპო როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი	“	5(3)	3(1)
		8-12	თესლოვანი ხეხილი	ქევი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 1000-1200 ლ/ჰა	15(6)	3(1)
		7-10	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(4)	7(3)
		3-4	სამკურნალო მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 300-400 ლ/ჰა	20(3)	3(1)
		0.7-1.4 3.5-6	თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)	ცილინდროს პორო-ზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 100-200 ლ/ჰა და 500-600 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
		0.5-1	წიწვიანი და ფოთლოვანი ჯიშები (სანერგეები)	ჟანგა, წიწვის და ფოთლის ლაქიანობა	სანერგეების და შიშვლის შესხუ- რება ვეგეტაციის პერიოდში 0.2- 0.5% სამუშაო ხსნარით, ხსნარის ხარჯვა- 100-200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		5	დეკორატიული მცენარეები	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა- 500 ლ/ჰა	-(3)	3(1)
		20-25	ვაშლი, მსხალი, კომში	ქევი და სხვა, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა- 1000-1500 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		20-25	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა- 800-1000 ლ/ჰა	-(1)	3(1)



		20-25	გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი	კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს პორიოზი, მონილიოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა- 800-1200 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15-18	მოცხარი, ხურტკმელი, ყოლო, მარწყვი	ჟანგა, ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხსნარის ხარჯვა- 500-600 ლ/ჰა	-(1)	3(1)
		15-20	თუთის პლანტაციები (სადედეები)	სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები	შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით. ხსნარის ხარჯვა- 600-800 ლ/ჰა	-(1)	3(1)

3²⁶) დაემატოს 234-ე პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

234.	ჰიდრომიკრონი 77 სგ 770 გ/ჰა (სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით 500 გ/ჰა) „სალეს უაი დერივადოს დე კობრე ს.ა.“ პერუ 1027	2-4	ვაზი	ჭრაქი ბაქტერიოზული სიდაშწვრე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0.4% სამუშაო ხსნარით	25(6)	3 3(1)
		4	თესლოვნები	ქივი ბაქტერიოზი	პირველი შესხურება გავარდისფერების ფაზაში, შემდგომი 10 დღიანი ინტერვალით 0.4% სამუშაო ხსნარით	20(6)	3(1)
		4-6	ციტრუსი	ფიტოფტოროზი, ფომოფისი ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	25 (4)	3(1)
		2-3	პამიდორი , ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0.3% სამუშაო ხსნარით	10(4)	3(1)
		2-3	გოგროვნები (ღია გრუნტი)	პერონოსპოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	პირველი წამლობა 2-3 წამდელი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0.3% სამუშაო ხსნარით	15(3)	3(1)
		2-3	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი მაკროსპოროზი	პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 10 დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით	15(4)	3(1)
				ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი	შესხურება ვეგეტაციის		



		5-7	კუროვნები	ბაქტერიული ნეკროზი მონილიოზი	დაწყებამდე	-(1)	3(1)
		2-3	მარწყვი	ფოთლის ლაქიანობა ფოთლის სიდაშვრე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	10(2)	3(1)

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. თესლის შესაწამლი ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარა- ტის ხარჯვის ნორმა (ლ/ტა- კგ/ტ)	კულტურა, დასამუ- შავებელი ობიექტი	მავნებელი, დაავადება	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამო-ყენების ჯერა -დობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1	ინსექტიციდები:						
ა)	გორტაკა წდფთშ 70 700 გ/კგ (იმინდაკლოპრიდი) (1) „საფა ტარიმ ა.ს. თურქეთი 1007	7,5	შაქრის ჭარხალი	ტაკცუნები ლრაკები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი ბოლოფეხიანები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	
		2	ხორბალი, ქერი	პურის ბზულა	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 5-8 ლ წყალი/ტ თესლზე „	-(1)	-(1)
		0,3		ტაკცუნები ლრაკები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		0,15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო			
		5	სიმინდი	ტაკცუნები ლრაკები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
	ემესტო კვანტუმი სდკ 273,5			ბუგრები			



ბ)	207+66,5 გ/ლ (კლოთიანიდინი+ პენფლუფენი) (თ), (2) "ზაიერი კროპსაიენსი აგ" გერმანია 955	0,25-0,3	კარტოფილი	მავთულა ჭიები, გრუმავთულა ჭიები მაისის ხოჭო ჭიჭინოზები, თრისები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (10-20 ლ/ტონა თესლზე)	-(1)	3(1)
გ)	ფედალ იმიდრიდი 70 წდფთშ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1030	7,5	შაქრის ჭარხალი	ტაკუნები ლრაქები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი ბოლოფებიანები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი /ტ თესლზე	-(1)	-(1)
დ)	ფედალ იმიდრიდი 600 სკ 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი) (1) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1061	15	შაქრის ჭარხალი	ტაკუნები ლრაქები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი ბოლოფებიანები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი /ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		0,35		ტაკუნები ლრაქები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		0,15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო			
		6	სიმინდი	ტაკუნები ლრაქები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი /ტ თესლზე	-(1)	-(1)
	მარშალი, ეკ 250 გ/ლ (კარბოსულფანი)			კარტოფილის ჩრჩილი	თესლის დამუშავება დათესვისა და		



ე)	(თ) (1) “ფმს ევროპა ნე” ბელგია 501/09	0.5-0.7	კარტოფილი		შენახვის წინ 0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით	-(1)	-(-)
	მატადორ გრანდი, სდვ 200+100+100 გ/ლ (იმიდოლოპრიდი + მეტალაქსილი + ციმოქსანილი გ/ლ) (1)						
ვ)	შპს „კომპანია „უკრაინა“ „უკრაინა“ შპს „გეოუკრაინა“ საქართველო 1023	1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
ზ)	მიდაში პოლიუსი, წდფთშ 700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 984	7,5	შაქრის ჭარბალი	ტკაცუნები ღრაკები მავთულა ჭიები მრავალფეხა ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი ბოლოფეხიანები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		2	ხორბალი	პურის ბზულა	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 5-8 ლ წყალი/ტ თესლზე „	-(1)	-(1)
		0,3		ტკაცუნები ღრაკები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
		0,15	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო			
		5	სიმინდი	ტკაცუნები ღრაკები	თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე	-(1)	-(1)
თ)	ნუპრიდი 600, სკ 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “ნუფარიმი გმზხ და კო კვ ” ავსტრია 682	0.15-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო კარტოფილის ჩრჩილი მზუგრები მავთულა ჭიები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	3(1)



				მზერები			
		4.5-5	სიმინდი	მავთულა ჭიები მარცვლეულის ზუზი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
		0.5-0.75	ხორბალი	მავთულა ჭია კურის ზუზა ცხვირგრძელები	“	-(1)	3(1)
		5-6	მზესუმზირა	მავთულა ჭიები	“	-(1)	3(1)
ი)	სიდოპრიდი 600 სდკ 600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი) (1) “მაქტემიმ აგანი ხოლდინგ ბ.ვ. როტერდამი (ნლ), მაი-ს წვერი” ნიდერლანდები 789	4	სიმინდი	ბუერები მავთულა ჭიები გრუმავთულა ჭიები მარცვლეულის ზუზი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ ან წინასწარ 1 წლით ადრე (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
		6-10	მზესუმზირა	მავთულა ჭიები გრუმავთულა ჭიები	“	-(1)	3(1)
		2-4	რაფსი	რწყილები	“	-(1)	3(1)
		10-18	შაქრის ჭარხალი	ალმონაცენთა მავნებლების კომპლექსი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ ან წინასწარ 1 წლით ადრე (36 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	3(1)
კ)	პონწო სდკ 600 600 გ/ლ (კლოთიანიდინი) (1) “ზაიერი კროპსაიენსი აგ” გერმანია 941	4,0 7,5-10,0	სიმინდი	რუხი სახრეთის წვირგრძელა მავთულა ჭიები დასავლეთის სიმინდის ხოჭო	თესლის თესვისწინა შეწამვლა	-(1)	-(1)
		9,0	მზესუმზირა	რუხი სახრეთის წვირგრძელა მავთულა ჭიები	“	-(1)	-(1)
	პრემიუმი, კს 140+150 გ/ლ						



ლ)	(იმიდოლოპრიდი+ პენციკურონი) (1) “ნანჯინგ ესენგ ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ” ჩინეთი 790	1-1.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
მ)	პრესტიჟი კს 290 140+150 გ/ლ (იმიდოლოპრიდი+ პენციკურონი) (1) “ბაიერი კროპსაიენსი აგ” გერმანია 444/04/09	1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
ნ)	პრიზანი 25 სვ 250 გ/კგ (ქლორპირიფოს-ეთილი) (თ), (1) “პექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 748	2 12 გ/კგ	მარცვლეული ბოსტნეული	პურის ზზუალა მომღრნელი ხვატრები, მავთულა ჭიები	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (5-10ლ/ტ თესლზე) თესვისწინა დამუშავება დასველების მეთოდით	-(1)	-(-)
ო)	სელესტ ტოპი 312.5 სკ 312.5 გ/ლ (თიამეთოქსამი 262.5+ფლუდიოქ- სონილი 25+ დიფენოკონაზოლი 25) (თ),(1) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 755	0.4 1.6-1.8	კარტოფილი	მავთულა ჭიები, კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები, ჭიჭინობელები მავთულა ჭიები	სარგავი მასალის შეწამვლა უმულოდ დარგვამდე ან დარგვის დროს) (10ლ/ტ თესლზე) ნიადაგში შეტანა დარგვის დროს. (ხსნარის ხარჯვა-50 ლ/ჰა)	-(1)	-(-)



		1.5-2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მომღრნელი ხვატრები, ჭიაწურბელა, პურის ზუღალა, ზოლიანი პურის ბაღლინჯო, შვედური ხუზები	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ (10ლ/ტ თესლზე)	-(1)	
2.	ფუნგიციდები:						
ა)	ალიანსი, დს 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) "ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს." თურქეთი 608/13	1	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი		-(1)	-(-)
		0.75-1	შვრია	ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე		-(1)	-(-)
		1	ჭვავი	ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე		-(1)	-(-)
ბ)	აპრონი XL, წე 350 გ/ლ (მეფენოქსამი) (თ) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 754	0.5 2	შაქრის ჭარბალი	აღმონაცენთა ფესვისკამია პერონოსპოროზი	თესლის თესვისწინა ან წინასწარი (1 წლით ადრე) შეწამვლა (10-15 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		3	მზესუმზირა	პერონოსპოროზი, ვერტიცილოზი, თეთრი სიდამპლე	თესლის თესვისწინა ან წინასწარი (1 წლით ადრე) შეწამვლა (10-15 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		2.5	კიტრი	პერონოსპოროზი, ბაქტერიოზი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა (10-15 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
გ)	ატაკი, კს 30+6.3 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლი) "აგრო ს.ა." ბულგარეთი 772	0.75-1	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მაგარი, მტვრიანა გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინთოსპო- რიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დასველების მეთოდით, უმუალოდ დათესვის წინ ან წინასწარი (ერთ წლამდე) (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)



		1-1.5	ქერი	მაგარი, მტვრიანა და მაგარი გუდაფშუტა, ბადურა და ხაზურა ლაქიანობები, პელმინთოსპო- რიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, ნაცარი	“	-(1)	-(-)
		0.75-1	შვრია	პელმინთოსპო- რიოზული ფესვის სიდამპლე, მაგარი გუდაფშუტა, მურა- წითელი ლაქიანობა, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
		1	საშემოდგომო ჭვავი	პელმინთოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები,			
დ)	გიზმო, კს 60 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ) “ნუფარიმი გმზხდა კო კგ ” ავსტრია 751	0.4-0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, პელმინ- თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა	-(1)	-(-)
		0.4-0.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4-0.5	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
ე)	დივიდენდი სტარი 036 კს 30+6.3 გ/ლ (დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლი) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 473/495/10	1	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მაგარი, მტვრიანა გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, პელმინთოსპო- რიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დასველების მეთოდით, უმუშაოდ დათესვის წინ ან წინასწარი (ერთ წლამდე) (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1.5	ქერი	მაგარი, მტვრიანა და მაგარი გუდაფშუტა, ბადურა და ხაზურა ლაქიანობები, პელმინთოსპო- რიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, ნაცარი	“	-(1)	-(-)



		0.75-1	შვრია	ჰელმინთოსპო- რიოზული ფესვის სიდამპლე, მაგარი გუდაფშუტა, მურა- წითელი ლაქიანობა, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
		1	საშემოდგომო ჰევაი	ჰელმინთოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები,	“	-(1)	-(-)
ვ)	დითანი მ-45, სფ 800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4) “დაუ აგროსაენსი, ექსპორტ ს.ა.ს.” საფრანგეთი 111/08/13	5-8	თუთა (თესლი)	თესლის ობი, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე, აღმონაცენების ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
ზ)	ემესტო კვანტუმი სდკ 273,5 207+66,5 გ/ლ (+კლოთიანიდინი+პენფლუფენი) (თ), (1) “ზაიერი კროპსაიენსი აგ” გერმანია 955	0.25-0.3	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (10-20 ლ/ტონა თესლზე)	-(1)	3(1)
თ)	ვედალ დინეცსი, ფთშ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმს სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 999	1	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1.5	ქერი	მტვრიანა, მაგარი, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
		0,75-1	შვრია	ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე	“	-(1)	-(-)
		1	ჰევაი	ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე	“	-(1)	-(-)
		2	სიმინდი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)

	ვალსაზები, სგ						
ი)	800 გ/კგ (მანკოცები) (თ), (4) "სტოქტონ ქემიკლ კორპორეიშნ" აშშ 514	5-8	თუთა (სათესი ნაკვეთები)	თესლის ობი, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე, აღმონაცემების ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(1)
კ)	ინდაზოლი, ეკ 500 გ/ლ (კარბენდაზიმი) (4) "პარიჯატ აჯენსის" ინდოეთი 565	1-1.5	საგაზაფ-ხული და საშემოდგო-მო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტა, ცერკოსპორელო-ზური და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი (ფუზარიოზი და სხვა)	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(1)
		1-1,5	რაფსი	ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(1)
		1-1,5	სოია, ბარდა, ცერცველა	თესლის ობი, ასკოქიტოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(1)
						-(1)	
		5	თუთა (სათესი ნაკვეთები)	აღმონაცემის ჩაწოლა, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე,	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში		-(1)
ლ)	ინშურ პერფორმი, დვს 40+80 გ/ლ (პირაკლოსტრობინი+ ტრიტიკონაზოლი) (თ) "ზასფი სე" გერმანია 773	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტები, ფესვის ყელის სიდამპლეები, ფუზარიოზები, სეპტორიოზი, ბადისებური და ზოლებიანი ლაქიანობები, პითიუმში, ალტერნარიოზი, პირენოფოროზი	თესლის შეწამვლა თესვის წინ და დათესვამდე 1 წლით ადრე	-(1)	-(1)
						-(1)	
				მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტები, ფესვის ყელის სიდამპლეები, ფუზარიოზები,	თესლის შეწამვლა		-(1)



		0.5	სიმინდი	სეპტორიოზი, ბადისებური და ზოლებიანი ლაქიანობები, პითიუმი, ალტერნარიოზი, პირენოფოროზი	თესვის წინ და დათესვამდე 1 წლით ადრე		
მ)	კარნავალი 50 სფ 500 გ/კგ (იპროდიონი) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტომ. იმლ. იტშ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 876	4.0	შხესუმზირა	აღმონაცენების თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლე, ფომოფისისი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		8.0	თუთა	თესლის ობი, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე, აღმონაცენთა ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე), თესლის შეწამვლამდე 2-3 დღით თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
ნ)	კონილი, სკ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) “საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 529/09	1.5-2	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1.5-2	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი		-(1)	-(-)
ო)	მატადორ გრანდი, სდვ 200+100+100 გ/ლ (იმიდოლოპრიდი + მეტალაქსილი + ციმოქსანილი გ/ლ) (1) შპს „კომპანია „უკრაინა“ უკრაინა შპს „გეოუკრაინა“ საქართველო 1023	1	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
	მაქსილი-8, სფ						



პ)	10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ) "სტოქტონ აგრიმორი აგ" შვეიცარია 587	1.5-2	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი	მტერიანი და მაგარი გუდაფშუტა, პელმინტოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი, ნაცარი	თესლის შეწამვლა მშრალი მეთოდით	-(1)	-(-)
ჟ)	პლატინ კარბენდაზიმი, სფ 500 გ/კგ (კარბენდაზიმი) "პლატინ ქიმა მუმესილიკ ვე დის ტიკ. ლტდ. სტი" თურქეთი 861	1,5	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტერია გუდაფშუტა, ცერკოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი, ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა (10ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(7)
		1,5	რაფსი	ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1,5-3	სოია, ბარდა, ლობიო, ცერცველა	თესლის ობი, ასკოზიტოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		5	ხეხილი, თუთა, ტყის სანერგეები (სათესი ნაკვეთები)	აღმოცენის ჩაწოლა, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
რ)	პრემიუმი, კს 140+150 გ/ლ (იმიდოკლოპრიდი+ პენციკურონი) (1) "ნანჯინგ ესენგ ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ" ჩინეთი 790	1-1.3	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი, ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ვერცხლისფერი და ჩვეულებრივი ქეცი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)
ს)	პრესტიჟი, 290 კს 140 + 150 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი + პენციკურონი) (1) "ზაიერი კროპსაიენსი აგ" გერმანია	1	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი, ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ვერცხლისფერი და ჩვეულებრივი ქეცი	სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება	-(1)	-(-)



	444/04/09						
ტ)	რაქსილი კს 60 60 გ/ლ (ტებუონაზოლი) (თ) “ზაიერი კროპსაიენსი აგ” გერმანია 162/04/09	0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.4	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
უ)	რაქსილი ულტრა სდკ 120 120 გ/ლ (ტებუონაზოლი) (თ) “ზაიერი კროპსაიენსი აგ” გერმანია 830	0.2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.25	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი	“	-(1)	-(-)
		0.25	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
ფ)	როდოლიტი სკ 60 გ/ლ (ტებუონაზოლი) (თ) “მარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 629/13	0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპ- ტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.4	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)



ქ)	როვონე, 50 სფ 500 გ/კგ (იპროდიონი) (4) “საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი 584/13	4.0/13	მზესუმზირა	აღმონაცენების თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლე, ფომოფსისი	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		8.0	თუთა	თესლის ობი, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე, აღმონაცენთა ჩაწოლა	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე), თესლის შეწამვლამდე 2-3 დღით თესლის დაღებობა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
ღ)	როვრალი აკვაფლო, სკ 500 გ/ლ (იპროდიონი) „ბასფი აგრო ზ.ვ.“ შვეიცარია 849	0.3-0.4	ნიორი, ხახვი	სიდამპლეები შენახვის პირობებში (სკლეროტინიოზი, ფუზარიოზი, ფომოზი)	ბოლქვების დამუშავება პრეპარატის სუსპენზიით შენახვამდე (მოსავლის აღების შემდეგ)	-(1)	-(-)
		0.38-0.4	კარტოფილი (სათესლე)	რიზოქტონიოზი, მშრალი და სველი სიდამპლე, ქეცი	ტუბერების დამუშავება დათესვის წინ	-(1)	-(-)
		0.38-0.4	კარტოფილი (სათესლე)	ფუზარიოზი ფომოზი	ტუბერების დამუშავება შენახვამდე	-(1)	-(-)
ყ)	რუბინი 2 ფთმ 20 გ/ლ (ტებუკონაზოლი) (თ) “კიორუმა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.” თურქეთი 824	1,5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტერიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ-თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე	-(1)	-(-)



		1,5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		1,5	შვრია,ჭკავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
შ)	სელესტ ტობი 312.5 კს 312.5 გ/ლ (თიამეთოქსამი 262.5+ფლუდიოქ- სანილი 25+ დიფენოკონაზოლი 25) (თ), (1) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 755	1.5-2	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მაგარი, მტვრიანა, ჯუჯა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვის წინ (10ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
წ)	სსერტიკორი 50 კს 50 გ/ლ (მეფენოქსამი 20 გ/ლ+ტებუკონაზოლი 30 გ/ლ) (თ) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ” შვეიცარია 895	0.75-1	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- ტოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, პიტეიუმი, თესლის ობი, მ.შ. ალტერნარიოზი, თესლის ობი, ნაცარი	თესლის თესვისწინა ან წინასწარი (1 წლამდე) შეწამვლა. არ არის რეკომენდებული თესლზე,რომელსაც გააჩნია 16%-ზე მეტი ტენიანობა	-(1)	-(-)
		0.75-1	ქერი	ქვის გუდაფშუტა,მტვრიანა გუდაფშუტა, ბადურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები,თესლის ობი, მ.შ. ალტერნარიოზი,	“	-(1)	-(-)
		0.75-0.9	შვრია	მტვრიანა გუდაფშუტა, ბადურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თესლის ობი, მ.შ. ალტერნარიოზი, წითელ- მურა ლაქიანობა	“	-(1)	-(-)
ც)	სონფიქსი 1 ფთშ 10 გ/კგ (დინიკონაზოლი) (თ)	1,5	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)



	„აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილავლარი ტომ. იმლ. იტშ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.“ თურქეთი 1001						
		1.5	ქერი	მტვრიანა, მაგარი, ქვა გუდაფშუტა, ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე, თესლის ობი		-(1)	-(-)
		0.75-1	შვრია	ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლე		-(1)	-(-)
		1	ჭვავი		“	-(1)	-(-)
		2	სიმინდი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)
დ)	ცხუპერვინი, კს 50 გ/ლ (ფლუტრიაფოლი 30 გ/ლ+ თიაბენდაზოლი 45 გ/ლ) (თ) შპს „კომპანია „უკრაინა“ უკრაინა შპს „გეოუკრაინა“ საქართველო 896	1-1,8	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია, ჭვავი	სეპტორიოზი, ჰელმინთოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ობი, ნაცარი	თესლის თესვისწინა შეწამვლა (8-10 ლ წყალი/1 ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1,8	შხესუმზირა	თესლის ობი, ფომოზი, პერენოსპოროზი, ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლეები	“	-(1)	-(-)
		1,8	ბარდა.ლობიო	თესლის ობი, ნაცრისფერი და თეთრი სიდამპლეები	„	-(1)	-(-)
ე)	ტეზიკური ფთშ 060, ფთშ (სკ) 60 გ/ლ (ტეზიკონაზოლი) (თ) „საფა ტარიმი ა.ს.“ თურქეთი 666	0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინთოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ობი, ნაცარი, თესლის ობი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე (5ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.4	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.4	შვრია,ჭვავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)



ქ)	ტეზუჯი 060 ფთშ 60 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი) (თ) "კორუმბა კლორ ალკალი სანაი ვე ტიკარეტ ას" თურქეთი 825	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის ოზი, ნაცარი, თესლის ოზი	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე (5ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		0.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ოზი,	"	-(1)	-(-)
		0.5	შვრია,ჭკავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	"	-(1)	-(-)
ბ)	ფინალი, სკ 500 გ/ლ (კარბენდაზიმი) (4) "სინოხემ ნინგზო ლტდ" ჩინეთი 707	1-1.5	საგაზაფ-ხულო და საშემოდგო-მო ხორბალი, ქერი	მაგარი და მტვრიანა გუდაფშუტა, ცერკოსპორელო-ზური და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლეები, თოვლის ოზი (ფუზარიოზი და სხვა)	თესლის შეწამვლა (10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1,5	რაფსი	ფესვის სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-8 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		1-1,5	სოია, ბარდა, ლობიო, ცერცველა	თესლის ოზი, ასკოქიტოზი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე	თესლის შეწამვლა (5-10 ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)
		5	ხეხილი, თუთა, ტყის სანერგეები (სათესი ნაკვეთები)	ადმონაცენის ჩაწოლა, ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე,	თესლის შეწამვლა თესვის წინ დასველების მეთოდით ან ჩასველებით (4 ლ/ტ თესლზე) შეწამვლის წინ 2-3 დღით ადრე თესლის დაღობვა გამდინარე წყალში	-(1)	-(-)
გ)	ჯენსილი ფთშ 060, 60 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი) (თ) "აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი	0.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი	მტვრიანა, მაგარი გუდაფშუტა, სეპტორიოზი, ჰელმინ- თოსპორიოზული და ფუზარიოზული ფესვის სიდამპლე-ები, თოვლის	თესლის შეწამვლა დათესვამდე 7-14 დღით ადრე (5ლ/ტ თესლზე)	-(1)	-(-)



ტომ. იმლ. იტმ.იშრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”				ობი, ნაცარი, თესლის ობი			
თურქეთი							
1002							
		0.5	ქერი	მტვრიანა, ქვა გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლეები, ნაცარი, თესლის ობი,	“	-(1)	-(-)
		0.5	შვრია, ჭვავი	მტვრიანა გუდაფშუტა	“	-(1)	-(-)

6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ბიოლოგიური ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტა კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავე ბელი ობიექტი	მავნებელი, დაავადება	გამოყენების ხერი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1.	ინსექტიციდები:						
ა)	ალგამეკი 1.8, ეკ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) “აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოპ. იმლ. იტპ.იპრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.” თურქეთი 855	0.75-1.5	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენალმეები, ფსილები არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	7(1-2) 7(1-3)	2(1)
				ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის	7(2-3)	



		0.6-1.2	ვაზი		ეკონომიური ზღვარის გათვალისწინებით		2(1)
				ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	7(1-2)	
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონო- მიური ზღვარის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხდებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	7(1-2)	2(1)
				ფარიანები ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (I ასაკის მატლები)		
				ჩრჩილი			
		0.3-0.5	კომბოსტო	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნებისას, კვერცხდების გამოჩენისთანავე	5 (1-2)	2 (1)
				ფოთლის მუნაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ		
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხდებიდან	1(2)	1(-)



		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ზახჩის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14 დღიანი ინტერვალით	5(2) 5(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ზახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფითლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	5(1-2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	"	5(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები, ზუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	"	7 (1-2)	3(-)
		1-1.5 0.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი) ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	7(3)	3(-)
ბ)	გრინ გარდ სკ პრემიუმი, სკ 100 გ/ლ (Metarhizium acridum Fl- 985) „ზასფ აგრიკალჩერალ სპეციალიტის ლიმიტედ“- დიდი ბრიტანეთი 1045	0.5	სამოვრები, სათიბები	კალიები	შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩენისა და განვითარებისას , კალიების დაფრთიანებადღე. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(1)	7(3)
					შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის I,II,III ასაკის მატლების წინააღმდეგ 7-8 დღიანი ინტერვალით		



		1.2-2.4	პამიდორი, ბადრიჯანი	კოლფის ჭია კომბოსტოს ხვატარი	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნეზოლის ყოველი თაობის 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით	5(1)	
		1.2-1.5	ნესვი, საზამთრო	ჩრჩილი, ალურები, ფოთლიხვეციები	“	5(1-2)	
		0.5-1	სალათა	ფოთლიხვეციები	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში	5(1-2)	5(1)
		1	საგაზაფხულო ხორბალი	მარცვლეულის ხვატარი	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 100 თავთავზე 20 ინდივიდის (უმცროსი ასაკის მატლები) რაოდენობისას	5(1)	-(1)
		0.5-1.5	შაქრის ჭარხალი, სუფრის, საკვები ჭარხალი, იონჯა, მზესუმზირა, სტაფილო	მდელოს ფარვანა	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1-2)	5(1)
		0.5-1.5	ქალაქის მწვანე ნარგაობა, დეკორატიული მცენარეები (ვარდი)	ზაფხული- შემოდგომის ქერცლფრთიანთა კომპლექსი მაგნეზოლები (მზომელები, ფოთლიხვეციები)	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	5(1)
		2	ასკილი	ფოთლიხვეციები, ოქროყუდა, აბრეშუმხვეცია			
			სამკურნალო	მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი-გამა	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8	5(1-3)	



		0.5-2	მცენარეები (საღებო, ხარისვარდა		დღიანი ინტერვალით		
		1-1.2	კატაბალახა, გულყვითელა (კალენდულა)	მდელოს ფარვანა, ხვატარი	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ,	5(1)	5(1)
		1.2	გვირილა სამკურნალო	მდელოს ფარვანა	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-4 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	
		0.6-2.4 (ა)	წიწვიანები	აღმოსავლური რგოლური პარკხვევია, ფიჭვის პარკხვევია	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1-2)	5(1)
		1.2-2.4 (ა)	მუხა და სხვა ფოთლოვანი ჯიშები	მუხის ფოთლიხვევია	მატლების წინააღმდეგ		
		1.8-3.6 (ა)		მზომელა		-(1-2)	5(1)
		0.5-2.4 (ა)	თელა	თელის მზომელა, ხეხილის ფოთლიხვევია	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ		
დ)	ვერტამექტინ ფორტე, წდგრ 50 გ/კგ (აბამექტინი) (თ), (1) „დევა აგრო გმზხ“ გერმანია 1063	0.16	პომიდორი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა ფოთლის მენაღმე ჩრჩილები	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის გამოჩენისთანავე 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა	3 (3)	3(-)
		0.16	კიტრი	ბახჩის ბუგრი ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესუბრება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის გამოჩენისთანავე 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა	3(3)	3(-)



ე)	ვერტიმეკი, ვვ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 566/10	1-1.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	3(3)	3(-)
		0.5	ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	"	"	3(3)	3(-)
		0.75-1.5	ვაშლი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	"	არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2(1-3)	2(1)
		0.75-1.5	მსხალი	ტკიპები, ფსლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	კომბოსტო	ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნების ას, კვერცხების გამოჩენისთანავე	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	"	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	"	ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ	2 (1-2)	2(1)
		0.6-1.2	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნების ეკონომიური ზღვარის გათვალისწინებით	2(2-3)	2(1)
					შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ		



		0.6-1.2	“	ყურძნის ჭია		2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების მავნეობის ეკონომიური ზღვარის გათვალისწინებით, პირველი კვერცხებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (ასაკის მატლები)	2(1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის I ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხებიდან	1(2)	1(-)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი, წიწაკა(ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე	3(2)	3(-)
		0.3-1.2	L	ზახჩის ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისთანავე 14 დღიანი ინტერვალით	3(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ზახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლების გამოჩენისთანავე	3(1-2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	”	2(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატიული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები, ბუერები, სათბურის ფრთათეთრა	”	3 (1-2)	3(-)
	ლეპიძინი სკ ზა-2000 აე/მგ (Bacillus thuringiensis, var. Kurstaki, შტამი BA1,						



ვ)	სპორთვან-კრისტალური კომპლექსი) შპს " ბიოაგრო-მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი" საქართველო 1000	2-3	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, თხილი	ვაშლის და ხეხილის ჩრჩილები (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღ-მდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით	2(1-2)	2(1)
		2-3	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, თხილი	ამერიკული თეთრი პეპელა (1-3 ხნოვანების მატლები)	"	2(1-2)	2(1)
		2,5	დეკორატიული მერქნიანი მცენარეები	ოქროკუდა, მზომელები, გაზაფხულის ჯგუფის ფოთლიხვევი ეზი, პარკიხვევიები (1-3 ხნოვანების მატლები)	"	2(1-2)	2(1)
		3-4	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურება მატლების მასობრივი გამოსვლისას მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ, 10-14 დღიანი ინტერვალით	2(1-3)	2(1)
		2-3	ხურტკმელი, მოცხარი, ჟოლო, მარწყვი, მახველი, ცირცელი მავნაყოფიანი	ფოთლიხვევი ეზი, ხურტკმელის ალურა, ხურტკმელის ხერხია (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღ-მდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით	2(1-2)	2(1)
		1	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, იონჯა, მზესუმზირა, სტაფილო, კომბოსტო	მდელოს ფარვანა (1-3 ხნოვანების მატლები)	1-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით	2(1-2)	2(1)
		2-3	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი	ტუბერების ჩაძირვა 1,5-2% სამუშაო ხსნარში შენახვის წინ, ხარჯი - 100ლ/10-15ტ ტუბერზე	-(1)	-(1)
		2-4	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პეპლების ფრენის დაწყებიდან 8-10 დღის შემდეგ, 1-2 დამუშავება 5-7 დღეში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		2-3	საგაზაფხულო ხორბალი	მარცვლეულის ხეატარი (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 100 თავთავზე 15- 20 ინდივიდის (უმცროსი ასაკის მატლები) რაოდენობისას	2(2)	-(1)
						2(1-2)	



		2.5		კომპოსტის და თალგამის თეთრულები (1-3 ხნოვანების მატლები), კომპოსტის ალურები, ჩრჩილები (1-2 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის ყოველი თაობის წინააღ-მდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით		2(1)
		3-4	კომპოსტო და სხვა ბოსტნეული	ხვატრები(1-2 ხნოვანების მატლები)		2(2)	
		2-3	მუხა	ოქროკუდა (2-3 ხნოვანების მატლები), მუხის მწვანე ფოთლიხვევია (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1)	-(1)
		3-4	მუხა, არყი	არაფარდი პარკხვევია (1-3 ხნოვანების მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	-(1-2)	-(1)
		3-4	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია (1-3 ხნოვანების მატლები), მონაზონა, ფიჭვის მზომელა და ფიჭვის ხვატარი (1-2 ხნოვანების მატლები)	“	-(1)	-(1)
		3-4	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ზაფხულ- შემოდგომის ქერცფრთიანთა კომპლექსი მაგნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(2)	2(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2	ხარისვარდა	ხარისვარდასი და მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი- გამა (1-3 ხნოვანების მატლები),	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1-2)	5(1)
		2-3	კატაბალახა	მდელოს ფარვანა (1-3 ხნოვანების მატლები),	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(2)	5(1)
		2-3	ბულაყვითელია (კალენდულა))	მდელოს ფარვანა, ხვატრები (1-3 ხნოვანების მატლები),	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-4 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(2)	5(1)
		2-3	გვირილა სამკურნალო	“	“	5(2)	5(1)
		2-3	ვარდი ეთერზეთოვანი	მოზამთრე მზომელა, ფოთლისხვევი ები (1-2 ხნოვანების მატლები)	“	2(1-2)	5(1)



ზ)	ლეპიდოციდი სკ-მ ბა-2000 აე/მგ ((Bacillus thuringiensis , var. Kurstaki სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი) (4) “მპს სგ სიბიბიოფარმი” რუსეთი მპს „გეორგიკა+“ საქართველო 204/08/14	0.5-1	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი	ვაშლის და ხეხილის ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით	5(1-2)	5(1)
		1	ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, ალუბალი, ბალი, დეკორატიული მერქნიანი ნარგავები	ამერიკული თეთრი პეპელა	“	5(1-2)	5(1)
		1-1.5	“	ოქროვუდა, მზომელები, გაზაფხულის ჯგუფის ფოთლიხვევი	“	5(1-2)	5(1)
		2-3	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფკამია	შესხურება მატლების მასობრივი გა-მოსვლისას მავნებ-ლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ, 10-14 დღიანი ინტერვალით	5(1-3)	5(1)
		1-1.5	ხეხილისა და დეკორატიული მერქნიანი მცენარეები	ამერიკული თეთრი პეპელა არაფარდი პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 3-14 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		3 (ა)	ხეხილისა და ტყის ჯიშები	ამერიკული თეთრი პეპელა არაფარდი პარკიხვევია (მასობრივი გავრცელების დროს)			
					შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში		



		1-1.5	ხურტკმელი, მოცხარი, ჟოლო, მარწყვი	ფოთლიხვევი ები, ხურტკმელის ალურა, ხურტკმელის ხერხია	მაგნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალთ	5(1-2)	5(1)
		1	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, იონჯა, მზესუმზირა, სტაფილო, კომბოსტო	მდელოს ფარვანა	1-2 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალთ	5(1-2)	5(1)
		1	კარტოფილი	კარტოფილის ჩრჩილი	ტუბერების ჩამირვა 1% სამუშაო ხსნარში შენახვის წინ. ხარჯი - 100ლ/15ტ ტუბერზე	-(1)	-(1)
		2-3	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პეპლების ზრენის დაწყებიდან 8-10 დღის შემდეგ, 1-2 დამუშავება 5-7 დღეში მაგნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	5(1-2)	5(1)
		1	საგაზაფხულო ხორბალი	მარცვლეულის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 100 თავთავზე 20 ინდივიდის (უმცროსი ასაკის მატლები) რაოდენობისას	5(1)	-(1)
		0.5-1 1.5-2	კომბოსტო და სხვა ბოსტნეული	კომბოსტოს და თაღამის თეთრულები, ჩრჩილები ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის ყოველი თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალთ	5(1-2)	5(1)
		3(ა)	მუხა	ოქროკუდა, მუხის მწვანე ფოთლიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3(ა)	მუხა, არყი	არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3 (ა)	მუხა და სხვა ფოთლოვანი ჯიშები	მოზამთრე ცქელეფია მზომელები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	-(1)
		3 (ა)	ფიჭვი	ფიჭვის პარკხვევია	“	-(1)	-(1)
		3 (ა)	“	მონაზონა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების	-(1)	-(1)



					წინააღმდეგ		
		3	ქალაქის მწვანე ნარგავები	ზაფხულ-შემოდგომის ქერცლფრთიანთა კომპლექსი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	-(1)	5(1)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2	(საღები	საღების და მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი-გამა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ, 7-8 დღიანი ინტერვალით	5(1-3)	5(1)
		0.5	ხარისვარდა	ხარისვარდასი და მოზამთრე ხვატარი, ხვატარი-გამა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1-2)	5(1)
		1	კატაბალაზა	მდელოს ფარვანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	5(1)
		1.2	გულყვითელა (კალენდულა)	მდელოს ფარვანა, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-4 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	5(1)
		1.2	დიდი კამა, ფშნის კკალი	მდელოს ფარვანა, ფშნის და იონჯას ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(1)	5(1)
		1.5	სამკურნალო მატრიკარია	მდელოს ფარვანა	“	5(1)	5(1)
		1.2	გვირილა სამკურნალო	“	“	5(1)	5(1)
		1.5	ვარდი ეთერზეთოვანი	მზომელები, ფოთლისხვევი ები	“	5(1-2)	5(1)
		2	ასკილი	ფოთლისხვევიები, ოქროკუდა, აბრემუმა რკხვევიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	5(1)	5(1)
		1.5	ძალყურძენა	მოზამთრე ხვატარი	შესხურება 2-3 ფოთლის ფაზაში 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ	5(2)	5(1)
		0..3-0..4	ვაშლი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა წითელი ტკიპა ბუგრები, ფოთლის მენაღმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლების	3(1-@4)	2(1)
	პროკლეიმი 05 წზგრ, 50 გ/კგ				გამოჩენისთანავე, 7-14 დღიანი ინტერვალთ. ხარჯვა-400- 1000		



თ)	(ემაშექტინი ბენზოატი)			არაფარდი პარკხვევია	ლ/ჰა		
	(თ),(1)			ფოთლიხვევები	შესხურება ვემეტაციის		
	"სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ"	0..3-0.4			პერიოდში I-II-III კვერცხდების გამოჩენისთანავე.	3(1 -4)	2(1)
	შევიცარია		"		ბარჯვა-400- 1000 ლ/ჰა		
	756			ვაშლის ნაყოფქამია	მატლების გამოჩენისთანავე 7- 14 დღიანი ინტრევალით		
		0..3-0.4	"		ბარჯვა-400- 1000 ლ/ჰა	3 (1-3)	2(1)
		0..3	კომბოსტო	ჩრჩილი		7(1-2)	2(1)
		0..3-0.4	"	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვემეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშანებისა და კვერცხდების გამოჩენისთანავე. ბარჯვა-571 ლ/ჰა	7(1-2)	2(1)
		0.3	კომბოსტო	ფოთლის მენადმეები	კვერცხდების გამოჩენისთანავე შესხურება ვემეტაციის პერიოდში	2(1-2)	2(1)
		0..3-0.4	პომიდორი ღია გრუნტი	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვემეტაციის პერიოდში მანებლის გამოჩენისთანავე 7-14 დღიანი ინტრევალით. ბარჯვა- 400-1000 ლ/ჰა	3(1-4)	3(-)



		0.4	კიტრი (დახურულ გრუნტში)	ბუგრი, სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-1800 ლ/ჰა	2(2)	3(-)
		0.3	კიტრი ლია გრუნტი	"	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნეზლის გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 500-800 ლ/ჰა	7(1-2)	3(-)
		0.3-0.4	ბახჩელი კულტურები ნესვი საზამთრო	ბახჩის ბუგრი ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები "	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 600 ლ/ჰა	7(1-2) 7(4-6)	3(-) 3(-)
		0.3-0.4	სიმინდი	მარცვლეულის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნეზლების გამოჩენისთანავე 7- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა -500-800 ლ/ჰა	7 (1-2)	2(1)
ი)	სპინტორი, სკ 240 გ/ლ (სპინოსინ A + სპინოსინ D) (თ), (1)	0.3- 0.5	კვიტრი პამიდორი	თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3-0.4% სამუშაო ხსნარით 7-	3 (2)	2(1)



	"დაუ აგრი საენსესი" საფრანგეთი 612/13		(დახურული გრუნტი)		10 დღიანი ინტერვალით		
		0.3-1.2	წიწაკა მზადრიგანი (დახურული გრუნტი)	თრიფსები	"	5 (2-4)	2 (1)
		0.1-0.15 0.2-0.3	კომბოსტო	კომბოსტოს და თაღამის თეთრულები კომბოსტოს ჩრჩილი კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვებეტაციის პერიოდში	3(2)	2 (1)
		0.15-0.3	ვაზი	ფოთლიხვევიები ყურძნის ჭია აბლაბუდიანი ტკიპა	ერთი შესხურება ყურძნის ჭიის თითოეული თაობის მიმართ, მატლების გამოჩენისთანავე (I- III)	16(3)	2 (1)
		0.15-0.3	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამიები	შესხურება ვებეტაციის პერიოდში	7(3)	2 (1)
		0.2-0.3	ატამი, ქლიაფი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია	"	7(3)	2 (1)
		0.2-0.3	თხილი თუთა	ამერიკული თეთრი პეპელა	"	7(3)	2(1)
		0.2-0.3	პამიდორი	ჩაშლის ხვატარი კოლოფის ჭია	"	7(2-3)	2 (1)
		0.15-0.3	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო (1-4 ასაკის მატლები) კარტოფილის ჩრჩილი	შესხურება ვებეტაციის პერიოდში I-IV ხნოვანების მატლების გამოჩენისთანავე	15(2)	2 (1)
		0.2-0.75	დეკორატიული მცენარეები	თრიფსები ფრთათეთრა	შესხურება ვებეტაციის პერიოდში 0.4-0.5% სამუშაო ხსნარით 7- 10 დღიანი ინტერვალით	5(2-4)	2 (1)
კ)	ტორპედო 18, კვ 18 გ/ლ (აბამექტინი) (თ), (1) "პექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს." თურქეთი 609/13	1-1.5	ყვავილოვანი კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდიანი ტკიპა, კალიფორნიის თრიფსი	შესხურება ვებეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით	3(3)	3(-)
					L"		



		0.5	ქოთნის კულტურები (დახურული გრუნტი)	“		3(3)	3(-)
		0.75-1.5	ვაშლი	ტკიპები, ბუგრები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	არაფარდი პარკხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2(1-3)	2(1)
		0.75-1.5	მსხალი	ტკიპები, ფსილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლების გამოჩენისთანავე	2(1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	კომბოსტო	ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველი ნიშნების ას, კვერცხდების გამოჩენისთანავე	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	“	თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II-III ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ	2 (1-2)	2 (1)
		0.3-0.5	“	ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროებისამებრ	2 (1-2)	2(1)
		0.6-1.2	ვაზი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლების გამოჩენისთანავე და შემდეგი მავნეობის ეკონომიური ზღვარის გათვალისწინებით	2(2-3)	2(1)
		0.6-1.2	“	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	ციტრუსი	ტკიპები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლების ეკონომიური ზღვარის გათვალისწინებით, პირველი	2(1-2)	2(1)



					კვერცხებიდან ტკიპების გამოჩენისთანავე		
		0.75-1.5	“	ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ	2(1-2)	2(1)
		0.75-1.5	“	ცრუფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში I-II თაობის მატლების წინააღმდეგ (ასაკის მატლები)	2(1-2)	2 (1)
		0.6-1.2	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლის I ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ, 50% გამოსული კვერცხებიდან	1(2)	1(-)
		0.3-1.2	პომიდორი, კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლის გამოჩენისთანავე	3(2)	3(-)
		0.3-1.2	“	ზახჩის ბუგრი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლის გამოჩენისთანავე 14 დღიანი ინტერვალით	3(1-2)	3(-)
		0.3-1.2	ზახჩეული კულტურები	ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლების გამოჩენისთანავე	3(1-2)	3(-)
		0.5-1.2	ხენდრო	ორლაქიანი აბლაბუდიანი ტკიპა	“	2(1-2)	2(1)
		0.6-1.2	დეკორატი-ული მცენარეები	მენადმე ჩრჩილები, ბუგრები, სათბურის ფრთათეთრა	“	3 (1-2)	3(-)
ლ)	ფორეი 76 ბ, სკ ზა-16700 აე/მგ (Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki შტამი ABTS-351, სპოროვან- კრისტალური კომპლექსი) "ვალენტ ბიოსაიენსეს კოოპორეიშნ (აშშ)" აშშ	1,5-2 ,5	წიწვოვნები და ფოთლოვნები, მერქნიანი მცენარეები (ვაშლი, ქლიავი, მსხალი, გარგარი, თუთა, ალუბალი, ბალი, თხილი)	ოქროვუდა ჩრჩილები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავენებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 -10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)



	199/08/13						
		1.5-2,5 (ა)		ამერიკული თეთრი პეპელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5-10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1,5-2,5 (ა)	ტყის მერქნიანი მცენარეები , თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი	არაფარდი პარკიხვევია			
		1.5-2 ,5 (ა)	წიწვოვნები	აღმოსავლური რგოლური პარკიხვევია ფიჭვის პარკიხვევია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 -10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1,5-2,5 (ა)	მუხა	მუხის ფოთლიხვევია			
		1,5-2,5 (ა)			შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველ თაობის 1-3 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 -10 დღიანი ინტერვალით	-(1-2)	5(1)
		1.5-3 (ა)		მზომელა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1-2 ასაკის მატლების წინააღმდეგ 5 -10 დღიანი ინტერვალით		
			თელა	თელის მზომელა		-(1-2)	5(1)
		1,5-2,5 (ა)		ხეხილის ფოთლიხვევია			
		1,5-2	ტყის სანერგეები, დეკორატიული მცენარეები	ფოთლის და წიწვის მრღნელი მავნებელთა კომპლექსი		-(1-2)	5(1)



		1.5-3 (ა)	ქარსაფარი ზოლის მცენარეები,	მრღნელი მაენებელთა კომპლექსი	„	-(1-2)	5(1)
		1,5-2,5	ქალაქის მწვანე ნარგაობა	ქერცლფრთიანი მწერები	„	-(1-2)	5(1)
2.	ფუნგიციდები:						
ა)	ტიმორექს გოლდი, კვ 23.8% (Etheric Oil of Melaleuca Alternifolia, ჩაის ხის ზეთი) „სტოქტონ ქემიკლ გრუპ“ აშშ 530/09	1.3-2.0 % 1000 ლ/ჰა	ვაზი	ნაცარი, ჭრაქი	პროფილაქტიკური შესხურება დაავადების თავიდან ასაცილებლად, შემდეგი შესხურებები ყოველი 7-10 დღის ინტერვალით. მაღალი კონცენტრაციის გამოყენება ხდება პირველივე სიმპტომებისთანავე.. ერიდეთ შესხურებას მაღალი სიჩხის დროს.	-(8)	-(-)
		6.5-8% 200-400 ლ/ჰა	ნესვი გოგრა საზამთრო კიტრი	ნაცარი, ჭრაქი	„	-(8)	-(-)
		1.3-2% 300-1000 ლ/ჰა	კიტრი (დახურული გრუნტი)	ნაცარი, პერონოსპოროზი	„	-(8)	-(-)
		0.3-1.3% 400-600 ლ/ჰა	სტაფილო	ნაცარი, ფიტოფტოროზი	„	-(8)	-(-)
		1.3-2.5 % 400 ლ/ჰა-ზე მეტ	სალბი	ნაცარი, ჭრაქი	„	-(8)	-(-)
		1.3-2.5 %	კარტოფილი				



		500 ლ/ჰა-ზე მეტე	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	„	-(8)	-(-)
ბ)	ჰიპნოზი 05 წებრ, 50 გ/ჰა (ემამექტინი ბენზოატი) (თ),(1) "საფა ტარიმ ა.ს." თურქეთი 1008	2,5	ვაზი	ყურძნის ჭია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ	10(1)	3(-)
		0.3-0.4	პომიდორი (ღია გრუნტი)	ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის გამოჩენისთანავე 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 400-1000 ლ/ჰა	7(1-4)	3(-)
		0.4	კიტრი (დახურულ გრუნტში)	ბუგრი,სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-1800 ლ/ჰა	7(2)	3(-)
		0.3	კიტრი (ღია გრუნტი)	„	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მაგნებლის გამოჩენისთანავე 7 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა - 500-800 ლ/ჰა	7(1-2)	3(-)
		0.3	ბადრიჯანი, წიწაკა (დახურულ გრუნტში)	ბამბის ხვატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	7(1-2)	3(-)
		0.3-0.4	ნესვი	ბახჩის ბუგრი ტკიპები, თრიფსები, ფოთლის მენადმეები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 600 ლ/ჰა	7(1-2) 7(4-6)	3(-) 3(-)
			საზამთრო	„			



ა) დაემატოს 3¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3 ¹ .	ალიონი სკ 500, კს	0,15	ეროვნული ორლეონიანი	ნიადაგის შესხურება სარეველების აღმოცენებამდე (კულტურის დაცვით). ხარჯვა-100 ლ/ჰა.	20(1)	7(3)
	500 გ/ლ					
	(ინდაზიფლამი)					
	(თ)ყ					
	“ზაიერ კროპსაიენსი აგ”		ვაშლი, მსხალი, ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, გარგარი, ალუბალი, ნუში, თხილი, ციტრუსი	აღმოცენებულ სარეველებზე მოქმედებს მხოლოდ კომბინაციაში ბასტა 150 წხ- თან ან გლიფოსატთან იგივე ხარჯვის ნორმებში		
	გერმანია		ვაზი			
	1081				14(1)	

ბ) დაემატოს 5¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5 ¹	ანტისაპა წებრ	1,5	პამიდორი	ეროვნული ორლეონიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	-(7)
	700 გ/კგ						
	(მეტრიბუზინი)						
	(თ)						
	შპს „კომპანია „უკრაინა“						
	უკრაინა						
	შპს „გეოუკრაინა“						
	საქართველო						
	1024						
		1	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	სოიო	“	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0,5-1,5	კარტოფილი	ეროვნული ორლეონიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)

გ) 11-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

11.	ბარნელაველი 70, წდგრ	1.1-1.4	პამიდორი	ეროვნული ორლეონიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება ჩითილების გადარგვამდე	-(1)	-(7)
	700 გ/კგ						
	(მეტრიბუზინი)						
	(თ)						
	“ნანჯინგ ესენც ფაინ- ქემიკლ კო ლტდ”						
	ჩინეთი						



	630/14						
		0.7-0.8	"	"	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზაში	30(1)	20(-)
		1	სოიო	"	სარეველების შესხურება 15-20 დღეში ჩითილების გადარგვიდან	30(1)	7(3)
		1.4-2.1	კარტოფილი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	წიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	7(3)
		0.7-0.8	"	"	სარეველების შესხურება კულტურის 5 სმ-დე სიმაღლისას	-(1)	7(3)

დ) დამატოს 15¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

15 ¹ .	ბოქსერი 48 წი	3-6	ხეხილი				
	480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (3) „დოგალ კიმივეი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.“ თურქეთი 1080		ვაზი ციტრუსი თხილი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		6	არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწები	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი			
		10	გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები, მინდვრის პირები	ბუჩქები და ხეები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე	-(1)	7(3)
		10	საირიგაციო და სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები			

ე) 16-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:



16.	ბრეის სუპერი, გვ 125 გ/ლ (ფლუაზიფობ-პ-ბუთილი) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.” თურქეთი 610/13	0.75-1.5	სოიო, საკვები პარკოსნები, მაქრის, სუფრის ჭარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი, კარტოფილი, კომბოსტო, ხახვი, მხესუმზირა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში მოუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	7 (3)
		0.75-1	კიტრი	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	20 (1)	7 (3)
		0.75-1	ლობიო, ბარდა	ერთწლიანი მარცვლოვნები	“	33 (11)	7 (3)
		1.5-2	სოიო, საკვები პარკოსნები, მაქრის, სუფრის ჭარხალი, პამიდორი სათესი და სარგავი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები (მხოვანი ჭანგა)	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას მოუხედავად კულტურული მცენარის განვითარების ფაზისა	-(1)	7 (3)

ვ) 21-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

21.	გლიგინტი, წმ 480 გ/ლ (გლიფოსატი) (თ), (3) “მარდა კროპექმ ლიმიტედ.” ინდოეთი 631/13	2-4	ხეხილი ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		4-6	ხეხილი ვაზი	მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
		2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარევეების დასათრგუნად	-(1)	-(3)

ზ) 30-ე და 31-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

30.	დიანატი, წმ 480 გ/ლ (დიკამბა) (3) “ზასფი სე”	0.15-0.3	ხორბალი ქერი შვრია	ერთწლიანი ორლებნიანები, მ.შ. გამძლეები მრავალწლიანი	შესხურება მარცვლოვნების ბარტყობის ფაზაში, ერთწლიანი სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში, მრავალწლიანი სარეველების სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 15 სმ-ს. გამოიყენება როგორც	-(1)	7(3)
-----	---	----------	---	---	--	------	------



	გერმანია			ორლებნიანები (ლიქა და სხვ.)	დამოუკიდებლად ასე 2.4დ-თან კომბინაციაში.		
	617/13				სამუშაო ხსნარის ხარჯვა –150-400 ლ/ჰა-ზე		
		0.4-0.8	სიმინდი	“	“	-(1)	7(3)
31.	დიგობურ ტობი, წხ 464 გ/ლ (2.4 დ მეაგა 344 + დიგამა მეაგა 120) (3) “ნიუფარმი გმზხ და კო კვ” ავსტრია 596/13	0.6-0.8	საშემოდგომო ხორბალი ჭევი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ფართოფოთლოვანი სარეცელები ბუჩქნარები და ზაფხული ერთწლიანი გართხუმი სარეცელები	ნათესების შესხურება ადრე გაზაფხულზე კულტურის ადრეების ფაზაში მიღში გასვლამდე	-(1)	7(3)
		1.1.- 1.25	სიმინდი	“”	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზამდე	-(1)	7(3)

თ) დამატოს 43¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

43 ¹ .	ეფდალ კლოპარი 240 ევ 240+60 გ/ლ (კლოდინაფოპ-პროპარგილი+ ანტიდოტი კლოკვინტისეტ-მეცსილი) (თ), (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1037	0.3	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	შვრიუკა	ნათესების შესხურება სარ ევლების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთლი) სტადიაში ნათესების შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მიღში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
-------------------	--	-----	------------------------------------	---------	--	------	------

ი) დამატოს 44¹-ე და 44⁴ -ე პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

44 ¹ .	ეფდალ მეტეორი, სფ 200 გ/კგ (მეტსულფურონ-მეთილი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“	37.5 გ/ჰა	საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია,	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლებნიანი	ნათესების შესხუ-რება აღმოცენების შემდეგ, კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან ბარტყობის დამთავრებამდე. ხარჯვის ნორმა 250-300 ლ/ჰა	-(1)	-()
-------------------	---	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	------	------



	თურქეთი						
	1062						
44 ²	ეფდალ ოქმისტი 240 ეკ 240 გ/ლ (ოქსიდლუორფენი) (თ) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1044	0.5	ხახვი ნიორი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	შესხურება კულტურის 2-3 ფოთლის ფაზაში	-1)	7(3)
		1.0	“	“	ნათესების შესხურება კულტურის 3-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		0,8-1	მზესუმზირა	„	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(1)	ზ7(3)
44 ³	ეფდალ პენალინი 330 ეკ 330 გ/ლ (პენდიმეტალინი) (3) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1038	5-6	სოიო, სიმინდი, თამბაქო, მზესუმზირა, პამიდორი, კომბოსტო, სტაფილო, ნიორი, ბარდა	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე ან ჩითილების გადარგვამდე. ხარჯვა-200-250 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
44 ⁴	ეფდალ ულტრაშიქსი, სე 452, 42 გ/ლ + 6,25 გ/ლ (2,4-დ მყავას რთული 2-ეთილ-ჰექსილის ეთერი+ ფლორასულამი) (თ), (2) „ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.“ თურქეთი 1051	0,45-0,6	საშემოდგომო ხორბალი	ერთწლიანი ფართოფოთლოვანი ორლებნიანი , მ.შ. 2,4-დ და მცპას- მიმართ გამძლე და ზოგიერთი მრავალწლიანი ფესურიანი სარეველები	ნათესების შესხურება გაზაფხულზე კულტურის მილში გასვლის ფაზაში (4 ფოთოლი) და სარეველების განვითარების ადრეულ ფაზებში. ხარჯვა-225-400 ლ/ჰა	53(1)	-(4)

კ) დაემატოს 61¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

61 ¹	კლინ-აპი, ს 480 გ/ლ (გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი, 360 გ/ლ გლიფოსატის მყავაზე გადაანგარიშებით) (3) “ჰექტამ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”	3-4,5	ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, ზეთისხილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები მრავალწლიანი მარცვლოვანი და	მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
-----------------	--	-------	--	--	---	------	------



	თურქეთი	1018	6		ორლებნიანი		
			2-3	მინდერები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ	-(1) 7(3)
			4-6	სიმინდისა და ხორბლის ნაწვერალზე	მრავალწლიანი ორლებნიანი	მომდევნო კულტურების დათესვამდე 3-4 კვირით ადრე	-(1) 7(3)
			10	გზის პირები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები, სადრენაჟო არხები, მინდერების ნაპირები	არასასურველი მცენარეულობა	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე. 1-1.5 % -იანი ხსნარი). ხარჯვის ნორმა 500-800 ლ/ჰა	-(2) 7(3)
			10	ბუჩქოვანი მცენარეები და არასასურველი მერყენიანი მცენარეები	“	მიმართული შესხურება ბუჩქოვან მცენარეებზე	-(1) 7(3)
			2-4	მარცვლოვნები	მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად	-(1) 7(3)

ლ) 63-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

63.	კოკო გოლდი, სფ 500 გ/ჰგ (ატრაზინი 333+პრომეტრინი 167) (3) “აგრიკო გრურ ლტდ” ბულგარეთი 733/14	4-6	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი	ნიადაგის შესხუ-რება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე.	-(1)	-(-)
-----	--	-----	---------	-------------------------------------	---	------	------

მ) 86-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

86.	ნიეოზი, სვ 40 გ/ლ (ნიკოსუ ლფურონი) (თ), (3) “შარდა კროპქემ ლიმიტედ.” ინდოეთი 632/13	1-1.2 5	სიმინდი (სამარცვლე) სასილოსე	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჰანაგა), ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარეველა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთოლი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანე ბში)	-(1)	7(3)
-----	---	---------	------------------------------	--	---	------	------



ნ) დამატოს 89¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

89 ¹ .	პაიამინი 500 წზ 500 გ/ლ (2,4-დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) "სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალექტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1083	1.6-3,0	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, შვრია, ქვავი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
		2,0-2,5	სიმინდი	"	ნათესების შესხურება 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)

ო) 100-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

100.	პრომე გოლდი, სვ 500 გ/კგ (პრომეტრინი) (3) "აგრიკო გრუპ ლტდ" ბულგარეთი 736/14	2.5-3	სათესლე ბარდა, ნიორი მზესუმზირა	ერთწლიანი ორლებნიანი და მაცვლოვნები	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე	-(-)	-(-)
		2.5-3.5	სოიო	"	"		
		3	ლობიო	"	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე 2-3 დღით ადრე	-(1)	-(-)
		2-3.5	კარტოფილი	"	ნიადაგის შესხურება კულტურის აღმოცენებამდე.	20(1)	-(-)
		1.5-3	სტაფილო	"	ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, კულტურის აღმოცენებამდე, ან 12-ნამდვილი ფოთლის ფაზაში.	70(1)	-(-)
		2-4	სიმინდი		ნიადაგის შესხურება დათესვამდე, დათესვასთან ერთდროულად ან კულტურის აღმოცენებამდე.	-(1)	-(-)



პ) 107-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

107.	რივეტი 24 კვ 240 გ/ლ (კარფენტრაზონ-ეთილი) (თ), (4) “ფმს ქემიკალ სპრლ” ბელგია 657/14	85-125 მლ/100 ლ წყალი	ხორობალი ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მშ. 2.4 დ მიმართ გამძლე ფართოფოთიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში და სარეველების ზრდის ადრეულ ფაზებში. სამემოდგომო კულტურებს ამუშავენ გაზაფხულზე. ხარჯვა- 200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)
		80-85 მლ/100 ლ წყალში	ვაზი, თხილი, ატამი, ვაშლი, ქლიავი	ძირებიდან ამონაყარის გასანადგურებლად	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1)	-(3)

ჟ) დამატოს 111^1 და 111^2 კუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	სანსტეპი, სკ 40 გ/ლ (ნიკოსუ ლფურონი) (თ), (3) "სანსეტ ქიმიას ტარიმ ურუნლოერი ვე ალეტლეური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1082	1.25-1.5	სიმინდი	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი (შალაფა, მხოხავი ჭანგა და ზოგიერთი ერთწლიანი ორლებნიანი	შესხურება კულტურის 3-6 ფოთლის ფაზაში და სარვეელა მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზაში (2-6 ფოთილი ერთწლიანებში და 10-20 სმ სიმაღლე მრავალწლიანებში	-(1)	7(3)
111 ¹ .							
	სანფორსი 48 წხ 480 გ/ლ (გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი) (თ), (3) "სანსეტ ქიმიას ტარიმ ურუნლოერი ვე ალეტლეური იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი." თურქეთი 1072	3-4	ზეხილი ვაზი ციტრუსი თხილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი	შესხურება ვეგეტირებულ სარველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით)	-(1)	7(3)
111 ² .							
		6	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები	მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი			
		10					



			გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები,	ბუჩქები და ხეები			
			მინდვრის პირები		შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე	-(1)	7(3)
	10-15		საირიგაციო და სადრენაჟო არხები	წყლის მცენარეები			

რ) დავმატოს 112¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	სერ სუპერი, ევ 50 გ/ლ (კვიზალოფოპ-პ-ეთილი) “სანსეტ ქიმიკა ტარიმ ურუნლერი ვე ალელერი იმაღატ პაზარლამა სანაი ვე ¹ ტიკარეტ ლტდ. სტი.” თურქეთი 1073		შაქრის და სუფრის ჭარხალი, მზესუმზი რა, კარტოფი ლი, ხახვი, სტაფილო, კომბოსტო, სოიო, პამიდორი	ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, მინდვრის სორო, ბურწა)	ნათესების შესხურება კულტურის 2-4 ფოთლის ფაზიდან , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)
		1-1,5	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი (ქანგა მხოხავი)	ნათესების შესხურება სარევეების 10-15 სმ სიმაღლისას , მიუხედავად კულტურის განვითარების ფაზისა	-(1)	-(-)

ს) 113-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

113.	სერტო პლიუსი, წხგრ (ტრიტოსულფურონი 250გ/კგ + დიკამბა 500 გ/კგ) (თ) “ზასფი სე” გერმანია 807	0.15-0.2+ 1 ლ/ჰა „პასტენი“	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ზოობალი, ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2,4 დ-ს და 2მ-4ბ-ს მიმართ გამძლე ლიქას სახეობები (ნარი და სხვა) და ზოგიერთი მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში, ხარჯვა-150-400 ლ/ჰა	60(1)	-(3)
		0.2+ 1 ლ/ჰა „პასტენი“	სიმინდი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მ.შ. 2,4 დ-ს მიმართ გამძლე ლიქას სახეობები (ნარი და სხვა) და მრავალწლიანი ორლებნიანები	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	60(1)	-(3)



ტ) დაემატოს 126¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

	ტოპკაპი 240 ეკ 240+20 გ/ლ (კლოდინაფობ- პროპარგილი+ ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ-მექსილი) (თ), (3) „საფა ტარიმ.ა.ს.“ თურქეთი 1009	0.2 0.3	საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი	შვრიუკა ერთწლიანი მარცვლოვანი (ბურჩხა, ძურწას სახეობა, ღვარძლი)	ნათესების შესხურება სარ ეველების განვითარების ადრეულ (2-3 ფოთოლი) სტადიაში ნათესების შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში, კულტურის მიღში გამოსვლამდე	-(1)	-(3)
--	--	--	---	--	--	------	------

უ) 130-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

130.	ტრუი, 75 წდგრ 750 გ/კგ (ტრიბენურონ- მეთილი) (3) „მარდა კროპქემ ლიმიტედ.“ ინდოეთი 633/13	15-20 გ/კა	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, ჭვავი	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ- ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე	-(1)	-(3)
		20-25 გ/კა	“	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ- ს მიმართ გამძლე “ და მინდვრის ნარი, ხოვერა, ბეგიაური	“	-(1)	-(3)
		10-15 გ/კა	“	ერთწლიანი ორლებნიანი, მათ შორის 2.4 დ- ს მიმართ გამძლე	ნათესების შესხურება სარეველის 2-3 ფოთლის ფაზაში კულტურის ბარტყობის დამთავრებამდე 200 მლ/კა “ ტრენდი-90 “- თან ნარევეში	-(1)	-(3)

ფ) 136-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

136.	ფლუნტი, ეკ 125 გ/ლ (ფლუაზიფობ-პ-ზუთილი) (თ), (3)	2-4	სოიო, ლობიო	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის 4-5 ფოთლის ფაზაში აღერების დამთავრებამდე	-(1)	-(3)
	„მარდა კროპქემ ლიმიტედ.“ ინდოეთი 634/13	4-6	მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი	მრავალწლიანი, ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	7(3)



		4-8.3	მინდერები, სადაც დაითესება სოიო	ერთწლიანი და მრავალწლიანი ორლენიანი და მარცვლოვანი სარეველები	“	-(1)	-(3)
		4-10	მინდერები, სადაც დაითესება მრავალწლიანი მარცვლოვანი ბალახები სათესლედ	“	შესხურება ვეგე-ტირებულ სარევე-ლებზე შემოდგო-მით მოსავლის აღების შემდეგ ან გაზაფხულზე თესვამდე 2-4 კვირით ადრე	-(1)	-(3)
		6-8	მინდერები ყვავილოვანი კულტური სათვის (სათესლე)	“	შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მოსავლის აღების შემდეგ	-(1)	-(3)
			სამკურნალო მცენარეები				
		2-3	(ბაღის პიტნა	მრავალწლიანი და ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	პლანტაციების შესხურება კულ-ტურის გახარების შემდეგ ან მისი 8-10 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		1-1.5	ხარისვარდა	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 4-6 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-4	ანისული)	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის 2-6 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		3-4	გერანი	“	პლანტაციების შესხურება კულტურის გახარების შემდეგ	-(1)	7(3)
		2	კატაბალახა)	“	გაზაფხულის და ზაფხულის ნათესი პლანტაციების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		3-4	ვარდი ეთერზეთოვან-ნი	“	ნიადაგის რიგების მიმართული შეს-ხურება ვეგეტირე-ბულ სარეველებზე	-(1)	7(3)
		2-6	ფიჭვის, ნაძვის, კედრის ნათესები სანერგეებში	ჭანგა და ერთწლიანი მარცვლოვანი მათ შორის ფეტვისნაირები	შესხურება ახლადამოცნებულ სარეველებზე ან ვეგეტაციის მეორე პერიოდში	-(1)	7(3)
		0.75-1	მაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, სტაფილო, ხახვი, რაფსი, მხესუმშირა, პამიდორი, კომბოსტო	ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ნათესების შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		2-4	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ნათესების შესხურება სარეველების 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		1-1.5	კარტოფილი	ერთწლიანი მარცვლოვანი	შესხურება კარტოფილის ფოჩების 10-15 სმ სიმაღლისას სარეველების 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		3	“	მხოხავი ჭანგა	შესხურება კარტოფილის ფოჩების და ჭანგის 10-15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)
		1-1.5	ხეხილი, ციტრუსები, ვაზი	ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება სარეველების 2-4 ფოთლის ფაზაში	-(1)	7(3)
		4-6	“	მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	შესხურება სარეველების 15 სმ სიმაღლისას	-(1)	7(3)



ქ) 149-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

149.	ჰექტაფერმინი, 500 წზ 500 გ/ლ (2,4- დიმეთილამინის მარილი) (თ), (3) "ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს." თურქეთი 611/13	1.5-2.5	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ზორბალი, შვრია, ჭვავი. ქერი	ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები	ნათესების შესხურება კულტურის ბარტყობის ფაზაში	-(1)	-(3)
		1.5-2.5	სიმინდი	"	ნათესების შესხურება კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში	-(1)	20(3)

8. მე-10 მუხლს:

ა) დაემატოს 1¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1 ¹ .	ბონზი 004, სკ 4 გ/ლ (პაკალობუტრაზოლი) (4) „სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“ შვეიცარია 1017	1,5-5,0 მლ/ლ წყალში	დეკორატიული კულტურები ყვავილები	მცენარეების ზრდის რეგულირება (სიმაღლის შემცირება)	შესხურება ან მორწყვა ვეგეტაციის პერიოდში.	-(6-7)	-(-)
------------------	---	-----------------------------------	--	---	---	--------	------

ბ) დაემატოს 3¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3 ¹ .	ეფდალ ზღუგები 20 წზ 20 გ/ლ	30 მლ+20 მლ ტარვეტი	ციტრუსები (მანდარინი)	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 70-80 % ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1)	-(-)
------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	--	------	------



	(პიბერელინის მგაცა)					
	«ტარკიმ ბიტკი კორუმპა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.» თურქეთი 1039	120 მლ+20 მლ ტარვეტი	ფორთოხალი	“	შესხურება ყვავილედი შეკვრის 4-5 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		60 მლ+20 მლ ტარვეტი	ლიმონი	“	შესხურება როცა აღინიშნება პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		60 მლ+20 მლ ტარვეტი	ვაშინგტონის ჯიშის ფორთოხალი	“	შესხურება როცა აღინიშნება პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		90მლ+20 მლ ტარვეტი	გრეიფრუტი	“	შესხურება როცა აღინიშნება პირველი ფერის წვლილება. ხარჯვა 500 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		120 მლ+20 მლ ტარვეტი	Dვაზი (უთესლო)	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება ტარდება როცა 70% ყვავილების დაცვივდა, შემდეგი-10-12 დღეში, ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(2) -(-)
		30 მლ+20 მლ ტარვეტი	ვაზი (საქიშმიშო ჯიშები)	“	შესხურება ტარდება ყვავილების ცვენიდან 4-5 დღეში. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		90-150 მლ+90 მლ ტარვეტი	მსხალი	ინაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, ყინვაგამძლეობის გაზრდა	შესხურება ტარდება როცა 30% ყვავილების გაიხსნება. ხარჯვა 400 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		90 მლ+50 მლ ტარვეტი	აალუბალი, ბალი	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება მასობრივი ყვავილობისას. ხარჯვა -600 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		600-900 მლ+50 მლ ტარვეტი	ატამი	“	შესხურება მასობრივი ყვავილობის ფაზაში. ხარჯვა- 600 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		90-150 მლ+20 მლ ტარვეტი	მარწყვი	ინაყოფების ჩამოყალიბების სტიმულირება, გამძლეობის გაზრდა არასასურველი გარემო პირობებისადმი, მცენარისზრდა- განვითარების გამდიდრება, ნაყოფების რაოდენობის და წონის გაზრდა, დაშლივების დაჩქარება	შესხურება ყვავილის ყუნწების გამოჩენამდე 3-4 კვირით ადრე. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		30-60 მლ	კარტოფილი	მოსავლიანობის გაზრდა და სასაქონლო ღირებულების გაუმჯობესება	შესხურება მასობრივი ყვავილობის დაწყებისას.ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		60-120 მლ+20 მლ ტარვეტი	სალათა	მოსავლიანობის გაზრდა	შესხურება 3-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. ხარჯვა-200- 300 ლ/ჰა	-(1) -(-)
		180 მლ+20 მლ ტარვეტი	წიწაკა	მოსავლიანობის გაზრდა, ნაყოფების დაშლივების დაჩქარება	შესხურება კოკრების ფაზაში და ყვავილობის დასაწყისში. ხარჯვა 200-300 ლ/ჰა	-(2) -(-)
		240-300 მლ+50 მლ ტარვეტი	დეკორატიული კულტურები	გამძლეობის გაზრდა	შესხურება მოჭრილ ყვავილეტზე.	-(1) -(-)



9. მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.	რივეტი 24 ეკ	250-270 მლ/100 ლ წყალში	კარტოფილი	მოსავლის აღების წინ ფოთლების დესიკაცია არა უგვიანეს 7-10 დღისა ფიტოფტოროზის წინააღმდეგ ფუნგიციდით ზოლო დამუშავებისას	-(1)	-(3)
	ეკ 240 გ/ლ (კარფენტრაზონ-ეთილი) (თ), (4) "ფმს ქემიკალ სპრლ" ბელგია 657/14		სასურსათო სათესლე	შესხურება ტუბერების ფორმირების დამთავრების და კანის გაუხეშების პერიოდში	-(1)	-(3)

10. 12-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. ინსექტიციდები და აკარიციდები

	სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი	პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა, კგ/ჰა, ლ/ტა კგ/ტ)	კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი	მავნებელი	გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება	ლოდინის პერიოდი (გამოყენების გერადობა)	დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო
N	1	2	3	4	5	6	7
1.	ადმირალი 10 ეკ 100 გ/ლ (პირიპროქსიფენი) (3) "სუმითომო ქემიკალ აგრო ელროპ ს.ა." საფრანგეთი 635	0.5-0.8	ვაშლი, მსხალი	კალიფორნიის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის მოხეტიალე მატლების წინააღმდეგ, ხსნარის ხარჯვა 1000-2000 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		0.5-0.8	ვაშლი, მსხალი	კალიფორნიის ფარიანა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის მოხეტიალე მატლების წინააღმდეგ, ხსნარის ხარჯვა 1000-2000 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		0.5-1.5	ვაშლი, მსხალი ატამი, ქლიავი	ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ. ხსნარის ხარჯვა 1000-1500 ლ/ჰა	21(1)	7(3)
		3-4	ციტრუსები	ფარიანები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ. ხსნარის ხარჯვა 2000-2500 ლ/ჰა	30(1)	7(3)



		0.2-0.3	კიტრი პამიდორი (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ზღვრის მიხედვით. სსნარის ხარჯვა 800- 1000 ლ/ჰა	3(1)	3(-)
		0.5-0.75	ბადრიჯანი ნესვი კომბოსტო	ფრთათეთრა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნეობის ზღვრის მიხედვით.	14 (1)	7(3)
		0.75- 1.5	დეკორატიული მცენარეები (დახურული გრუნტი)	სათბურის ფრთათეთრა ბუგრები თრიფსები		-(1)	3(-)
2.	დანადიმი, კვ 400 გ/ლ (დიმეთოტი) (1) "კემინოვა ა/ს" დანია 543	1.1-1.9	ვაშლი, მსხალი	ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები ვაშლის ყვავილჭამია	შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ	40(2)	10(4)
		1.1-1.9	ქლიავი, ატამი	ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები	შესხურება ყვავილობის შემდეგ	40(1)	10(4)
		0.5-0.9	ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)	ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინოზები		30(2)	10(4)
		0.8-0.9	თამბაქო	ბუგრები, თრიფსები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	13(4)
		2-3	თუთა	ტკიპები, ცრუფარიანები	შესხურება თუთის აბრეშუმხვევის გამოკვეთის დამთავრების შემდეგ, ნაყოფის საკვებად გამოყენება არ დაიშვება	30(2)	10(4)
		0.9-1.1	ლავანდა	ჭიჭინოზები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		0.7-1.1	კარტოფილი	ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ		20(2)	10(4)
		0.5-0.9	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)	ბაღლინჯოები, ბუგრები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.8-1.2	ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია	მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	სამარცვლე პარკოსნები	ალურები, მემარცვლელები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.5-0.9	შაქრის ჭარხალი	ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები		30(2)	10(4)



		0.5-0.7	სუფრის ჭარხალი	L		30(2)	10(4)
		0.6-1.0	კომბოსტო	ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები		30(1)	10(4)
		1.1-2.0	ვაზი	ტკიპები, ფოთლიხვევები, კოქციდები		20(2)	10(4)
		1.1-1.5	მაგი მოცხარი (სანერგები, სადედეები)	ფოთლიხვევები, ბუგრები		30(2)	10(4)
		0.6-1.1	მარწყვი (სადედეები)	ტკიპები, ბუგრები, ჭიჭინოზები		30(2)	10(4)
		2.3-2.8	ციტრუსები	ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1-2	საძოვრები, ველური მცენარეულ-ობა	კალიები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირეტროიდებთან ერთად კომბინირებული ნაზავით	30(1)	10(4)
3.	დემიტანი, სკ 200 გ/ლ (ფენაზახინი) (1) "გოვან კომერციო ინტერნაციონალ სერვისოს ლიმიტადა" პორტუგალია 456/08	0.3-0.45	ვაშლი, მსხალი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	7(3)
4.	დიმილინი 48 სკ 480 გ/ლ (დიფლუბენზუ- რონი) (3) "კრომპტონ ოუნერიოლ ქემიკალ რეჯისტრეიშნს ლიმიტედ" აშშ 469/05	0.03-0.05	საძოვრები ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები	კალიები	შესხურება კვერცხებიდან მატლების მასობრივი გამოჩეკისას და პირველი ხნოვანების მატლებზე	30(1)	7(3)



		0,09-0,12	სატყეო მეურნეობები	წიწვისა და ფოთლის მღრღნელი მავნებლები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის ადრეულ სტადიაზე	-(1)	7(3)
		0.025-0.1	გავრცელების ადგილები	კოლოები, ბუჩები	დენისნეკვია გავრცელების ადგილებში	-(1)	7(3)
5.	დურსბანი 450 უმშ, ეკ 450 გ/ლ (ქლორიპირიფოსი) (თ), (1) "დაუ აგროსაიენსი, ექსპორტ ს.ა.ს." საფრანგეთი 575	0.5	სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულე-ბის სავარგულები	მასობრივი გამრავლების მწერები კალიები (არაგოგური და გლოგური ფორმები) კუტკალიები, ჭრიჭინები, ხვატრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
6.	ზოლონი, ეკ 350 გ/ლ (ფოზალონი) (თ), (2) "კემინოვა ა/ს" დანია 044/05	1.5-2.0	ზორბალი, ქერი	ჭიაწურბელა, მდელოს ფარვანა, ბუგრები, მარცვლო ვანთა ბუჩები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	-(4)
		3	სოიო	სოიოს ნაყოფჭამია ტკიპები, თრისებები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		1.4	ბარდა	ბარდას ბუგრი		30(2)	10(4)
		1.5-2	კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი	კოლორადოს ხოჭო, ბამბის ხვატარი, კარტოფილის ჩრჩილი		30(2)	10(4)
		1.6-2	გვარყვავი-ლოვანი კულტურები (მხოლოდ სათესლე ნაკვეთები)	რაფსის ყვავილჭამია		-(2)	10(4)
		2.5-3.0	შაქრის ჭარხალი	ჭარხლის ცხვირგრ-მელა, მდელოს ფარვანა, ხვატრები, რწყილები, აბლაბუდა ტკიპა		30(2)	10(4)



		2-4	ვაშლი, მსხალი	ნაყოფჭამია, ფოთლის- ვეეები, ფოთლის მღრღნელი მატლები, ტკიპები		30(2)	10(4)
		0.8-2.8	ქლიავი, ალუბალი	ნაყოფჭამია, ბუგრები, ტკიპები		40(2)	10(4)
		1.6-2.4	ატამი, გარგარი	აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ფოთლიხვევები, ბუგრები, ჩრჩილები		35(1)	10(4)
		1-2.8	ვაზი	ფოთლიხვევები, ტკიპები, ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		4-5	ციტრუსები	ფრთათეთრა, ციტრუსოვნების წითელი ტკიპები, ფარიანები და ცრუფარიანები		40(2)	10(4)
		1.2	ვარდი ეთერზეთო-ვანი	ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ქიჩინოზელა		30(2)	10(4)
		1.6-2	თამბაქო	ბამბის ზეატარი, თრიფსები, ბუგრები, აბლაზულა ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ფოთლების შეტევა დასაშვებია შესხურებიდან მე- 10 დღეს	-(1)	10(4)
		1.4-2.8	იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)	ცხვირგრძელები, ბუგრები, მდელოს ფარვანა, ზეატრები, თრიფსები, ბალინჯოები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პირველი გათიზვის სათესლე ნაკვეთებისათვის	-(2)	-(4)
		3	სამყურა (სათესლე ნაკვეთები)		შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, მეორე გათიზვის სათესლე ნაკვეთებისათვის	-(1)	-(4)
		0.6	კენკროვნები	ზეატარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	48(1)	10(-)
		1.6-2	კომბოსტო	კომბოსტოს ბუერი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დასაშვებია მხოლოდ საგვიანო ჯიშების დამუშავება	40(2)	10(4)
		0.6-0.15	ნესვი	ზახჩას ჭიამაია	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დასაშვებია მხოლოდ საგვიანო ჯიშების დამუშავება	30(2)	10(4)
		1.4-2.3	ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი კულტურები	ფოთლიხვევები, მუხისა და ფიჭვის პარკხვევები, ზამთრის და ცქვლეფია მზომელები, ხერხიები და ფოთლის მღრღნელი სხვა მაწენებლები	შესხურება. მეწველი პირუტყვის ძოვება დასაშვებია 30 დღის შემდეგ, მოზარდეულის-20, ბალახის გათიზვა-15, დასვენება- 8, სოკოების შეგროვება - 42, კენკრის – 55 დღის შემდეგ	-(1)	4(4)
		0.8 მლ/მ ²	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობა-ნაგე- ბოზები და მარცვალგადა- სამუშავებელი მანქანა- იარაღები	მაწენებლები შენახვის პირობებში, ტკიპების გარდა	შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ ² -ზე. საწყობების ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 1 დღე- ღამის შემდეგ დამუშავებიდან	-(1)	1(1)
		1.6 მლ/მ ²	სასაწყობო და მარცვალგადა-		შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ ² -ზე	-(1)	1(1)



			სამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია				
7.	იმიდან 50, სფ 500 გ/კგ (ფოსმეტი) (თ) “გოვან კომერციო ინტერნაციონალ სერვიკოს ლიმიტადა” პორტუგალია 577	1-1.2	ვაზი	ყურძნის ჭია, ვაზის ფქვილისებრი ცრფარიანა, ტკიპები	შესხურბა ვეგეტაციის პერიოდში	30 (1-2)	10(4)
		1-1.5	ვაშლი, მსხალი	ვაშლის ნაყოფჭამია, მენაღმე ჩრჩილები, ბუგრები, ფსილები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხევიები, ცხვირგმელები, რწყილები, ხერხიები		30 (1-2)	10(4)
		1-1.5	ატამი, ქლიავი	ადმოსავლური ნაყოფჭამია, ქლიავის ნაყოფჭამია, ზოლიანი ჩრჩილი, ატმის ბუგრი, ქლიავის ბუგრი, ატმის ცრუფარიანა, ქლიავის ცრუფარიანა, ქლიავის ხერხია		30 (1-2)	10(4)
		2-2.5	ციტრუსი	ციტრუსების მენაღმე ჩრჩილი, ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები		40 (1-2)	10(4)
		0.75-1	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		20 (1-2)	10(4)
8.	ინსეგარი, სფ 250 გ/კგ (ფენქსიკარბი) (თ),(4) “სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ“ შვეიცარია 047/05	0.6	ვაშლი	ვაშლის ნაყოფჭამია	შესხურბა ვეგეტაციის პერიოდში	30(3)	7(3)
		0.6	ვაზი	ყურძნის ჭია		20(1)	7(3)
		0.4	ქლიავი	ქლიავის ნაყოფჭამია		30(3)	7(3)
9.	მარმალი 5 გ, წხგრ 50 გ/კგ (კარბოსულფანი) (3)	10	სიმინდი	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი: მავთულა და ცრუმათულა ჭიები ღრაჭები	ნიადაგში ერთჯერადი მექანიკური შეტანა დათესვის დროს ან მთელ ფართობზე მოზნევა	- (1)	-(-)



	“ფშს ქემიკალ სპრლ” ბელგია 636	35-40		მახრა ნემატოდები			
10.	მეთაბრომი, აირი 980 გ/კგ (ბრომმეთილი) (თ), (1) “ბრომან კომპაუნდს ლტდ” აშშ 184	50 გ/მ2	კიტრი, პამიდორი, წიწაკა, სალათი, კამა, ოხრახუმი, ნიახური	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი	სათბურების, დაცული გრუნტის ნიადაგის გაუვნე-ბელყოფა. სამუშაო უნდა ჩატარდეს სპეციალიზირებუ-ლი საფუმიგაციო რაზმის მიერ, რომელსაც აქვს ლიცენზია	-(1)	-(1)
		20-100 გ/მ2	სასურსათო მარცვლი*, პარკოსნების თესლი*, ფქვილი*, ბურღული, კომბინირებუ-ლი საკვები*	მავნებლები შენახვის პერიოდში	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შე-საბამისად. პრო-დუქციის რეალი-ზაცია მოხდება თუ მასში არაორგანული ბრომიდების შემცველობა არ აღემატება ზღვრუ-ლად დასაშვებ კონცენტრაციას	-(1)	-(1)
		20-25 გ/მ2	ჩაუტვირთავი მარცვალსა -ცავები და მარცვალგა-დასამუშავე-ბელი (წისკვილ-კომბინატები) დეზინფექციის მიზნით	“	ფუმიგაცია ინსტრუქციის თა-ნახმად, სპეციალი-ზებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომ-სახურე პერსონალის დამეგება მხოლოდ სრული დეგაზაციის შემდეგ	-(1)	-(1)
		20-100 გ/მ2	სასოფლო- სამეურნეო პროდუქცია*, თესლი* და სხვ. მცენარეული მასალები*	მავნებლების კომპლექსი	ფუმიგაცია ინსტრუქციის თანახმად. პროდუქციის რეალიზაცია დასაშვებია სრული დეგაზაციის შემდეგ	-(1)	-(1)
		30-60 გ/მ2	სარგავი მასალა		ფუმიგაცია ინსტრუქციის თანახმად, სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ	-(1)	-(1)
		50 გ/მ ³	კიტრი, პომიდორი, წიწაკა, სალათი, კამა, ოხრახუმი, ნიახური	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი	სათბურების, დაცული გრუნტის ნიადაგის გაუვნებელყოფა. სამუშაო უნდა ჩატარდეს სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ, რომელსაც აქვს ლიცენზია.	-(1)	-(1)
		20-100 გ/მ ³	სასურსათო მარცვალი, პარკოსნების თესლი, ფქვილი, ბურღული, კომ-	მავნებლები შენახვის პერიოდში	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად. პროდუქციის რეალიზაცია მოხდება, თუ მასში არაორგანული ბრომიდების შემცველობა არ აღემატება	-(1)	-(1)



			ბინირებული საკვები		ზდკ-ს.		
		20-25 გ/მ ³	ჩაუტვირთავი მარცვალ- საცავები და მარცვალგადა- სამუშავებელი საწარმოები (წისქვილკო) მზინატები	შენახვისას მავნე ობიექტების წინააღმდეგ დეზინფექცია	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად.. სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ, რომელსაც აქვს ლიცენზია. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მხოლოდ სრული დეგაზაციის შემდეგ	-(1)	-(-)
		20-100 გ/მ ³	სასოფლო- სამეურნეო პროდუქცია, თესლი და სხვა მცენარეული მასალები.	მავნებლების კომპლექსი	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად.. პროდუქციის რეალიზაცია დასაშვებია სრული დეგაზაციის შემდეგ	-(1)	-(-)
		30-60 გ/მ ³	სარგავი მასალა		ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად.. სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ	-(1)	-(-)
11.	მეტაბრომი, აირი 1000 გ/კგ (ბრომმეთილი) (თ), (1) "ბრომან კომპაუნდს ლტდ" ისრაელი 184/05	50 გ/მ ³	კიტრი, პომიდორი, წიწკა, სალათი, კამა, თხრაბუში, ნიახური	ნიადაგის მავნებლების კომპლექსი	სათბურების, დაცული გრუნტის ნიადაგის გაუვნებელყოფა. სამუშაო უნდა ჩატარდეს სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ, რომელსაც აქვს ლიცენზია.	-(1)	-(-)
		20-100 გ/მ ³	სასურსათო მარცვალ, პარკოსნების თესლი, ფქვილი, ბურღული, კომ- ბინირებული საკვები	მავნებლები შენახვის პერიოდში	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად. პროდუქციის რეალიზაცია მოხდება, თუ მასში არაორგანული ბრომიდების შემცველობა არ აღემატება ზდკ-ს.	-(1)	-(-)
		20-25 გ/მ ³	ჩაუტვირთავი მარცვალ- საცავები და მარცვალგადა- სამუშავებელი საწარმოები (წისქვილკო) მზინატები	შენახვისას მავნე ობიექტების წინააღმდეგ დეზინფექცია	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად.. სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ, რომელსაც აქვს ლიცენზია. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მხოლოდ სრული დეგაზაციის შემდეგ	-(1)	-(-)
		20-100 გ/მ ³	სასოფლო- სამეურნეო პროდუქცია, თესლი და სხვა მცენარეული მასალები.	მავნებლების კომპლექსი	ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად. პროდუქციის რეალიზაცია დასაშვებია სრული დეგაზაციის შემდეგ	-(1)	-(-)
		30-60 გ/მ ³	სარგავი მასალა		ფუმიგაცია ინსტრუქციის შესაბამისად.. სპეციალიზირებული საფუმიგაციო რაზმის მიერ	-(1)	-(-)



12.	ნეორონი, ეკ 500 გ/ლ (ბრომპროპილატი) (4) "სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ" შვეიცარია 054/08	1.5-3.0	ვაშლი	ტკიპები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	45(2)	7(3)
		1.2-1.8	ვაზი			45(1)	7(3)
		1-1.5	ვარდი (ღია და დახურული გრუნტი)	აბლაბუდა ტკიპები		3(2)	3(-)
		0.9	მოცხარი			45(1)	7(3)
		0.8-1.2	შაგბალახა სამკურნალო (სათესლე ნაკვეთები)			-(2)	7(3)
		3.75-4.5	ციტრუსები	წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	45(1)	7(3)
13.	საირენი, ეკ 480 გ/ლ (ქლორპირიფოსი) (თ), (1) "კემინოვა ა/ს" დანია 573	0.3-0.5	საძოვრები, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები, ველური მცენარეულობა	კალიები (არაგვრერი ფორმები, უმცროსი ასაკის მატლები)	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20(1)	10(4)
		0.5		კალიები (გვრერი ფორმები, უფროსი ასაკის მატლები)		20(1)	10(4)
		2-2.5	შაქრის ჭარხალი	ჭარხლის ჩვეულებრივი ცხვირგამელა, ხვატრები, ციცნა ქაროსნები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	30(2)	10(4)
		1.5		რწყილები		30(2)	10(4)



		0,8		ფოთლის ზუგრი		30(2)	10(4)
		1,5-2		მდელის ფარვანა		30(2)	10(4)
		2	ვაშლი	ნაყოფქამიები, ფოთლიხვეციები, ჩრჩილები, ტკიპები, ფარიანები, ზუგრები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	40(2)	10(4)
		2	ატამი	ცრუფარიანები		60(1)	10(4)
		1,5	კარტოფილი	კოლორადოს ხოჭო		30(2)	10(4)
		1,5	სვია	აბლაბუდიანი ტკიპა, ზუგრები		30(2)	10(4)
		1,5	იონჯა	ფიტონომუსი		25(1)	-(4)
14.	სუმითიონი, ეკ 500 გ/ლ (ფენიტროთიონი (თ), (1) "კრომპტონ ოუნერიოალ ქემიკალ რეგისტრირებული" 070/04	0.6-1	ხორბალი	მავნე კუსებურა, თრიფსები, ზუგრები, პურის ხოჭოები	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	15(2)	10(4)
		2-2.5	"	ხვატრები	"	15(1)	-(3)
		0.5	ქერი	ზუგრები	"	15(1)	-(3)
		1.6-4	ვაშლი, მსხალი	ჩრჩილები, ზუგრები, ნაყოფქამიები, მინაფრთიანა, ფარიანები და ცრუფარიანები	"	20(2)	-(3)
		1-2.4	ალუბალი, ბალი, ქლიავი	ნაყოფქამია, ფარიანები და ცრუფარიანები	"	20(2)	7(3)
		2-4	ციტრუსები	ფრთათეთრა, ფარიანები და ცრუფარიანები, ზუგრები	"	20(2)	7(3)
		1-1.4	თამბაქო	ბამბის ხვატარი, მდელის ხვატარი, ხოჭოები, ზუგრები, კალიები	"	20(2)	7(3)
		0.6-1.2	შაქრის ჭარბალი	მენადმე ჩრჩილი და ზუზი, ხვატრები, ბაღლინჯოები, ზუგრი, მდელის ხვატარი	"	20(2)	7(3)



		0.8-1.8	სას. სამ. კულტურები ველურად მო-ზარდი მცენა- რეულობა	კალიები	“	20(1)	7(3)
		6-8	ჩაი	ჩაის ჩრჩილი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში იმ ნაკვეთებში სადაც არ წარმოებს ფოთლის კრეფა	-(1)	-(3)
		0.4 მლ/მ2	ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობები და მარცვალგადასამუშავებელი მანქანა-დანადგარები	მავნებლები შენახვის პირობებში	შესხურება. ხარვის ნორმა 50 მლ 1 მ2-ზე. პროდუქციის შეტანა და მომხმარე პერსონა- ლის დაშვება	-(1)	7(3)
		0.4 მლ/მ2	მარცვალგადასამუშავებელი და სასაწყობო მეურნეობის ტერიტორია	მავნებლები შენახვის პირობებში	შესხურება. სამუშაო ხსნარის ხარჯის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე	-(1)	-(3)
		20 მლ/ტ	თავთვანი პურეულისა და პარკოსანი კულტურების თესლი	მავნებლები საწყობის პირობებში	შესხურება. ხარჯის ნორმა 500 მლ 1 ტ თესლზე. მარცვლის გამოყენება სასურსათოდან საფუარედ მხოლოდ ნაშთის გასაზღვის შემდეგ	-(1)	-(3)
15.	ცელფოსი, აბი, 560 გ/კგ (ალუმინის ფოსფიდი) "ექსელ ინდასტრის (ევროპა) ნვ" ბელგია 551	5 გ/მ ³ (2აბი)	ჩაუტვირთავი მარცვალგადასამუშავებელი	საწყობის მავნებლები	ფუმინგაცია 15-16 C-ის დროს, ექსპოზიცია 5 დღე. პერსონალის დაშვება, საწყო- ბების ჩატვირთვა მიხედვით მხოლოდ დამატებით განთავსების შემდეგ, როცა ფოსფინის შემცველობა სამუშაო ზონის ჰაერში არ აღემატება ზღვ-ას	-(3)	-(3)
		9 გ/მ ³ (3აბი)	მარცვლი სასურსათო, სათესლე, საფუარე	საწყობის მავნებლები	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 10 დღისა, რეალიზაცია - როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(3)	-(3)
		6 გ/მ ³ (2აბი)	ფქვილი, ბურღული საწყობში ან პოლიეთილენის საფარქვეშ.	საწყობის მავნებლები	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 2 დღისა - როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(3)	-(3)
		5.4 გ/მ ³ (2აბი)	მშრალი ზოსტნეული საწყობებში, ან პოლიეთი- ლენის საფარქვეშ.	საწყობის მავნებლები	იგივე პირობები და დეგაზაცია არანაკლებ 5 დღისა - როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს.	-(3)	-(3)
		2.4 გ/მ ³ (1აბი)	მარცვლოვანი ან პარკოსანი კულტურების მარცვლი, გემების ტრიუმფსა და ტანკერებში, ნავსადგურებში.		ფუმინგაცია 15-16 ⁰ C-ის დროს, ექსპოზიცია "ფიტოექსპოზიციის გამოყენებით"-16 დღე. რეგისტრაციის მეთოდით ერთი დღე. დეგაზაცია რეისის და რეიდის დროს. მარცვლის დათვალიერება და გადატვირთვა მიხედვით მაშინ, როცა ფოსფინის შემცველობა მარცვლის ზედაპირიდან 0,5-1 მ სიმაღლეზე, 0,1 მგ/მ ³ -ია და მარცვლებს შორის 0,3 მ სიღრმეზე არაუმეტეს 50 მგ/მ ³ - ია. რეალიზაცია - როცა ფოსფინის ნაშთი პროდუქციაში არ აღემატება მდდ-ს. პერსონალის დაშვება სრული განთავსების შემდეგ, როცა ჰაერში პოსპინის შემცველობა არ აღემატება	-(3)	-(3)



					ზდკ-ას.		
--	--	--	--	--	---------	--	--

11. მე-15 მუხლს:

ა) დაემატოს 2¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2 ¹ .	ბოტრანი 75, ცხვ 750 გ/კგ (დიქლორანი) (4) “გოვან კომერციო ინტერნაციონალს ერეკოს ლიმიტადა” პორტუგალია 606	1-1.5	ვაზი	ნაცრისფერი სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის და სიმწიფის დასაწყისში 0.15% სუსპენზიით და მოსავლის აღებამდე 15-20 დღით ადრე	20 (2-3)	7 (3)
		1-1.5	ატამი გვარგარი ცქლიავი ალუბალი	მონილიოზი ფოთლებს სილაქავე ვერტიცილოზური ხმოზა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.15% სუსპენზიით	20 (3)	7(3)
		1-1.5	კარტოფილი	რიზოქტონიოზი ფუზარიოზი სიდამპლე სკლეროტი-ნიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2-3)	7(3)
		1-1.5	პამიდორი კიტრი (ღია და დახურული გრუნტი)	სიდამპლე ჭკნოზა ვერტიცილოზური ფუზარიოზები სკლეროტინიოზი რიზოქტონიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში გადარგვამდე ან გადარგვის პროცესში	20 (2-3)	7(3)
		1-1.5	ხახვი	სიდამპლე სკლეროტინიოზი ფუზარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	20 (2-3)	7(3)

ბ) დაემატოს 5¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5 ¹ .	კაურიტილი, წდგრ 810 გ/კგ (მეთირამი 420 + სპილენძის დიჰიდროქსიდი 390) (თ) “ზასფი სე”	3.0	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	28 (3)	7(3)
------------------	--	-----	------	-------	----------------------------------	--------	------



გერმანია						
591						
		3.0	ვაშლი, მსხალი	ქევი	“	30(3) 7(3)
		3.0	პამიდორი	ფიტოფტოროზი	“	20(3) 7(3)
		3.0	კიტრი	პერონოსპო-როზი	“	20(3) 7(3)
		3.0	კარტოფილი	ფიტოფტოროზი	“	20(3) 7(3)
		3.0	ხახვი	პერონოსპო-როზი	“	20(3) 7(3)

გ) დაემატოს 7¹ - 7³ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

7 ¹ .	მისტიკი 250, ეკ 250 გ/ლ (ტეზუკონაზოლი)	0.5	ვაშლი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (2-3)	7(3)
	(3) "ნიუფარმი გმზ და კო კზ" ავსტრია 599	0,4	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	35 (3)	7(3)
		0.4	საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი	მურა, ყვითელი, ღეროს ყანა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქვე, ფუზარიოზი, ზადისებრი ლაქიანობა	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით	51(1)	7(3)
7 ² .	ორიუსული, წდგრ 745 გ/კგ (ტეზუკონაზოლი 45-გოგირდი 700) (თ), (3) "მაქტემიმ აგან ჰოლანდ ზ.ვ." ნიდერლანდები 614	1.5-2	ვაზი	ნაცარი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით	21 (4)	7(3)თ
		1.5-2	ვაშლი	ქევი ნაცარი	“	30 (4)	7(3)
		1.5-2	ატამი	ნაცარი	“	30 (4)	7(3)
			პამიდორი	ალტერნარიოზი			



		1.5-2	კიტრი	ნაცარი	“	7 (3)	7(3)
		1.5-2	ხორბალი	ნაცარი	“	7 (2)	7(3)
		1.5-2	თამბაქო	“	“	10 (2)	7(3)
		1.5-2	დეკორატიული მცენარეები	“	“	- (4)	7(3)
7 ³ .	პროექტ--თამ 50 სფ 500 გ/კგ (სპილენძის მიხედვით) (სპილენძის ჰიდროქსიდი) (თ), (3) "აგროსაგრო ლტდ" ბულგარეთი 652	1,5-2,5	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა ყლორტები მიაღწევენ 10 სმ სიგრძეს, 10 დღის შემდეგ, ყვავილობის წინ და დამტვერების შემდეგ	20 (4)	3(1)
		1,1-5,4	ვაშლი, მსხალი	ქევი ბაქტერიული სიდამწვრე ნაყოფების სიდამწვლე	შესხურება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენამდე და ჩამოცვენის შემდეგ და გაზაფხულზე შეფოთლისას	15(3)	3(1)
		1,7-6	ატამი გვარგარი ღელიავი ალუბალი	ფოთლის სიხუჭუჭე ბაქტერიული სილაქვე ბაქტერიული ნეკროზი კლასტეროსპორიოზი	შესხურება შემოდგომაზე და ზამთრის დამთავრებისას	15 (2)	3(1)
		1-3.6	ციტრუსები	მმალსეკო ფიტოფტოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიული ნეკროზი სეპტორიოზი	შესხურება შემოდგომაზე	21 (3)	3(1)
		1,3-4,95	კაკლოვნები	ფოთლების სიხუჭუჭე პოლისტიგმოზი ბაქტერიოზი სეპტორიოზი	შესხურება შემოდგომაზე ფოთლების ჩამოცვენისთვე, ზამთრის დამთავრებისას და ყვავილობის წინ	21 (3)	3(1)
		0,55-1,8	პამიდორი კიტრი წიწაკა	ფიტოფტოროზი პერონოსპოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი სეპტორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 7 დღიანი ინტერვალით	7 (4)	3(1)
		0,55-1,8	საზამთრო ნესვი	პერონოსპოროზი ანთრაქნოზი ბაქტერიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას 10-14 დღიანი ინტერვალთ	7(4)	3(1)



				ფიტოფტოროზი			
		0,55-1.8	კარტოფილი	მაკროსპორიოზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში როცა მცენარეები მოაღწევენ 15- 20 სმ და 10-14 დღიანი ინტერვალით	21(4)	3(1)
		1,1	შაქრის ჭარხალი	ცერკოსპორიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებათა სიმპტომების გამოჩენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით	21 (3)	3(1)
		0,7-1,3	მარწყვი	ფოთლების თეთრი სილაქავე	“	21 (4)	3(1)

დ) დაემატოს 13¹ და 13² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

				პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინები-საგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენმა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.		
13 ¹ .	ფლინტი წზგრ 50 500 გ/ლ (ტრიფლოქსისტრობინი) (თ), (3) “ზაიერ კროპსაიენს აგ” გერმანია 655	0.14	ვაშლი, მსხალი	ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა, ფილოსტიქტოზი	14(2-3)	7(3)



		0.15	ვაშლი, მსხალი	დაავადებები შენახვის პირობებში (ობის სოკოები, მონილიოზის ლატენტური ფორმა)	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.015%-იანი სამუშაო ხსნარით მოსავლის აღებამდე 28, 14 დღით ადრე. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, მათ შორის დამუშავებები დაავადებების წინააღმდეგ ვეგეტაციის პერიოდში არ უნდა აღმატებოდეს სამს	14(2-3)	7(3)
		0.25-0.3 0.14	ვაზი	ქრაქი ნაცარი	პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით. ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენობა, არ უნდა აღმატებოდეს სამს	28(2-3)	
13 ² . (4) "ზაიერ კროპსაენს აგ" გერმანია 656	ფლინტ სტარი სკ 520 520 გ/ლ (ტრიფლოქსისტრობინი 120+პირიმეთანილი 400)	0.4-0.6	ვაშლი, მსხალი	ქვეი ნაცარი მონილიოზური სიდამპლე	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში	28 (3)	7(3)



				ნაცარი			
		0.5	ვაზი	კრაქი	“	30 (3)	7(3)
				ნაგრისფერი სიდამპლე			

12. 21-ე მუხლის:

ა) მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.	2,4-დ მჭავა	0.005	0.1 (ტრ)	0.0002 /(ს-ტ)	1.0/	/0.0001	პურეულის მარცვალი, სიმინდის მარცვალი, ფეტვი -0.05, სიმინდი (ზეთი)-0.1,რძე-0.04, ხორცი-0.08, კარაქი-0.1, ფქვილი, ზურღული - ნედლეულის მიხედვით, მტკნარი წყლის თევზი -0.01, ციტრუსები-1.0. დანარჩენი საკვები პროდუქტი - 0.002	2,4-დ 500, დიალენი(51) , დიალენ სუპერი (51), ტრეზორი (186), დიკოპურ ტოპი (50) სანაფენი, 2,4 -დ დიმეთილამინის მარილი, დიამინი, დიკამინი დ. ვალსამინი (51), ჰექტაფერმინი, ამინოპელიკ სუპერი(51), ფენიქსი 60. ფენიქს გოლდი 72, გოლიაფი (51), ბესტ ამინი 500, ეფდალ დიმეტრინი, პიამინი
3.	2,4 დ მცირედ-აქროლადი ეთერები 2.4. დ 2-ეთილჰექსილის ეთერი	0.005	0.1 (ტრ)	0.0002/ (ს.-ტ.)	0.5/	/0.0001	პურეულის მარცვალი, სიმინდი მარცვალი, ფეტვი -0.05, სიმინდი (ზეთი)-0.1,რძე-0.04, ხორცი-0.08, კარაქი-0.1, ფქვილი, ზურღული - ნედლეულის მიხედვით, მტკნარი წყლის თევზი -0.01, ციტრუსები-1.0. დანარჩენი საკვები პროდუქტი - 0.002	ლევირატი ლენტემულ დ, ესტერონი, ამილინი, ესტერონი 600 , ბალერინა (103 ¹), ეფდალ ულტრამიქსი (103 ¹)

ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

7.	Bacillus thuringiensis var. kurstaki, (სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი)	ნა	ნა	ნა	10 უჯ/მ3	3 X 105 უჯ/მ3	ნა	ლეპიდოციდი, ლეპიდოციდი CK-M, დიპელი 8L, ფორეი 76B, დელფინი, ლიპიდინი
----	--	----	----	----	----------	---------------	----	--

გ) მე-17-მე-19 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

17.	აბამექტინი	0.0001	/0.01	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.05	/0.00004/	კიტრი-0.01, ხილი (თესლოვანი), პამიდორი, წიწაკა,ბადრიჯანი, ყურძენი-0.003	ვერტიმეკი, ტორპედო, ალაგამეკი, ვერტამექტინი ფორტე
							ყურძენი, კიტრი, -0.2, ღვინო-0.5, პამიდორი-2,0 , მარცვლეული -0.3, ხახვი-0.05, კარტოფილი 0,05, რძე და რძის პროდუქტები-0.01,	



							ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (თირკმელი, ღვიძლი, ხორცი)-0.01	
18.	აზოქსისტრობინი	0.03	/0.4	0.01/	/1.0	/0.01		კვადრისი, კვადრის მაქსი (221), კონრადი
19.	ალფაციპრეტრინი (ციპრეტრინის იზომერების ნარევი) ალფამეტრინი (სინონიმი)	0.01	/0.02	0.002/ (საერთ.)	/0.1	/0.002	რაფი (მარცვალი, ზეთი), პურელის მარცვალი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, ხილი (თესლოვანი)- 0.05, ყურძენი, ხილი (კურკოვანი), ჭარხალი სუფრის , მდოგვი, პამიდორი, ველურად მოზარდი სოკო და ფასტაკი, ალპაკი, ალფა ციპი, ფენდონა, სუპერ ჰექტამეტრინი, კორტაკი, ბესტ ალფა. ეფდალ ალფატრინი, ტავანაკეკრა-0.005; ბარდა-0.1 , მწვანე ბარდა-0,004, სიმინდი (მარცვალი, ზეთი)- 0.05, სამარაგოდ შენახული მარცვალი - 0.01*	

დ) დაემატოს 21¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

21 ¹ .	ამეტოკტრადინი	0,2	0,6	0,005 (საერთ.)	0,7	0,02	კარტოფილი, კიტრი, ხახვი, პამიდორი, ყურძენი-0.2, ყურძნის წვენი-ად	ორვეგო (57)
-------------------	---------------	-----	-----	-------------------	-----	------	--	-------------

ე) 28-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28.	აცეტამიპრიდი	0.06	/0.6	0.02/ (საერთ.)	/0.2	/0.004	კიტრი, პომიდორი-0.3, კარტოფილი, ხორბალი - 0.5	აცე, მოსეტამი, ტემპი აგოლდპლანი, ეფდალ აფიტრინი, ესკაპე
-----	--------------	------	------	-------------------	------	--------	---	---



ვ) 42-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

42.	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი	0.01	0.5 (ტრ.)	0.02/ (ს.-ტ.)	1.0/	/0.01	ხეხილი, ციტრუსოვნები, მზესუმზირა (თესლი),ბოსტნეული, სიმინდი (თესლი), კარტოფილი,სოკო-0.3, საზამთრო-0.3*, ყურძენი, მზესუმზირა (ზეთი)-0.1, კენკრა (ყველა)-0.1, ხორბლეულის მარცვალი-3.0, სოიოს მარცვალი, ბრინჯი-0.15, სოიოს ზეთი-0.05*, რაფსი(მარცვალი)-3,0,რაფსი (ზეთი)-ნა,ბარდა(მარცვალი)-3,0	გლიფოსანი, გლიფოგანი, კლინ-აპი კლინი, კორფოსატი მაქსი, სვიპი, გლიფოვიტი, ეფდალ იზოფოსატი 48, სონრაუნდი 48, ეფდალ იზოფოსატი 36, სანფორსი 48 წხ, ბოქსერი
	გლიფოსატი	0.1				/0.04	ურაგანი, გლიაცინტი, გეიზერი, რუმბო,ზერო, ფელიქსი, ტორნადო, გლინი,	

ზ) 44-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

44.	გოგირდი	ნა	160.0/ (საერთ.)	ნა	6.0/	/0.07	ნა	გოგირდი, თიოვიტი ჯეტ, პოვერ სულფური, ორიუსული (173), სულფოლაკი, სულფი, კარგილ დფ, კოსავეტი, გოგირდი, უნიკორნი (173), ეფდალ სულფური, სულფექს გოლდი ფაინსულფური
-----	---------	----	--------------------	----	------	-------	----	--

თ) 46-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

46.	დელტამეტრინი	0.001	0.01/ (ტრ)	0.006/ (ს.ტ.)	/0.1	/0.001	მზესუმზირა (თესლი), ნესვი, თამბაქო-0.1*, მზესუმზირა (ზეთი), ბამბა (ზეთი), ხილი (კურკოვანი), ბანანი- 0.05*, მარცვლეული, პარკოსნები, ხილი (თესლოვანი), კომპოსტო, სიმინდი (მარცვალი), კიტრი, სალათი, ბრინჯი, ციტრუსოვნები (რბილობი), ყურძენი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, ბარდა, პამიდორი, სტაფილო- 0.01, საზამთრო, სოიო (ზეთი), წიწკა, კაკაოს მარცვლები-0.01*, მშრალი სვია-5.0*, რაფსი (მარცვალი, ზეთი), სიმინდი (ზეთი)-0.02, რაფსი (მარცვალი, ზეთი), სიმინდი (ზეთი)- 0.02, ხორცი-0.02, რძე- 0.4, ღვიძლი, თირკმელები- 0.05, ცხოველთა ქონი -0.5	დეცისი ბლუ, დეცისი ექსტრა დეცისი უმშ, დეცის პროფი, დელტა, დელტარინი, პროტეუსი 110 ზდ (74), დენტისი, დეცის ფლუქსი ეკ 25 , ჰექტამ დელტარინი 12.5 უმშ, ეფდალ დელტამეტრინი, პრედატორი, იზოლდესისი, დეკაგარდი
-----	--------------	-------	------------	------------------	------	--------	--	--



ი) 55-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

55.	დიმეთოათი	0.001	/0.1	0.003/ (ს.-ტ.)	0.5 (+)	0.0003 (ს.-ს.)	ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი) ზეთისხილი, სოკო, ბრინჯი, ბაღეული, კიტრი, პამიდორი, წეკო, თამბაქო, სვია მშრალი, შაქრის სუფრის ჭარხალი - 0.02 თუთა, კენკრა (ყველა), კომპოსტო, პურეულის მარცვალი, პარკოსნები, ფეტვი, ყურძენი, ციტრუსოვნები (რბი-ლობი), კარტოფილი, მზესუმზირა (თესლი და ზეთი)- 0.02, მდოგვი, რაფსი (მარცვალი, ზეთი)- 0.05	ბი-58 ახალი, საფაგორი, დინგო, დანადიმი, პოლიგორი, ბიფოსფინი, ბიიტალი, დემეტრა, დი-68, კორუმაგორი, დიმევიტი, ეფდალ კემიდონი, ალპგორი, ფოს-ბი, ვერტიკალი
-----	-----------	-------	------	----------------	---------	----------------	--	--

კ) 57-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

57.	დიმეტომორფი	0.1	0.04/	0.1 /	0.1/	/0.1	კარტოფილი -0.5, კიტრი-0.01, პამიდორი-0.2, ყურძენი-3.0	აკრობატი მც (111) ავანგარდი (111), დიმაკო (111), სფინქს ექსტრა (221), ლიდერი (111), აკრობატ ტოპი (53), ფაიტერ ბლუ (165), მანკოცებ სუპერი (111) , ეფდალ აკრობოტი (111), მაქსიმუმი (111),კამბაზი (111), ორვეგო (21 ¹)
-----	-------------	-----	-------	-------	------	------	---	---

ლ) 59-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

59.	დინიკონაზოლი	0.003	/0.1	0.004/	/0.01	0.005/	პურეულის მარცვალი - 0.05	სუმბი 8, კონილი ,მაქსილი-8, ალიანსი, სონფიქსი
-----	--------------	-------	------	--------	-------	--------	--------------------------	---

მ) 60 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

60.	დიფენკონაზოლი	0.01	/0.1	0.001/ (ს.-ტ.)	/1.0	/0.01	ხილი(თესლოვანი), შაქრის ჭარხალი - 0.1, მარცვლეული-0.08, სუფრის ჭარხალი-0.2, ხილი (კურკოვანი)-0.15, პამიდორი, -0.05, სტაფილო-0.3,	სკორი, დივიდენდი, დივიდენდი სტარი (239), სკორპიონი, ფუნქსი , სკაპი, ტასპა (154), სელესტ ტოპი (75, 213), ატტიკი (299), პარბორი (154), კორბეტი, აპლორი, ბროდერი (154),
-----	---------------	------	------	----------------	------	-------	---	--



							კარტოფილი-0.02, ნიახური-5.0*, ყურმენი-0.5	სკანდალი 250 ეკ, ჯეკ-პოტი (137), რაიოკი, დინალი (243), ევდალ დონაზოლი, ევდალ დინესი, სამშეტი (104), რევუს ტოპი (110), იზოლდიფეკორე, ევდალ დიფენპრო (154)
--	--	--	--	--	--	--	---	--

ნ) დაემატოს 60¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

60 ¹ .	დიფლოვიდაზინი	0,02	/0,07	0,002	/0,4	0,001	ვაშლი-0,04, ყურმენი-0,02	ფლუმაიტი
-------------------	---------------	------	-------	-------	------	-------	--------------------------	----------

ო) 64-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

64.	ემამეტეინ ბენზოატი	0.003	/0.07	0.005/ (საერთ.)	/0.1	/0.001	ყურმენი -0.05, პამიდორი, ზადრიჯანი, წიწაკა - 0.02, კომბოსტო, სალათა-0.7	პროკლეიმი, პიპნოზი
-----	--------------------	-------	-------	-----------------	------	--------	---	--------------------

პ) 76-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

76.	თიოფანატ-მეთილი	0.02	/0.4	0.05/ (ორგ.)	0.1/	/0.007	შაქრის ჭარხალი, პურეულის მარცვალი-1.0, ხურმა, ფეიხოა-0.2*, კიტრი, ხილი (თესლო-ვანი, კურკოვანი), ყურმენი-0.5, მოცხარი-0.01	ტოფსინი-მ, რექს დუო (68) კვარტეტი
-----	-----------------	------	------	--------------	------	--------	---	--

ჟ) 83-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

83.	იმიდაკლოპრიდი	0.06	0.1/	0.03/ (ორგ.+საერთ.)	/0.5 (ა)	/0.02	სიმინდი (მარცვალი,ზეთი), პურეულის მარცვალი-0.1,რაფსი (მარცვალი, ზეთი)-0.1, მზესუმზირა (თესლი) -0.4, მზესუმზირა (მარცვალი)-0.2, შაქრის, სუფრის ჭარხალი, ხილი (თესლოვანი)-0.5, კიტრი-1.0, კენკრა-3.0, წიწაკა-1.0, ზადრიჯანი-0.5, შავი მოცხარი-3.0,პამიდორი, კომბოსტო, კარტოფილი-0.5, სვია-0.01, ყურმენი, ციტრუსები-1,0,	გაუჭო, კონფიდორი, კონფიდორ მაქსი, პრესტიჟი (139), პრემიუმ (139), სულტანი, მიდამი, კონფიდორ თილი, ნუპრიდი, კომპრადორი, იმიდორი მაქსი, იმიჯი, სინოპრიდი, კომპრადორ თილი (127), პერფექტო, (105), ანტიკოლორადი (105), ანტიბრუშჩი (35), ევიდორ თილი (127), იმიდამექსი, მიდამი პლიუსი, გორტკა, ევდალ იმიდრიდი 70 წდფითშ, მატადორ გრანდი (115, 235), ევდალ იმიდრიდი 60 სე
-----	---------------	------	------	---------------------	----------	-------	---	--

რ) დაემატოს 83¹-ე პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

							ყურმენი-0.01, ხილი (თესლოვანი,	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--



83 ¹ .	ინდაზიფლამი	0.02	/0.5	ან (ს.-ტ.)	ან	ან	კურკოვანი)- 0,01,ციტრუსები- 0,01, თხილი-0,01, ოლივა, ფისტა, ნუში-0,01, შაქარი, შაქრის ლერწამი- 0,01	ალიონი 500 სკ
-------------------	-------------	------	------	---------------	----	----	---	---------------

ს) 88-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

88.	იპროდიონი	0.06	/0.15	0.01/ (ს.-ტ.)	/1.0	ნა	ყურმენი-0.4, კიტრი,მზესუმზირა (თესლი და ზეთი)- 0.02, კარტოფილი, სტაფილო-0.05 , ხაზვი-0,2, პამიდორი-5.0, ჩინური კომბოსტო- 5.0, კენკრა-15.0, სალათა-10.0	როვრალი, როვონე, როვრალ აკვა ფლო, კარნავალი, ევდალ იპროდინი, ზეანოლი
-----	-----------	------	-------	------------------	------	----	---	--

ტ) 97-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

97.	კვიზალოფოპ-პ- ტეფურილი	0.004	/0.1	0.002/ (საერთ.)	/0.5	/0.005	შაქრის, სუფრის, საკვები ჭარხალი, კარტოფილი, პამიდორი, სტაფილო, სოიო (თესლი), მზესუმზირა (თესლი) კომბოსტო - 0.04; სოიო (ზეთი), მზესუმზირა (ზეთი), ხაზვი-0.06, რაფსი(თესლი, ზეთი)-0.02	პანტერა
	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი							ტარგა, ტოკტა სუპერი, ფორმულა სუპერი, კვინ სტარ შაქსი, ჰელგა სუპერი, ევდალ ზალოსუპერი, სერ სუპერი

უ) 98-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

98.	კლოდინაფოპ- პროპარგლი	0.002	/0.2	0.01/(საერთ.)	/0.6	/0.002	პურეულის მარცვალი-0.05	ტოპიკი, კონკერი, ციტეიშნ, კოვბოი (101), ტერდოკი (101), , ტოპკაპი (101), ევდალ კლოპარი (101), ტოპკაპი (101)
-----	--------------------------	-------	------	---------------	------	--------	---------------------------	--

ფ)101-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

101.	კლოკვინტოსეტ-მექსილი	0,04	0,07	0,001	0,8	0,01	მარცვლეული, კარტოფილი-0,1	ლასტიკ ექსტრა (200), კოვბოი (98), ტერდოკი (98) ტოპკაპი (98), ევდალ კლოპარი (98), ტოპკაპი (98)
------	----------------------	------	------	-------	-----	------	------------------------------	--



ქ) 104-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

104.	კრეზოქსიმ-მეთილი	0.1	/0.2	0.01/ (საერთ.)	/1.0	/0.1	ხილი (თესლოვანი)-0.2, კენკრა-0.1*; კიტრი, პამიდორი, ყურმენი -0.5	სტრობი, პროგრესი, კოლოსი (36), სტრომსტარი, დრენი, სამიტი (60), ეფდალ კრესდიტი
------	------------------	-----	------	----------------	------	------	--	---

ღ) 105-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

105.	ლამბდაციპლოტრინი	0.002	/0.05	0.001/ (ს.-ტ.)	/0.1	/0.003	ხილი (კურკოვანი)-0.03*, ხილი (თესლოვანი)-0.03, კარტოფილი, სიმინდი-0.01, მშრალი სვია-1.0*, მდოგვი(თესლი,ზეთი)-0.1*,რაფსი (მარცვალი, ზეთი), სოიო (მარცვალი,ზეთი), 0.1, სიმინდი (მარცვალი) , კომბოსტო, პამიდორი, ბარდა, პურელის მარცვალი, კარტოფილი, სტაფილო-0.01, შაქრის ჭარხალი, ხახვი -0.02, ყურმენი-0.15	კარატე, კარატე ზეონი, ვალსამბა, გრანდი 5, კაიზო, კუნგ-ფუ, კუნგფუ სუპერი (75), პერფექტო (83), ანტიკოლორადი (83), ეფდალ ლამტორინი, ტეკვანდო კაპსულა, კავანა, იზოლლატე
------	------------------	-------	-------	----------------	------	--------	---	--

ყ) 110-ე და 111-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

110.	მანდიპროპამიდი	0.03	0.24	0,05 (საერთ)	1,0	0,01	პამიდორი-1,0, ყურმენი -2,0, ხახვი-0,1,კარტოფილი-0,5	პერგადო C (165), რევეს ტოპი (60)
111.	მანკოცები	0.03	/0.1	/0.01 (ორგ.)	0.5/	/0.001	კარტოფილი, ხახვი, პამიდორი, ყურმენი, კიტრი-0.1	აკრობატი მც (57), რიდომილ მც (115), ტატტუ (150), კლიპი (153), ნოვოზირი, რიდომილ გოლდი მც (115), იუნომილი მზ (115),ვალსაზები, მანგრიფი, ვიქტორი(115), დითანი მ-45, საკოსები, მანკოში, მანკოსილი, მეტელესანი (115), ტროპერი (115), მაქსიმო (115), ვალსალაქსილი (115), ავანგარდი (57), დიმაკო (57), გალბენი 88-65(30), კურზები (235), კორზ სუპერი (235), სპრინტი (235), ვალსალაქსილ მ პლიუსი (235) , რაპიდ გოლდი (235), რაპიდ გოლდ პლიუსი (235, 165) , საფა რიდონეტ გოლდ მც 68 სვ, (115), კლასიკა, მანგო, პრომეთე (115), მ-2 (115), უნივერსალი (115), ლიდერი (57) , კადილაკი, მანკოცებ სუპერი (57), მანკოლაქსილი (115), კუპროფიქს 30 დისპერსი (164), რიდოზემი მც-72 (115), ეფდალ აკრობოტი (57), დრაკო ზღუ, ეფდალ მაკო მ-45, ეფდალ ციმოქსაზები (235), მანკოზატი მც, არმეთილი (115),



შ) 114-ე და 115-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ჩ) დაემატოს 119¹ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ვ) 122-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დ) 124-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

124.	მეტსულფურონ-მეთილი	0.003	/0.1	0.01/ (საერთ.)	5.0/	/0.002(მ.- e.) 0.003 (ს.-ს.)	პურელის მარცვალი, ფეტი- 0.05	მეტსი, როტტერი, ალე, იმპერატორი, პატრული, ეფდალ მეტეორი
------	--------------------	-------	------	-------------------	------	---	------------------------------------	--

წ) 127-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

127.	მინერალური ზეთი თითისტარა ზეთი პარაფინის ზეთი	ნა	ნა	ნა	10 (ნახშირ. მიხედვით)	ნა	ნა	ტრინოლი-2, ჰექტოლინეუმი, კორუმ იაზლიკ იაგი, აგრომინერალ ოილი, კომპრადორ ოილი (83), ეფედორ ოილი (83), ეფდალ სუნოლი სიკამოლი ე, ოვიპრონი, ინსექტიციდი ქეი, ეკო იოლ სპრეი
------	---	----	----	----	--------------------------	----	----	---

ქ) 132-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

132.	ნიკოსულფურონი	0.2	/0.2	0.004/ (ორგ.)	5.0/(ა)	/0.02	სიმინდი -0.2, სიმინდი (ზეთი)- 0.1	სამსონი, ელიმინატორი, ნიკოში, ნიკოფურონი, ნიკოგანი, ვოიაჟი, ჰექტორ მაქსი (51,160), სულფონი, იკანოსი, სამსონი ექსტრა 6 ზდ, ელუმისი (112) , მილადარი, დუბლონ გოლდი (180), ფულსპიდი, ეფდალ ალსონი, ნიკოში პლიუსი, სანსტეპი
------	---------------	-----	------	---------------	---------	-------	---	--

ბ) 135-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

135.	ოქსიფლუორენი	0.003	/0.2	0.02 (org.)	/1.0	/0.001	ვამლი, ხახვი, მზესუმზირა (თესლი,ზეთი) - 0.2	გალიგანი, პექსი, კოლტარი, პაროქსიფენი, ეფდალ ოქმოსტი
------	--------------	-------	------	-------------	------	--------	--	---



ჯ) დაემატოს 135¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

135 ¹ .	პაკლობუტრაზოლი	0,1	ან	ან	0,1	ან	ნა	ბონზი
--------------------	----------------	-----	----	----	-----	----	----	-------

პ) 136-ე და 137-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

136.	პენდიმეტალინი	0.008	/0.15	0.05/ (ორგ.)	0.5/	/0.008	სოიო (თესლი და ზეთი), ნიორი, თამბაქო, მშრალი სვია-0.1*, პამიდორი, სტაფილო, კიტრი-0.05*, ხახვი, კომბოსტო, ოხრახუში, ზამბა (ზეთი)-0.05, მზესუშხირა (თესლი, ზეთი)-0.1	სტომპი, ვალსატოპი, სტოპი, პანდორა, პენდიგანი, სპონსორი, ჰერბიმატი , პანდა, ეფდალ პენალინი
137.	პენკონაზოლი	0.007	0.1/	0.003/ (საერთ.)	/0.8	/0.01	კიტრი, კენკრა, საზამთრო-0.1, პამიდორი-0.1*, ხილი (თესლოვანი), ნესვი-0.2, ყურძენი, ხილი (კურკოვანი)-0.3, პურელთა მარცვალი-0.005, კენკრა-0.5	ტოპაზი, პრეფექტო, პინნაკლი, პენ-ფორსი, კობუზი, ტოპკონაზოლი, ეფექტი, პესოსი, ეფდალ პეკოზოლი, პენკილევი, ფულპასი, ჯეკ პოტი (60), ერლანტი

პ.ა) 150-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

150.	პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	0.08	/0.2	0.1/ (საერთ.)	/0.7	/0.07	კარტოფილი-0.1, სალათა-15.0, ბოლოკი-1.0, პამიდორი, კიტრი, -10.0	პრევიკური, ტატტუ (111), ინფინიტი (215), კონსენტო(195), პრევიკურ ენერჯი (20), ბოტრინი, პროპაკურ ნ, ეფდალ პროკარი
------	--------------------------	------	------	---------------	------	-------	--	---

პ.ბ) 154-ე და 155-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

154.	პროპიკონაზოლი	0.02			/0.2	0.15/ (ორგ.)	0.5/	/0.01	პურეულის მარცვალი, შაქრის ჭარხალი,რაფსი (მარცვალი,ზეთი)-0.1სუფრის ჭარხალი-0.05, ყურძენი -0.5	ტილტი, ტილტი პრემიუმი, სანაზოლი, ალტო სუპერი (239), ტასპა(60), ტილტუსტ, ზამპერი 25, პარბორი (60), ბროდერი (60), ტირექსი (184), პროპკონაზოლი, ეფდალ დიფენპრო (60)
155.	პროპინეზი	0.005 პროპილენთიოზარდოვანა-0.00001			ან	ან	0.5	0.002	ყურძენი, ყურძნის წვენი-0.002	ანტრაკოლი, ანტრაკოლ ბლაუ, მელიდი დუო (87), ფუნგიკინგი, საფაკოლი, საფაკოლ კომბი (235), პლაკოლი, კორუნეზი, ფავორიტი, ალგაკოლი, ეფდალ პრონეზი, ენერკოლ კომბი (235), ფუნგიკინგი პლიუსი, მაიოზი, ეფდალ პიროქსომი (235), იზოლპროპინეზი



3.გ) 162¹ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

162 ¹ .	სპილენძამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი	0.1	აწ	აწ	/1.0	აწ	ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი)-5, მარწყვი-5, ყურძენი- 5	კოპერ-ქაუნთ- N
--------------------	-------------------------------------	-----	----	----	------	----	--	----------------

3.დ) 164-ე-166-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

164.	სპილენძის სულფატი	0.17 (სპილენძით)	3.0/	1.0/(org.)	0.5/	0.0008/	კარტოფილი-2.0, მშრალი სვია-10.0*, კვერცხი, ხორცი-2.0, ხეხილი, კურკოვანი, ბოსტნეული, ყურძენი, ციტრუსოვანი, კენკროვანი, ბალჩელი-5.0	ბორდოს სითხე, კუპროქსატი, სპილენძის მახამანი, ბორდოს ნარევი, კუპროვანი, კუპრევალი ბლუ, ჰექტამ ბორდო, კუპროსული, ბორდოს ნარევი მაქსი, კუპრეტინ სუპერი (235), საფა ბორდოს ნარევი, პოლტიგლია 20 სფ, ბორდოფლო ნიუ, კუპერ სულფატ პენტაჰიდრატი, კუპროფიქს 30 დისპერს(111), ბორდოს ნარევი 20% სფ, სპილენძის მახამანი ფ, ბლუ ბორდო დისპერს, ბორდო სალდეგო 20%, ეფდალ მოკანი(235), იზოლბლუბორდომიქსი, პოლტიგლია მანიკა წდგრ
165.	სპილენძის ქლორფანგი	0.17 (სპილენძით)	3.0/	1.0/ (ორგ.)	0.5/	0.0008/	კარტოფილი-2, მშრალი სვია-10.0*, კვერცხი, ხორცი-2.0, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ბოსტნეული, ყურძენი, ციტრუსოვანი, კენკროვანი, ბალჩელი-5.0*, შაქრის ჭარხალი, პამიდორი, კიტრი, ხახვი-5.0	სპილენძის ქლორფანგი, ოქსიზომი (133), პოლიზომი (66), ტუბარიდი (115), კურზატი რ (235), აბიგა პიკი, სუპერ კოპერი , მელიდი კომპაქტი (88), კუპროკაფარო, კუპროფლო, ნეორამი, ჰექტამ ზაკირი , ექსპერტ ტიმი (235), ციზომ ბლუ (230), რაპიდ გოლდი პლიუსი (111, 235), კუპერ მაქსი, აირონი (166), ფაიტერ ბლუ (57), ოსსიქლორი 50 სფ, რიდომილი გოლდ პლიუსი (125), სქაინერი (230) , პერგადო C (110), ორდანი (235), მეტკუპერი (115). ოსსიქლორი 35 წზგრ
166.	სპილენძის ჰიდროქსიდი	0.17 (სპილენძით)	აწ	0.1/ (ს.-ტ.)	0.5/	0.0008	კარტოფილი-2.0, მშრალი სვია-10.0*, კვერცხი, ხორცი-2.0, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ბოსტნეული, ყურძენი, ციტრუსოვანი, კენკროვანი, ბალჩელი-5.0*, შაქრის ჭარხალი, პამიდორი, კიტრი, ხახვი-5.0	კოსაიდი 2000, კონსული, ჩემპიონი, იროკო, პროტექტ-ოპ, აირონი (165), კალრიტილი (114), ხელპი, პროტექტი, გარტი, ჰიდრომიკრონი

3.ე) 173-ე და 174-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

						/0.01(მ.ე.)	პურელის მარცვალი, ფეტვი, მზესუმზირა (თესლი,ზეთი)-0.2, ყურძენი-1.0,	ფოლიკური, ფოლიკური ზტ (184), ფოლიკური ე (63), რაქსილი, რაქსილი თ (77), ფალკონი (173, 183), მისტიკი, როდოლიტი,
--	--	--	--	--	--	-------------	--	---



173.	ტებუკონაზოლი	0.01	/0.4	0.025/ (საერთ.)	0.3/	0.003/ (ს.-ს.)	შაქრის ჰარხალი-0.1, სიმინდი(ზეთი), სოიო (მარცვალი,ზეთი)-0.1, რაფსი (მარცვალი,ზეთი)-0.3, ზრინჯი-2.0	როდოლიტი სუპერი, როდოლიტი ექსტრა, ორიუსული (44), ნატივო 75 (190), ტეზიკური, უნიკორნი (44), გიზმო, რუზინი, ტეზუჯი, რაქსილი ულტრა, არბალეტი, სერტიკორი (125), მისტიკი 250 წზე, ჯენსილი
174.	ტებუფენპირატი	0.01	აწ	აწ	აწ	აწ	ბოსტნეული-0.5, ხილი-0.2, ყურმენი -0.3, ყურმენის წვენი, ღვინო – 0.1	მასაი, ტალავი, ეფდალ ტეზუსაი, იაკუზა

3.ვ) 184-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

184.	ტრიადიმეფონი	0.01	0.03/ (ტრ.)	0.02 (ს.ტ.)	0.5/	0.05/(მ.ე.) 0.02 (ს.ს.)	პურეულის მარცვალი, შაქრის ჰარხალი, კიტრი, პამიდორი-0.5, ხილი (თესლოვანი, კურკოვანი) ,ნესვი - 0.05, ყურმენი-0.1, კენკრა, ფეხიზა-0.02	ზაზოცენი (66), აზოცენი , ბაილეტონი, ფოლიკურ ბტ (173), ვალსატონი, აგსტარი 250 ეკ, ტირეესი (154), ბაისტარი
------	--------------	------	----------------	-------------	------	-----------------------------	---	--

3.ზ) 190-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

190.	ტრიფლოქსისტრობინი	0.03	/0.2	0.03/(საერთ.)	/1.0	/0.02	ხილი (თესლოვანი)-0.1, ყურმენი -0.5	ზატო, ზატო სტარი (145), ნატივო 75 (173), ფლინტი, ფლინტი სტარი (145), ტრიდე, რიფიტი, ლუნა სენსიტივ სკ 500 (216),ეფდალ ლოქსბინი
------	-------------------	------	------	---------------	------	-------	------------------------------------	---

3.თ) დაემატოს 195¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

195 ¹ .	ფენამიფოსი	0,0008	აწ	აწ	აწ	აწ	ნესვი-0,05, ბანანი-0,05, ხორცი-0,01, კვერცხი-0,01	ეფდალ ფენოსი 400 ეკ
--------------------	------------	--------	----	----	----	----	---	---------------------

3.ი) 209 -ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

209.	ფლორასულამი	0,005	0,1	0,01	1,0	0,04	სიმინდი 9მარცვალი, ზეთი)-0,1, პურეულის მარცვლოვნები, სორგო, პრასი-0,05	ბალერინა (3), ეფდალ ულტრამიქსი(3)
------	-------------	-------	-----	------	-----	------	--	-----------------------------------

3.კ) დაემატოს 226¹ -ე პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

--	--	--	--	--	--	--	--	--



226 ¹ .	ქლორანტრანილიპროლი	2,0	0,2	0,2	1,4	0,007	თესლოვანი ხეხილი- 0,5,კარტოფილი- 0,1, ყურძენი-1,0, პამიდორი- 0,6,გოგრა, საზამთრო,ნესვი- 0,2,თხილი, ნიგოზი-0,05, სამკურნალო მცენარეები-15	კორაგენი, ამპლიგო
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	--	-------------------

3.ლ) 230 -ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

230.	ქლოროტალონილი	0.005	/0.2	/0.02/ (საერთ.)	/2.0	/0.001	კიტრი-0.1*, პამიდორი- 0.15*, ხილი (თესლოვნები), ყურძენი-0.15, კარტოფი-ლი- 0.05, პურელის მარცვალი-0.1, მშრალი სვია-1.0*	ზრავო, კორკონილი, სქაინერი (165), საფკონილი
------	---------------	-------	------	--------------------	------	--------	--	---

3.მ) 235-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

235.	ციმოქსანილი	0.02	/0.04	0. 3/ (ორგ.)	0.3/ (ა)	0.01/ 0.002/	კარტოფილი, კიტრი-0.05, ყურძენი, პამიდორი -0.1, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი)- 0.2, ხახვი-0.5	კურზატი რ (165), იტერალი (193), კურზები (111), რაპიდ გოლდი (111), რაპიდ გოლდ პლიუსი (111,165), კორზ სუპერი(111), ექსპერტ ტიმი (165), კუპერტინ სუპერი (164), საფაკოლ კომბი (155), ტანოსი (193),ეფდალ ციმოქსაზები (111),ზახისტი (115), ორდანი (165), ენერკოლ კომბი (155), კარზები (111), მატადორ გრანდი (83, 115), მაქსალინი (111), ალექტო (114), სუპერ სტარი (111), ეფდალ მოკანი (164) ეფდალ პიროქსომი(155), ერფრუტი(111)
------	-------------	------	-------	--------------	----------	-----------------	---	---

3.ნ) 237-ე და 238-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

237.	ციპერმეტრინი (ზეტა და ბეტაციპერ- მეტრინები)	0.01	0.02/ (ტრ.)	0.006 (ს.-ტ.)	0.5/	0.04/ (მ.ე.) 0.01/ (ს.ს.)	ზამზა (ზეთი)- 0.01*,კომბოსტო- 0.01, წიწაკა-0.2*, ყურძენი-0.5, სოიო (თესლი), სტაფილო-0.01*, ციტრუსოვნები, მზესუმზირა (თესლი, ზეთი), საზამთრო, ნესვი, კიტრი, პამიდორი-0.2, სიმინდი (მარცვალი)-0.05, * ბარდა, სოიო (ზეთი), რაფსი (ზეთი), კამა სოკო-0.1, იონჯა, შაქრის ჭარხალი, ხილი (თესლოვნები), კარტოფილი, პურელის მარცვალი, სტაფილო, სოიო (მარცვალი)-0.05, კენკრა (ყველა)-	არრივო, შერპა, ციტკორი, ინტა-ვირი, ციპერსანი, ციმბუმი, კინმიქსი, ნურელ დ (231), ვალსარელი (231), ფიური, ვალსაციპერი, ტენჩანტი (231), ალექსანდერ, რიგომეტრინი, ციპი პლუს (231), კრალი, სიპერკორი, საირუქსი, ეფდალ ფოსეტრინი (231), ქლორპირიტი- აგრო (231), ციპრინი, კინმიქსი უმზ, ეფდალ
------	---	------	----------------	------------------	------	------------------------------	--	---



							0.01, ხილი (კურკოვანი)-0.1*, თევზი-0.0015, მსხვილფეხა საქონლის, ცხერის, ღორის, ფრინველის ხორცი, ღვიძლი, თირქმელები, ქონი-0.2, მროხის რძე,-0.05, კვერცხი-0.1	კიმეტრინი , სანსირო (231)
238.	ციპროდინილი	0.02	/0.7	0.1/ (ორგ)	/0.8	/0.01	თესლოვანი ხილი-1,0, კურკოვანი ხილი-2,0, ყურძენი-2,0	ხორუსი, სვიტჩი (213), ციპრო პლიუსი, კორუსი, კარპაზი 50 წზგრ, სტრაჟი

3.ო) 245-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

245.	ჰიბერელინის მჟავა	ნა	ნა	ნა	2.0	0.2	ნა	გოლდ გიბზი, გიბგრო 20%, ევდალ ბლუგბი
------	-------------------	----	----	----	-----	-----	----	--------------------------------------

12. 22-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.	2,4 დ	0.1	2,4-დ 500, დიკამინი, დიამინი, 2,4-დ დიმეტელამინის მარილი, ლენტეზული, ესტერონი, დიკოპურ ტოპი (31), ჰექტაფერმინი, ამინოპელიკ სუპერი (31),ლევირატი, ესტერონი 600, ფენიქსი 60%, ფენიქს გოლდი 72, გოლიაფი (31), ბესტ ამინი 500, ევდალ დიმეტრინი, ევდალ ულტრამიქსი, პაიამინი
----	-------	-----	--

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (სპოროვან-კრისტალური კომპლექსი)	10.0	ლეპიდოციდი, ლეპიდოციდი CK-M დიპელი 8ლ, ფორეი 76 ზ, დელფინი, ლიპიდინი
----	--	------	---

გ) მე-12 და მე-13 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

12.	ალფაცერმეტრინი	ად	ფასტაკი, ალპაკი, ფენდონა, ალფა ციპი, სუპერ ჰექტამეტრინი, კორტაკი, ბესტ ალფა, ევდალ ალფატრინი, ტავენა
13.	ალუმინის ფოსფითილი	0.03	ალუფიტი, ევალი, მიკალი (118), მიკალ ფლემი(118), პროფაილერი

დ) 24-ე- 26-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

24.	გლიფოსატი	0.001	გლიპერი, გლიფოგანი, გლიფოსატი, გლიფოსანი, მამბა, კლინი, ნოკდაუნი, ვალსაგლიფი, ურაგანი, ურაგანი ფორტე, კლინი, დომინატორი, რაუნდაპი მაქსი, რაუნდაპი ექსტრა, გლიაგინტი, გეიზერი, ზერო, პაროქსიფენი, კორფოსატი მაქსი, კლიმი, სვიპი , ევდალ იზოფოსატი 36, ევდალ იზოფოსატი 48, სონრაუნდი 48, კლინ აპი, სანფორსი, ბოქსერი
-----	-----------	-------	--



25.	გოგირდი	ად	გოგირდი, თიოვიტი ჯეტ, პოვერ სულფური, კუმულუს დფ, ორიუსული(93), სულფოლაკი, სულფი, კარჯილ დფ, კოსავეტი, გოგირდი, უნიკორნი (93), ეფდალ სულფური, სულფექს გოლდი, ფაინსულფური
26.	დელტამეტრინი	ად	დეცისი ზლუ, დეცისი ექსტრა, დეცისი უშმ, დეცისი პროფი, დელტა, დელტარინი, დეცის ფლუქსი ევ 25, ჰექტამ დელტარინი 12,5 უშმ , ეფდალ დელმეტრინი, დეკაგარდი, პრედატორი, ოზოლდესისი

ე) 33-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

33.	დიმეთიატი	0.0014	ბი-58 ახალი, საფაგორი, დინგო, დანადამი, პოლიგორი, ბი-ფოსფინი, ბიიტალი, დემეტრა, დი-68, კორუმაგორი, დენტისი, დიმევიტი, ეფდალ კემიდონი, ალპგორი, ფოს-ბი, ვერტიკალი
-----	-----------	--------	--

ე) 35-ე-37-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

35.	დიმეტომორფი	0.17	აკრობატი მც, ავანგარდი, სფინქს ექსტრა(118), დიმაწკო, ლიდერი, აკრობატ ტოპი,მანკოცებ სუპერი, ფაიტერ ზლუ (91), ეფდალ აკრობოტი , მაქსიმუმი, კამბაზი, ორვეგო
36.	დინიკონაზოლი, დინიკონაზოლი მ	0.0003	სუმი-8, კონილი, მაქსილი-8, ალიანსი , სონფიქსი 1,ეფდალ დინექსი
37.	დიფენკონაზოლი	0.0004 0.006	სკორი, სკორპიონი, ფუნიქსი, დივიდენდი დივიდენდ სტარი(127), სკაპი, ტასპა (84), სელესტ ტოპი (44), ატიკი (124), ჰარბორი (84), კორბეტი, აპლორი, ბროდერი (84), სკანდალი 250 ეკ, ჯეკ პოტი (76), რაიოკი, დინალი, ეფდალ დონაზოლი, სამშიტი (61), რევეუს ტოპი, ოზოლდიფეკორე, ეფდალ დიფენპრო (84)

ზ) 45-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

45.	თიოფანატ-მეთილი	0.26	ტოფსინ მ, რექს დუო(40), კვარტეტი
-----	-----------------	------	----------------------------------

თ) 50-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

50.	იმิดაკლოპრიდი	1.0	გაუჩო, კონფიდორი, კონფიდორი მაქსი, სულტანი, მიდაში, კონფიდორ ოილი, წუპრიდი, კომპრადორი, იმიდორი მაქსი, პრესტიჟი , პრემიუმი, სინოპრიდი, იმიჯი, კომპრადორ ოილი, პერფექტო (62), ანტიკოლორადო (62), ანტიხრუშში, ეფედორ ოილი, იმიდამექსი, მიდაში პლიუსი, გორტკა, მატადორ გრანდი (66,123) ეფდალ იმიდრიდი 700, ეფდალ იმიდრიდი 60 ითშ
-----	---------------	-----	--

ი) 53-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:



53.	იპროდიონი	0.003	ეფდალ იპროდიონი, ზეანოლი
-----	-----------	-------	--------------------------

კ) 55-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

55.	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი	0.004	ტოქტა სუპერი, ფორმულა სუპერი, კვინ სტარ მაქსი, ჰელგა სუპერი, ეფდალ ზალსუპერი, სერ სუპერი
-----	--------------------	-------	--

ლ) 57-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

57.	კლოდინაფოპ-პროპარგილ	0.25	ტოპიკი, კონკერი, ციტეიშნ, კოვზი, ტერდოკი, ეფდალ კლორალი, ტოკაპი
-----	----------------------	------	---

მ) 61-ე და 62-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

61.	კრეზოქსიმ-მეთილი	0.003	სტრობი, პროგრესი, კოლოსი, სტრობსტარი, დრენჩი, სამშიტი (37), ეფდალ კრესდიტი
62.	ლამბდაციგალოტრინი	ად	კარატე, კარატე ზეონი, ვალსამბა, კაიზო, გრანდი, კუნგ ფუ, კუნგფუ სუპერი (44), პერფექტო (50), ანტიკოლორადი (50), ეფდალ ლამტორინი, ტეკვანდო კაპსულა, ამპლიგო, კავანჩა, იზოლლატე

ნ) 66-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

66.	მეტალაქსილი	0.01	აპრონი, რიდომილ მც, რიდონეტი მც, ვალსალაქსილი, იუნომილი მც, მეტალაქსანი, ვიქტორი, ტროპერი, მაქსიმო, რიდონეტ გოლდი მც, საფა რიდონეტ გოლდი მც, უნივერსალი, ვალსალაქსილ ჩ პლიუსი (120), მანკოლაქსილი, რიდოზემი მც-72, მალზემი, არმეთილი, პატრული, მაქსალინი, ეფდალ მანტალაქსი , მატადორ გრანდი (50, 123), მელტემი, მალზემი
-----	-------------	------	--

ო) 69-ე და 70-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

69.	მეტსულფურონ-მეთილი	0.007	მეტსი, როტტერი, ალე, იმპერატორი, პატრული, ეფდალ მეტეორი
-----	--------------------	-------	---

პ) 70-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

			ზენკორი, მეჯესტიკი, ბარნელაცელი, ზენკორი 600,
--	--	--	---



70.	მეტრიზუზინი	ად	სენკრონი, მეტეორი, მეტრიკი (59), კურმუზინი, არკადე, ეფდალ მეზუზინი, ანტისაპა, უნიმარკი
-----	-------------	----	--

ჟ) 74-ე- 76-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

74.	ოქსიფლუორფენი	0.001	გოალი, გალაქსი, გალიგანი, პექსი, პაროქსიფენი, კოლტარი, ეფდალ ოქსოსტი
75.	პენდიმეტალინი	0.006	სტომპი, ვალსატოპი, სტოპი, პანდორა, პენდიგანი, სპონსორი, ჰერბიმატი, პანდა, ეფდალ პენალინი
76.	პენკონაზოლი	0.1	ტოპაზი, პრეფექტო, პინნაკლი, პენ ფორსი, ტოპკონაზოლი, ეფექტი, პესოსი, ეფდალ პეკოზოლი, პენკილერი, ფულასი, ჯეკ პოტი (37), პენკილერი, ერპლანტი

რ) 83-ე და 84-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

83.	პროპარგეტი	0.004	ომაიტი, ვალსარგეტი, საფმაიტი, პროპაფექტო, ომნუსი, გოლდმაიტი, ეფდალ პრომიტე
84.	პროპიკონაზოლი	0.00006	ალტო-სუპერ (127), ტილტი, ტილტი პრემიუმი, ტასპა (37), ჰარბორი (37), ბროდერი (37), ომნუსი, სანაზოლი, გოლდმაიტი, ტილტუსტი, ზამპერი, ტი რექსი (97), პროპიკონაზოლი, ეფდალ დიფენარო (37)

ს) 91-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

91.	სპილენძის ქლორფანგი	0.004 (0.001 სპილენძზე გადაანგარიშებით)	სპილენძის ქლორფანგი, ოქსიზომი (73), აზიგა პიკი, სუპერ კოპერი, კუპროკაფარო, კუპროფლო, ციხომი ბლუ (125), ნეორამი, პექტამ ბაკირი , კურზატი (123), ექსპერტი ტიმი (123), ოსიქლორი, ფაიტერ ბლუ (35), სქაინერი, პერგადო C, მელოდი კომპაქტი, რაპიდ გოლდი, რაპიდ გოლდი პლიუსი (123), კუპერ მაქსი, აირონი, ოსიქლორი, რიდომილ გოლდ პლიუსი (71), ორდანი, მეტკუპერი, ოსიქლორი 35 წდგრ
-----	---------------------	--	---

ტ) 93-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

93.	ტებუკონაზოლი	0.1	რაქსილი, ფოლიკური, ფოლიკურ ბტ(95), ფალკონი (94), ნატიკო 75, მისტიკი, როდოლიტი, როდოლიტ სუპერი, ორიუსული (25), როდოლიტი ექსტრა, უნიკორნი (25), გიზმო, რუზინი, ტებუჯი, რაქსილ ულტრა, ჯენსილი, ნატიკო, არბალეტი, სერტიკორი (71), მისტიკი 250 ზნე
-----	--------------	-----	---



უ) 97-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

97.	ტრიადიმეფონი	0.2	ბაილეტონი, ვალსატონი, აზოცენი, ფოლიკური ბტ (92), აგსტარი 250 ეკ, ტირექსი (84), ბაისტარი
-----	--------------	-----	---

ფ) 122-ე და 123-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

122.	ქლორპირიფოსი	ად	დურსბანი, დურსბანი უმშ, ნურელ დ (126), ვალსარელი (126), ტენჩანტი (126), ლოქსლი, საირენი, პიროელექტრა , პირინექს სუპერი (123), სარბანი, პირინექსი, პრიბან 25 სვ, ციპი პლიუსი (126), ევდალ ფოსეტრინი(126), პირიფოსი, ქლორპირიფიტ-აგრო (126), ჰექტამ პრიბანი 240 უმშ, ალბანი, ზრენდ დ, სერბანი, სანსირო (126)
123.	ციმოქსანილი	0.001	კურზატი რ (89), იტერალი, ექსპერტ ტიმი (89), ჯურზები, რაპიდ გოლდ პლიუსი (91), რაპიდ გოლდი , კორზ სუპერი, ვალსალექსილ ჩ პლიუსი , საფაკოლი კომბი, კარზები, მატადორ გრანდი (50,66), ალექტო, ევდალ მოკანი, ერფრუტი, ევდალ პიროქსომი, სუპერ სტარი

ქ) 126-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

126.	ციპერმეტრინი	ად	შერპა, არრივო, ფიური, ვალსაციპერი, ციპერმეტრინი, ნურელ დ (122), , ტენჩანტი (122), ალექსანდერ, რივომეტრინი, ციპი პლიუსი (122), სიპერკორო, კრალი, საირუქსი, ევდალ ფოსეტრინი (119), ქლორპირიფიტ აგრო, (122), ციპრინი, ევდალ კიმეტრინი, სანსირო (122)
------	--------------	----	---

ღ) 129-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

129.	ჰიბერლინის მცავას ნატრიუმის მარილი	0.1	ჰიბერსიბი, გოლდ გიბზი, გიბგრო 20%, ევდალ ბლუგები
------	------------------------------------	-----	--

13. 23-ე მუხლს:

ა) დაემატოს 19¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

19 ¹ .	ალიონი 500 სკ, კს	ინდაზიფლამი (500 გ/ლ)	III
-------------------	-------------------	------------------------	-----



ბ) დაემატოს 26¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

26 ¹ .	ამპლიგო 150, მკს	ქლორანტრანილიპროლი+ ლამბდა-ციგალოტრინი (100გ/ლ+ 50 გ/ლ)	III
-------------------	------------------	---	-----

გ) დაემატოს 28¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28 ¹ .	ანტისაპა, სფ	მეტრიბუზინი (700 გ/კგ)	II
-------------------	--------------	-------------------------	----

დ) დაემატოს 52¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

52 ¹ .	ზაისტარი 250 კკ	ტრიადიმეფონი (250 გ/ლ)	U
-------------------	-----------------	------------------------	---

ე) დაემატოს 67¹ და 67² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

67 ¹ .	ბონზი 004 სკ	პაკლოზუტრაზოლი (4 გ/ლ)	II
67 ² .	ზორდო სალდეგო 20 სფ	სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)	III

ვ) დაემატოს 98¹ და 98² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

98 ¹ .	გორტკა, წდფთშ 70	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
98 ² .	გრინ გარდ სკ პრემიუმი	Metarhizium acridum F1-985	III



ზ) დაემატოს 149¹ და 149² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

149 ¹	ერფრუტი 50 სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
149 ²	ესკაპე 20 ხფ	აცეტამიპრიდი (200 გ/კგ)	U

თ) დაემატოს 157¹ და 157² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

157 ¹ .	ეფდალ ბლუგები, 20 წხ	ჰიპოზერლინის მჟავა (20 გ/ლ)	U
157 ² .	ეფდალ დელმეტრინი, კკ	დელტამეტრინი (25 გ/ლ)	III

ი) დაემატოს 159¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

159 ¹ .	ეფდალ დიფენპრო, კკ	დიფენკონაზოლი+ პროპიკონაზოლი (150+150 გ/ლ)	U
--------------------	--------------------	--	---

კ) დაემატოს 163¹ და 163² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

163 ¹ .	ეფდალ იმიდრიდი 70 წდფთშ	იმიდაკლოპრიდი (700 გ/კგ)	III
163 ² .	ეფდალ იმიდრიდი 60 სკ	იმიდაკლოპრიდი (600 გ/ლ)	III

ლ) დაემატოს 164¹ პუნქტი და გამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

164 ¹ .	ეფდალ კაპტანიმი 50 სფ	კაპტანი (500 გ/კგ)	II
--------------------	-----------------------	--------------------	----

მ) დაემატოს 165¹ და 165² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

165 ¹ .	ეფდალ კიმეტრინი 25 ეკ	ციპერმეტრინი (250 გ/ლ)	II
165 ² .	ეფდალ კრესდიტი 50 წდგრ	კრეზოქსიმ-მეთილი (500 გ/კგ)	U



ნ) დაემატოს 166¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

166 ¹ .	ეფდალ ლოქსზინი 50% წდგრ	ტრიფლოქსისტროზინი (500 გ/კგ)	III
--------------------	-------------------------	------------------------------	-----

ო) დაემატოს 167¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

167 ¹ .	ეფდალ მანტალაქსი, სფ	მეტალაქსილი + მანკოცები (80+640 გ/კგ)	U
--------------------	----------------------	---------------------------------------	---

პ) დაემატოს 168¹ - 168³ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

168 ¹ .	ეფდალ მეტეორი , სფ	მეტსულფურონ-მეთილი (200 გ/კგ)	U
168 ² .	ეფდალ მოკანი, მდს	ციმოქსანილი+სპილენძი (42+397,5გ/კგ)	U
168 ³ .	ეფდალ ოქმოსტი 240 კვ	ოქსიფლუორენი (240 გ/ლ)	U

ჟ) დაემატოს 169¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

169 ¹ .	ეფდალ პენალინი 330 კვ	პენდიმეტალინი (330 გ/ლ)	U
--------------------	-----------------------	-------------------------	---

რ) დაემატოს 170¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

170 ¹ .	ეფდალ პიროქსომი 76 სფ	პროპინეზი+ციმოქსანილი (700 გ/კგ+60 გ/კგ)	U
--------------------	-----------------------	---	---

ს) დაემატოს 174¹ და 174² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

174 ¹	ეფდალ ტეზუსაი, სფ	ტეზუფენპირატი (200 გ/კგ)	U
174 ²	ეფდალ ულტრამიქსი , სე	2,4 დ-2-ეთილჰექსილი ლ/ლ+ფლორასულამი (452,42+6,25 გ/ლ)	U

ტ) დაემატოს 209¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

209 ¹ .	ზეანოლი 50 სფ	იპროდიონი (500 გ/კგ)	U
--------------------	---------------	----------------------	---



უ) დამატოს 241¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

241 ¹ .	კამბაზი მც, სფ	მანკოცები+დიმეტომორფი (600 გ/კგ+ 90გ/კგ)	U
--------------------	----------------	--	---

ფ) დამატოს 257¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

257 ¹ .	კლინ-აპი, 480 ს	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U
--------------------	-----------------	---	---

ქ) დამატოს 268¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

268 ¹ .	კონრადი, სვ	აზოქსისტრობინი (250 გ/ლ)	U
--------------------	-------------	--------------------------	---

ღ) დამატოს 273¹ და 273² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

273 ¹ .	კოპერ-ქაუნტი-N , ხვ	სპილენძამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი (271,5 გ/ლ)	III
273 ² .	კორაგენი, სვ	ქლორანტრანილიპროლი (200 გ/ლ)	U

ყ) დამატოს 307¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

307 ¹ .	ლეპიდინი, სვ	Bacillus thuriensis var.rehcnfrb (ზა-2000 აე/მგ)	U
--------------------	--------------	--	---

შ) დამატოს 336¹ - 337¹ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

336 ¹ .	მატადორ გრანდი, სდვ	იმიდაკლოპრიდი+მეტალაქსილი+ციმოქსანილი (200+100+100)	U
--------------------	---------------------	---	---

337 ¹ .	მესალინი, სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (400+40 გ/კგ)	U
--------------------	--------------	-------------------------------------	---



ც) დაემატოს 348¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

348 ¹ .	მელტემი, სვ	მანკოცები+მეტალაქსილი (640+80 გ/კვ)	U
--------------------	-------------	-------------------------------------	---

ძ) დაემატოს 363¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

363 ¹ .	მისტიკი 250 წზე	ტეზუკონაზოლი (250 გ/ლ)	II
--------------------	-----------------	------------------------	----

წ) დაემატოს 392¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

392 ¹ .	ორვეგო, კს	დიმეტომოროფი+ამეტოკტრადინი (225+300 გ/ლ)	III
--------------------	------------	--	-----

ჭ) დაემატოს 393¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

393 ¹ .	ოსსიქლორი 35 წდგრ	სპილენძის ქლორფანგი (სპილენძის მიხედვით 350 გ/კვ)	II
--------------------	-------------------	--	----

ბ) დაემატოს 393² პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

393 ² .	პაიამინი , წხ	2,4 დ დიმეტილამინის მარილი (500 გ/ლ)	III
--------------------	---------------	---------------------------------------	-----

ჯ) დაემატოს 420¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

420 ¹ .	პოლტიგლი მანიაკა , წდგრ	ბორდოული სითხე 20% (სპილენძის მიხედვით 200 გ/კვ)	II
--------------------	-------------------------	--	----

ჰ) 454¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:



454 ¹ .	რევუს ტოპი 500 სკ	მანდიპროპამიდი + დიფენჰოკონაზოლი (250+250 გ/ლ)	U
--------------------	-------------------	--	---

3.ა) დაემატოს 480¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

480 ¹ .	საშხიტი, კვ	კრეზოქსიმ-მეთილი + დიფენჰოკონაზოლი (100+ 200 გ/ლ)	U
--------------------	-------------	---	---

3.ბ) დაემატოს 482¹ და 482² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

482 ¹ .	სანსტეპი სკ	ნიკოსულფურონი (40 გ/ლ)	U
482 ² .	სანფორსი 48 წხ	გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი (480 გ/ლ)	U

3.გ) დაემატოს 489¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

489 ¹ .	საფკონილი 500 სკ	ქლოროტალონილი (500 გ/ლ)	U
--------------------	------------------	-------------------------	---

3.დ) დაემატოს 492¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

492 ¹ .	სერ სუპერი, კვ	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი (50 გ/ლ)	III
--------------------	----------------	-----------------------------	-----

3.ე) დაემატოს 509¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

509 ¹ .	სონფიქსი1 ფთშ	დინიკონაზოლი (10 გ/კგ)	U
--------------------	---------------	------------------------	---

3.ვ) დაემატოს 522¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

522 ¹ .	სტრაჟი, სე	ციპროდინილი (750 გ/ლ)	U
--------------------	------------	-----------------------	---



3.ზ) დაემატოს 534¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

534 ¹ .	სუპერსტარი , სფ	მანკოცები+ციმოქსანილი (450+50 გ/კგ)	U
--------------------	-----------------	-------------------------------------	---

3.თ) დაემატოს 537¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

537 ¹ .	ტავანა 100 ევ	ალფავიპერმეტრინი (100 გ/ლ)	III
--------------------	---------------	----------------------------	-----

3.ი) დაემატოს 560¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

560 ¹ .	ტოკაპი 240 ევ	კლოდინაფოპ-პროპარგილ+ კლოკვინტოსეტ-მექსილ (240 გ/ლ+20 გ/ლ)	U
--------------------	---------------	--	---

3.კ) დაემატოს 579¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

579 ¹ .	ფაინსულფური 80 წდგრ	გოგირდი (800 გ/კგ)	U
--------------------	---------------------	--------------------	---

3.ლ) 598¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

598 ¹ .	ფლუმატი 200 სკ	დიფლოვიდაზინი (200 გ/ლ)	II
--------------------	----------------	-------------------------	----

3.მ) დაემატოს 637¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

637 ¹ .	ჯენსილი, სკ	ტებუკონაზოლი (60გ/ლ)	U
--------------------	-------------	----------------------	---

3.ნ) დაემატოს 651-652 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

651.	ჰიდრომიკრონი 77 სფ	სპილენძის ჰიდროქსიდი (700 გ/კგ)	III
------	--------------------	----------------------------------	-----



652.	პიპნოზი 05 წხგრ	ქემაქეტინ ბენზოატი (50 გ/კგ)	ს
------	-----------------	------------------------------	---

13. 25-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.	აბამექტინი	ვერტიმეკი, ტორპედო, ალაგმეკი 1,8, ვერტამექტინი ფორტე 50 წდგრ
----	------------	--

ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.	აცეტამიპრიდი	აცე, მოსეტამი, ტემპი, გოლდპლანი, ეფდალ აფიტრიდი, ესკაპე
----	--------------	---

გ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

9.	გლიფოსატი	გლიალკა, გლისოლი, გლიფოსატი, რაუნდაპი, დომინატორი, კლინი, ნოკდაუნი, ვალსაგლიფი, გლიფოსანი, გლიაცინტი, გეიზერი, ურაგანი ფორტე, ზერო, გლიფოგანი, რუმზო, სეიპი, კლიმი, კორფოსატ მაქსი, სეიპი, ფელიქსი, სმერჩი, გლინი, ტორნადო, გლიფოვიტი, რაუნდაპი მაქსი, რაუნდაპი ექსტრა, რაუნდაპი მაქსი, პაროქსიფენი, კორფოსატი მაქსი, ეფდალ იზოფოსატი 36, ეფდალ იზოფოსატი 48, სონრაუნდი 48, კლინ აპი, სანფორსი 48, ბოქსერი
----	-----------	--

დ) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

11.	გოგირდი	გოგირდი, კოლოიდური გოგირდი, თიოვიტი ჯეტ, პოვერ სულფური, კუმულუსი დფ, ორიუსული, სულფოლაკი, სულფი, კოსავეტი, კარჯილ დფ, გოგირდ +, ეფდალ სულფური, სულფექს გოლდი, ფაინსულფური
-----	---------	---

ე) მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

15.	დინიკონაზოლი მ	სუმი-8, კონილი, მაქსილ-8, ალიანსი, სონფიქსი 1 ფთშ
-----	----------------	---

ვ) მე-16 და მე-17 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

16.	დიფენოკონაზოლი	დივიდენდი, დივიდენდი სტარი, სკორი, სკორპიონი, ფუნიქსი, სკაპი, ტასპა, ატიკი , სელესტ ტოპი, კორბეტი, ჰარბორი, აპპლორი, ბროდერი, სკანდალი, ჯეკ-პოტი, რაიოკი, დინალი, ეფდალ დონაზოლი, სამმიტი, ეფდალ დიფენპრო, რევუს ტოპი, იზოლდეფეკორე
17.	დიფლუბენზურონი	დიმილინი, ჰეროლდი

ზ) 25-ე-27-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

		აკრობატ მც, დითან მ-45, რიდომილ გოლდი მც, გალბენი მ-5-68, კლიპი, ვალსაზები,
--	--	---



25.	მანკოცები*	რიდონეტი მც, ავანგარდი, მანგრიფი, რაპიდ გოლდი, რაპიდ გოლდი პლუს, კურზები, საკოზები, მანკოში, მანკოსილი, ტროპერი, მაქსიმო, მანკოცები- სუპერი , მანკოლაქსილი, კუპროფიქსი 30 დისპერს, კადილაკი, ეფდალ აკრობოტი, ეფდალ ციმოქსაზები, დრაკო ბლუ, მანკოზატი მც არმეთილი, მალზები , მაქსიმუმში, პატამილი, კარზეპი , ეფდალ მანტოლაქსი , მაქსალინი , სუპერსტარი, კინგკოზები მ-45, ერფრუტი , კამზაზი , მელტემი
26.	მეტალაქსილი	აპრონი, რიდომილ მც, ვალსალაქსილი, რიდონეტი მც, ტროპერი, მაქსიმო, ვალსალაქსილი ჩ პლიუსი, იუნომილი მც, მეტალაქსანი, ვიქტორი, პრომეთე, მ-2 , მანკოლაქსილი, რიდოზები მც-72, რიდონეტ გოლდ მც 68 სფ, არმეთილი მ, პატამილი, მალზები მ-2 , უნივერსალი , მატადორ გრანდი, ეფდალ მანტოლაქსი, მელტემი
27.	მეტსულფურონ-მეთილი	მეტსი, როტტერი, ალე, იმპერატორი, პატრული, ეფდალ მეტეორი

თ) 30-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

30.	ოქსიფლორფენი	ალაქსი, გალიგანი , გალაქსი, ფორმულა სუპერი, პექსი, კოლტარი, ეფდალ ოქმოსტი
-----	--------------	---

ი) 36-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

36.	ტრიფლოქსისტრობინი	ზატო, ზატო სტარი, ფლინტი, ფლინტ სტარი, რიფიტი, ლუნა სენსიშენ სკ 500, ეფდალ ლოქსბინი
-----	-------------------	---

კ) 43-ე და 44-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

43.	ციმოქსანილი	კურზატი რ, იტერალი, რაპიდ გოლდი, რაპიდ გოლდი პლუს, კურზები, კორზ სუპერი, ექსპერტ ტიმი , საფაკოლი კომბი, ტანოსი, ეფდალ ციმოქსაზები, ზახისტი, ორდანი, ენერკოლ კომბი, ალექტო, მატადორ გრანდი, სუპერსტარი, ეფდალ მოკანი, ეფდალ პიროქსონი, ერფრუტი
44.	ჰიბერლინის მჟავას ნატრიუმის მარილი	ჰიბერსიბი, გოლდ გიბზი, გიბგრო, ეფდალ ბლუგები

ლ) 46-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

46.	ჰიმექსაზოლი	ტაჩიგარენი, ტაგიანტი
-----	-------------	----------------------

14 .28-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 28. საქართველოში რეგისტრირებული მოქმედი ნივთიერებების ჩამონათვალი

N	მოქმედი ნივთიერება	პრეპარატის სავაჭრო დასახელება	ჯგუფი	ხელახალი რეგისტრაციის ვადა (თვე, წელი)
---	--------------------	-------------------------------	-------	--



1	2	3	4	5
1	აბამექტინი	ვერტიმეკი	ბი	09. 2015
	„	ტორპედო	„	11. 2018
	„	ალგამეკი 1,8	„	04.2017
		ვერტამექტინ ფორტე 50	„	02.2019
2	აზოქსისტრობინი	კვადრისი	ფუნგ	10. 2014
		კონრადი	„	10.2018
3	აზოქსისტრობინი+ფოლპეტი	კვადრის მაქსი	ფუნგ	09.2015
4	ალუმინის ფოსფორილი+ ფოლპეტი	მიკალი	ფუნგ	12. 2014
	„	მიკალ ფლეში	ფუნგ	01.2018
5	ალუმინის ფოსფორილი-პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	პრევიკურ ენერჯი	„	12.2014
6	ალუმინის ფოსფიდი	ფოსტოქსინი	ფუმ	11. 2015
	„	ვალსაფიდი	„	11. 2015
	„	შენფოსი	„	12.2017
	„	იონგფოსი	„	02.2018
	„	აგრიფოსი	„	04. 2018
7	ალფა-პინენი+პ-ჰიდროქსიბენზოიკ მჟავა+ეტანოლი	ტომოვიტი	ფერ	07.2016
8	ალფა-ციპერმეტრინი	ფასტაკი	ი	10. 2014
	„	ალპაკი	„	12. 2014
	„	ფენდონა	„	11.2015
	„	ალფა-ციპი	„	11.2015
	„	სუპერ ჰექტამეტრინი	„	07. 2016
	„	კორტაკი	„	10. 2016
	„	ზესტ ალფა	„	04.2017
	„	ეფდალ ალფატრინი	„	06.2017
	„	ტავანა		03.2019
9	ამიდოსულფურონი+იოდოსულფურონ- მეთილი	გროდილ მაქსი	3	11.2015
10	ამონიუმის გლუფოსინატი	ზასტა	3, დეფ	12.2017
11	ატრაზინი+პრომეტრინი	კოკო გოლდი	3	05.2019



12	ავეტამიპრიდი	ავე	ი	09. 2015
	“	მოსეტამი	“	05.2014
	“	ტემპი	“	12.2014
	”	გოლდპლანი	”	04.2018
	”	ეფდალ აფიტრინი	”	05.2018
	”	ესკაპე	”	03. 2019
13	ავეტოქლორი+ანტიდოტი	ვალსაგარდ ექსტრა	ჰ	06.2018
14	Bacillus thuriniensis subsp. kurstaki	ფორეი	ბი	02. 2018
	“	დელფინი	“	09.2015
15	Bacillus thuriniensis var. kurstaki	ლეპიდინი	”	08.2018
	”	ლეპიდოციდი სკ-მ	”	02.2019
16	ბენტაზონი	პენტაგონი	ჰ	09. 2015
	”	ბაზაგრანი	”	02.2017
17	ბეტა-ციპერმეტრინი	კინმიქსი უმშ		12. 2018
18	ბიფენტრინი	ტალსტარი	ი	10. 2014
	“	ინსაკარი	“	12.2014
19	ბიფენტრინი+ იმიდოკლოპრიდი	ანტიბრუშმი	”	10.2017
20	ზოსკალიდი	კანტუსი	ფუნგ	11.2015
21	ზოსკალიდი+პირაკლოსტრობინი	სიგნუმი	ფუნგ	11.2015
22	ზროდიფაკუმი	კლერატი	რ	12. 2017
	”	კაპკანი	”	10.2017
23	ზრომოქსინილი	ემზლემი	ჰ	11.2015
24	ზრომპროპილატი	ფაქტორი	ი	12. 2014
25	გლიფოსატი	ნოკდაუნი	ჰ	12. 2014
	”	ვალსაგლიფი	”	11. 2015
	“	გლიფოსანი	“	08.2017
	”	კლიმი	”	12.2016
	”	ფელიქსი	”	12.2017
	”	სმერგი	”	12.2017
	”	გლინი	”	12.2017



26	გლიფოსატი იზოპროპილამინის მარილი	კლინი	3	10. 2014
	“	გლიაცინტი	“	12.2018
	“	გეიზერი	“	12.2014
	“	გლიფოგანი	3, დეს	03.2015
	“	ზერო	3	11.2015
	”	კორფოსატი მაქსი	”	10.2016
	”	სვიპი	”	02.2017
	”	ეფდალ იზოფოსატი 48 წხ	”	05.2017
	”	ტორნადო	”	12.2017
		გლიფოვიტი	”	12.2017
	”	ეფდალ იზოფოსატი 360 წხ	”	02.2018
	”	სონრაუნდი 48 წხ	”	02.2018
	”	კლინ-აპი	”	01.2019
	”	სანფორსი 48 წხ	”	03.2019
		ბოქსერი	”	04.2019
27	გლიფოსატი კალიუმის მარილი	ურაგან ფორტე	3	10. 2014
	“	რუმბო	“	03.2015
	”	რუნდაპ მაქსი	”	04.2018
	”	რუნდაპ ექსტრა	”	04. 2018
28	გლიფოსატ ტრიმეზიუმის მარილი	ტოტალი	3	12.2014
	“	შოკი	“	12.2014
29	გოგირდი	თიოვიტ ჯეტ	იფ	10. 2014
	”	ჰოვერ სულფური	ფუნგ	12. 2014
	“	კუმულუს დფ	“	12.2017
	“	სულფილაკი	“	02.2019
	“	სულფი	“	12.2014
	“	კოსაცეტი	“	12.2014
	“	კარჯილ-დფ	“	12.2014
	“	გოგირდი	“	12.2014



	„	ეფდალ სულფური	„	06.2017
	„	სულფექს გოლდი	„	04.2018
	„	ფანსულფური	„	02.2019
30	დაზომეტი	ბაზამიდ გრანულიატი	ი,ნ, ფუნგ	07.2016
31	დელტამეტრინი	დეცისი ზღუ	ი	12. 2014
	„	დეცისი უმშ	„	12. 2014
	„	დეცისი პროფი	„	11. 2015
	“	დელტარინი	“	09.2018
	“	დელტა	“	12.2018
	„	დენტისი	„	10.2016
	„	დეცის ფლუქსი ეკ 025	„	07. 2017
	„	ჰექტაშ დელტარინი 12,5 უმშ	„	02.2018
		ეფდალ დელმეტრინი	„	11.2018
		პრედატორი	„	03.2019
	„	დეკაგარდი	„	03.2019
32	დიტიანონი	დელანი	ფუნგ	12.2017
	“	დიტიმეგა	“	02.2019
	„	ფოსილი	„	03.2017
33	დიტიანონი+ პირაკლოსტრობინი	ტერსელი	ფუნგ	08.2018
34	დიკამბა დმა	ვაგაბონდი	ჰ	09.2016
35	დიკამბა მყავა	დიანატი	ჰ	08.2018
36	დიკამბა მყავა+ტრიასულფურონი	ლინტური	ჰ	09. 2015
37	დიკამბა+ტოპრომაზონი	სტელარი	ჰ	12.2014
38	დიკამბა+ნიკოსულფურონი+რიმსულფურონი	ჰექტორ მაქსი	ჰ	06.2016
39	დიკვატი დიბრომიდი	რეგლონ -სუპერი	დეფ.ჰ	09.2015
40	დიმეთოატი	ბი - 58 ახალი	ი	10. 2014
	„	საფაგორი	„	12. 2014
	„	დინგო	„	06. 2018
	“	პოლიგორი	“	09.2018
	“	ბი-ფოსფინი	“	12.2014
	“	ბიიტალი	“	12.2014



	“	დემეტრა	“	12.2014
	”	დი-68	”	11.2015
	”	კორუმაგორი	”	10. 2016
	”	დიმევიტი	”	12. 2017
	”	ეფდალ კემიდონი	”	02. 2018
	”	ალპგორი	”	02.2018
	”	ფოს-ბი	”	03.2018
	”	ვერტიკალი	”	03.2019
41	დიმეტენამიდი-პ	ფრონტიერ ოპტიმა	პ	08.2016
42	დიმეტომორფი+ამეტოტრადინი	ორვეგო	ფუნგ	04.2019
43	დიმეტომორფი+ფოლპეტი	სფინქსი-ექსტრა	ფუნგ	07.2018
44	დიმეტომორფი+დიოთიანონი	აკროზატ ტოპი	ფუნგ	11.2015
45	დიმეტომორფი+სპილენძის ქლორჟანგი	ვაიტერ ბლუ	ფუნგ	12.2015
46	დინიკონაზოლი	მაქსილ-8	ფთშ	12.2017
	“	ალიანსი	“	12.2018
	”	კონილი	”	12. 2014
	”	ეფდალ დინექსი	”	07. 2018
		სონფიქსი 1 ფთშ	”	09.2018
47	დიფენოკონაზოლი	სკორი	ფუნგ	10. 2014
	”	სკორპიონი	”	11. 2015
	“	ფუნიქსი	“	02.2019
	“	სკაპი	“	12.2014
	”	კორბეტი	”	10.2016
	”	აპლორი	ფუნგ	04.2017
	”	სკანდალი	”	04.2017
	”	რაიოკი	”	12.2017
	”	ეფდალ დონაზოლი	”	02.2018
48	დიფენოკონაზოლი+კრეზოქსიმ-მეთილი	სამშეტი	ფუნგ	12.2018
49	დიფენოკონაზოლი+პროპიკონაზოლი	ტასპა	ფუნგ	12.2014
	”	ჰარბორი 300 ეკ	”	10.2016



	„	ბროდერი	„	04.2017
	„	გვკ-პოტი	„	12.2017
	„	ეფდალ დიფენპრო	„	05.2019
50	დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლი	დივიდენდი სტარი	ფთშ	09.2015
	„	ატიკი	„	11.2015
51	დიფენოკონაზოლი+ციფლუფენამიდი	დინალი	„	11. 2015
52	დიფლოვიდაზინი	ფლუმატი	ი	09.2018
53	დიფლუბენზურონი	ჰეროლდი	„	12.2017
54	ემამექტინ ბენზოატი	პროკლეიმი	ბი	09.2015
		ჰიპნოზი	„	10.2018
55	1-მეთილციკლოპროპენი	ფიტომაგი	ზრ	08.2017
56	ესფენვალერატი	სუმბი-ალფა	ი	09.2017
57	ეტოპროფოსი	მოკაპი	ი	12.2014
58	ეტოქსაზოლი	ზუმი	„	10. 2017
59	ეტოფუმეზატი+ფენმედიფამი+დესმედიფამი	ბეტანალ ექსპერტი	ჰ	12.2014
60	თიაკლოპრიდი	კალიფსო	ი	12. 2014
	“	ულტრატოქსი	“	12.2014
	„	თიაკლომექსი	„	04. 2018
61	თიაკლოპრიდი +დელტამეტრინი	პროტექსი	ი	12.2014
62	თიამეთოქსამი	აქტარა	ი	09. 2015
	„	მედალი	„	12. 2014
63	თიამეთოქსამი+დიფენოკონაზოლი+ფლუდიოქსანილი	სელესტ ტოპი	იოშ.ფთშ	09.2015
64	თიამეთოქსამი+ ლამბდაციპლოტრინი	კუნგფუ სუპერი	ი	12.2016
65	თიოფანატ-მეთილი	კვარტეტი	ფუნგ	02.2019
66	თიოფანატ-მეთილი+ეპოქსიკონაზოლი	რექს დუო	ფუნგ	08.2018
67	თირამი	თირამ გრანულო	„	06.2015
68	თუთიის ფოსფიდი	თუთიის ფოსფიდი	რ	09. 2015
	“	სუპერ ცინკი	“	07.2015
	„	რაციციდი		02.2017
69	ზეტაციპერმეტრინი	ფიური	ი	10.2014
70	იმაზალილი	მაგმატილი	ფუნგ	10.2016
71	იმაზამოქსი	პულსარი	ჰ	11.2015
72	იმაზამოქსი+იმაზაპირი	ევრო-ლაიტენინგი	ჰ	11.2015



73	იმედაკლოპრიდი	ნუპრიდი	ითშ	12. 2014
	”	კონფიდორ მაქსი	ი	11. 2015
	”	სულთანი	”	12. 2014
	“	მიდაში	“	12.2018
	“	კომპრადორი	“	07. 2014
	“	კონფიდორ ოილი	“	12.2014
	“	იმედორი მაქსი	“	12.2014
	”	იმიჯი	”	11.2015
	“	სიდოპრიდი	ითშ	12.2015
	”	კონფიდორი	ი	03.2017
	”	მიდაში პლიუსი	ითშ	03. 2018
	”	იმედამექსი	”	04. 2018
	“	გორტკა	”	09.2018
	“	ეფდალ იმიდრიდი 70 წდფთშ	ითშ	01.2019
	“	ეფდალ იმიდრიდი 60 ითშ	ითშ	04.2019
74	იმედაკლოპრიდი+ლამბდაციპალოტრინი	პერფექტო 175 სკ	”	12.2017
	”	ანტიკოლორადი	”	12.2017
75	იმედაკლოპრიდი+მეტალაქსილი+ ციმოქსანილი	მატადორ გრანდი	ითშ, ფთშ	12.2018
76	იმედაკლოპრიდი+მინერალური ზეთი	კომპრადორ ოილი 004	ი	12.2015
	”	ეფედორ ოილი	”	02.2018
77	იმედაკლოპრიდი + პენციკურონი	პრესტიჟი	ითშ, ფთშ	12. 2014
	“	პრემიუმი	ითშ, ფთშ	12. 2015
78	ინდაზიფლამი	ალიონი 500 სკ	ჰ	04.2019
79	ინდოქსაკარბი	ავანტი	ი	10. 2014
80	იოქსინილი	ტოტრილი	ჰ	12.2017
81	იპროვალიკარბი+პროპინეზი	მელოდი დუო	ფუნგ	12.2017
82	იპროვალიკარბი+სპილენძის ქლორჟანგი	მელოდი კომპაქტი	“	12.2014
83	იპრიდიონი	როვონე	ფუნგ, ფთშ	07.2018
	”	როვრალი აკვაფლო	”	02.2017
	”	კარნავალი	”	06.2017



		ეფდალ იპროდინი	ფუნგ	05.2018
	„	ზეანოლი		04.2019
84	იპსდიენოლი+2-მეთილ-3-ბუტენ-2-ოლ	იპსოვიტი	ფერ	07.2016
85	იპსენოლი+2-მეთილ-3-ბუტენ-2-ოლ	სეპსოვიტი	ფერ	07.2016
86	კაპტანი	მერპანი	ფუნგ	03.2015
	„	ონდარი	„	10.2017
	„	ეფდალ კაპტონიმი	„	11.2018
87	კარბენდაზიმი	ინდაზოლი	ფუნგ, ფთმ	09. 2015
	„	ფინალი	„	12.2014
	„	პლატინ კარბენდაზიმი	„	04.2017
88	კარბოსულფანი	მარშალი	ი	10. 2014
89	კარფენტრაზონ-ეთილი	რივეტი	ჰ, დეს	03.2019
90	კვიზალოფოპ-პ-ეთილი	თოკტა სუპერი	ჰ	07.2014
	„	ფორმულა სუპერი	„	07.2016
	„	კვინ სტარ მაქსი	„	12. 2017
	„	ჰელგა სუპერი	„	02.2018
		ეფდალ ზალოსუპერი	„	04.2018
	„	სერ-სუპერი	„	03.2019
91	კვიზალოფოპ-პ-ტეფურილი	პანტერა	ჰ	05.2016
92	კლოდინაფოპ პროპარგილი + კლოკვინტოსეტ-მექსილი	ტოპიკი	ჰ	10. 2014
	„	კონკერი	„	12. 2014
	„	ციტეიშნ	„	02. 2017
	„	კოვბოი	„	02.2018
	„	ტერდოკი		02.2018
		ტოპკაპი	„	10.2018
		ეფდალ კლორალი	„	02.2019
93	კლოპირალიდი	ლიონი 300 წხ	„	08.2017
94	კლოთიანიდინი	პონწო ითმ 600	ითმ	01.2018
95	კლოთიანიდინი+პენფლუფენი	ემესტო კვანტუმი	ითმ+ფთმ	02.2018
96	კლოფენტინი	აპოლო	ი	03.2015
97	კრეზოქსიმ-მეთილი	სტრობი	ფუნგ	10. 2014



	”	პროგრესი	”	09. 2015
	“	სტრობსტარი	“	12.2014
	”	დრენჯი	”	04.2017
		ეფდალ კრესდითი 50 წდგრ	”	01.2019
98	კრეზოქსიმ-მეთილი+ბოსკალიდი	კოლლისი	ფუნგ	08.2018
99	ლამბდა-ციპლოტრინი	კარატე	ი	10. 2014
	”	კარატე ზეონი	”	12. 2017
	”	ვალსამზა	”	11. 2015
	“	კაიზო	“	12.2018
	“	გრანდი 5	“	02.2019
	“	კუნგ ფუ	“	12.2014
	”	ეფდალ ლამტორინი	”	02.2018
		ტეკვანდო კაპსულა	”	10.2018
		კავანზა	”	03.2019
100	ლინურონი	აფალონი	ჰ	07.2018
101	ლუკრეზინი	ბიორაგი	ზრ	04.2017
102	ლუფენურონი	მატჩი	ი	09.2015
		ზოქსი	ძ	12.2017
103	მალათიონი	მალაფოსი	ი	09. 2015
104	მანდიპროპამიდი+სპილენძის კლორფანგი	პერგადო C	ფუნგ	08.2017
105	მანდიპროპამიდი+დიფენოკონაზოლი	რევუს ტოპი	ფუნგ	12.2013
106	მანკოცები	ვალსაზები	ფუნგ	06. 2018
	“	დითანი მ-45	“	02.2018
	“	საკოზები	“	07.2018
	“	მანკოში	“	12.2018
	“	მანკოსილი	“	09.2018
	“	კლასიკა	“	12.2014
	“	მანგო	“	12.2014
	”	მანგრიფი 75 წდგრ	”	06.2016
	”	კადილაკი	”	09.2016
	”	დრაკო ბლუ	”	10.2017



	„	ეფდალ მაკო მ-45	„	12.2017
		მანკოზატი მც	„	12.2017
	„	კინგოზები მ-45	„	02.2019
107	მანკოვები +ბენალაქსილი	გალბენი მ 8-65	ფუნგ	10. 2014
108	მანკოვები+დიმეთომორფი	ავნგარდი	ფუნგ	12. 2014
	„	აკრობატი მც გრ	“	12. 2017
	“	დიმანკო	“	02.2019
	“	ლიდერი	“	12.2014
	“	მანკოვები-სუპერი	„	11.2015
	„	ეფდალ აკრობოტ მც	„	06.2017
		მაქსიმუმი	„	04.2018
	„	კამბაზი მც	„	05.2019
109	მანკოვები+მეტალაქსილი	რიდონეტი მც	ფუნგ	12. 2014
	„	ვალსალაქსილი	„	06. 2018
	“	მეტალაქსანი	“	08.2017
	„	ვიქტორი	„	09. 2015
	“	ტროპერი	“	09.2018
	“	პრომეიე	“	12.2014
	“	მ-2	“	12.2014
	„	მანკოლაქსილი	„	02.2017
	„	რიდოზები მც-72	„	05.2017
	„	არმეთილი მ	„	12.2017
		პატამილი	„	04.2018
	„	მალზები	„	03.2018
		ეფდალ მანტალაქსი	„	11.2018
	„	მელტემი	„	05.2019
110	მანკოვები+მეტალაქსილი მ	მაქსიმო	ფუნგ	12.2018
	“	საფა რიდონეტ გოლდი მც 68	“	07.2014
	“	უნივერსალი	“	12.2014



111	მანკოცები + მეფენოქსამი	რიდომილ გოლდი მც წდგრ	ფუნგ	12. 2017
112	მანკოცები + ფამოქსადონი	კლიპი	ფუნგ	10. 2014
113	მანკოცები + ციმოქსანილი	კურზები	ფუნგ	05.2018
	“	რაპიდ გოლდი	“	12.2017
	“	კორზ სუპერი	“	12.2018
	“	ვალსალაქსილ C პოლიუსი	“	06.2018
	“	სპრინტი	“	12.2014
	”	ეფდალ ციმოქსაზები	”	12.2017
	”	კარზები	”	03.2018

	”	მაქსალინი	”	12. 2018
--	---	-----------	---	----------

	”	სუპერსტარი	”	01.2019
	”	ერფრუტი	”	03.2013
114	მანკოცები + ციმოქსანილი+სპილენძის კლორკანგი	რაპიდ გოლდი პლუსი	ფუნგ	12.2017
115	მეთირამი	პოლირამი დფ	ფუნგ	12.2017
	”	სოლორამი	”	12.2016
116	მეთირამი +პირაკლოსტრობინი	კაბრიო ტოპი	ფუნგ	11. 2015
117	მეთირამი+ციმოქსანილი	ალექტო	ფუნგ	10.2018
118	მეზოტრიონი+ ნიკოსულფურონი	ელუმისი	ჰ	07.2017
119	მეზოტრიონი+მეტალოქლორი+ტერბუტილაზინი	ლუმასი	ჰ	09. 2015
120	Melaleuka Alternifolia -ს ეთერზეთი	ტიმოქესი	ზფ	12. 2014
121	მეტადეჰიდი	სნეილ გრანულს	ლიმ	09.2014
	”	მეტადეჰს პელეტი	ლიმ	02.2018
122	მეტამ-სოდიუმი	ნემასოლი	ფუნგ, ი, ნ	11. 2015
123	Metarhizium acridum	გრინ გარდ სკ პრემიუმი	ბი	01.2019
124	მეტომილი	ლანატი	ი	12.2015
125	მეტრაფენონი	ვივანდო	ფუნგ	11.2015
126	მეტრიბუზინი	ზენკორი	ჰ	12. 2014
	“	ზენკორი ლიკვიდი 600	“	12.2014



	“	ზენკორი ლიკვიდი 600	“	12.2014
	”	მაგესტიკი	”	12. 2014
	“	ბარნელაცელი	“	02.2019
	“	სენკრონი	“	07.2014
	“	მეტეორი	“	12.2014
	“	სურდონი	“	03.2015
	”	კურმუზინი	”	10.2016
	”	ეფდალ მებუზინი	”	03.2018
	”	უნიმარკი	”	04.2018

	”	ანტისაპა	”	12.2018
--	---	----------	---	---------

127	მეტრიზუზინი+კლომაზონი	მეტრიკი	ჰ	12.2014
128	მეტსულფურონ-მეთილი	მეტსი	ჰ	09. 2015
	“	როტტერი	“	12.2017
	“	ალე 20 სფ	“	07.2014
	“	იმპერატორი	“	12.2014
	”	პატრული	”	02.2018
	”	ეფდალ მეტეორი	”	03.2019
129	მეტოლალური + ატრაზინი	პრიმექსტრა გოლდი	ჰ	12.2017
130	მეფენოქსამი	აპრონ იქს ელი 350	ფთმ	09.2015
131	მეფენოქსამი+ტებუკონაზოლი	სერტიკორი	”	11.2017
132	მეფენოქსამი+სპილენძის ოქსიქლორიდი	რიდომილ გოლდ პლიუსი	ფუნგ	09.2015
133	მიკლოტეტანილი	ნიმბუსი 24 ეკ	”	05.2017
134	მინერალური ზეთი	ტრინოლი-2	ი	06. 2018
		ჰექტოლინეუმი	“	09.2018
	“	კორუმ იაზლიგ იაგი	“	10.2014
	“	აგრომინერალ ოილი	“	07.2015
	“	ეფდალ სუნოლი	”	02.2018



135	მცპა მცავე	ხვასტოუსი	3	12.2014
136	ნიკოსულფურონი	სამსონი 40 სკ	3	10. 2014
	“	ნიკოში	“	12.2018
	“	ელიმინატორი	“	06.2018
	“	ნიკოფურონი	“	12.2014
	“	ნიკოგანი	“	12.2015
	“	ვოიაჟი	”	11.2015
	”	სულფონი	”	09.2016
	”	იკანოსი 40 ზდ	”	12.2016

	”	სამსონი ექსტრა 6 ზდ	”	01. 2017
--	---	---------------------	---	----------

	”	მილადარი	”	12.2017
	”	ფულსპიდი	”	02.2018
	”	ეფდალ ალსონი	”	03.2018
	”	ნიკოში პლიუსი	”	03.2018
	”	სანსტეპი	”	05.2019
137	ნიკოსულფურონი+ტიფენსულფურონ-მეთილი	დუბლონი გოლდი	”	12.2017
138	2.4 დ (ამინის მარილები)	დიამინი	3	10. 2014
	”	ბესტ ამინი 500	”	02.2018
139	2.4 დ (დიმეთილამინის მარილი)	2.4 დ დიმეთილამინის მარილი	3	12. 2014
	“	ჰექტაფერმინი	“	12.2018
	”	ფენიქსი 60 წხ	”	11.2016
	”	ფენიქს გოლდი 720	”	11.2017
		პაიამინი	”	05.2019
140	2.4დ (2 ეთილჰექსილეთერი)	ლენტემული დ	3	12. 2014
	”	ესტერონი 600 ეკ	”	08.2016
	“	ამილინი	“	12.2014



141	2,4-დ-2-ეთილჰექსილის ეთერი +ფლორამსულამი	ბალერინა	„	12. 2017
	„	ეფდალ ულტრამიქსი	„	03.2019
142	2,4 დ მჟავა მცირედ აქროლადი ეთერების სახით	ლევირატი	3	11.2015
143	2,4დ (მჟავა)	ეფდალ დიმეტრინი	„	04.2018
144	2,4დ (მჟავა)+ დიკამბა	გოლიაფი	„	12.2017
145	2,4 დ (მჟავა)+დიკამბა (მჟავა)	დიკოპურ ტოპი	“	10.2018
146	2,4 დ (დიმეთილამინის მარილი) + დიკამბა	ვალსამინი	3	11. 2015
147	2,4 დ (დიმეთილამინის მარილი) + დიკამბა (დიმეთილამინის მარილი)	ამინოპელიკ სუპერი	3	12.2015
148	ოქსამილი	ვიდატი	6	11. 2015
149	ოქსიფლუორფენი	გალაქსი	3	07. .2014
	“	გალიგანი	“	03. 2015
	„	პაროქსიფენი	„	12.2016
	„	გოალი 2 ე	„	08,2016
	„	პექქსი	„	09.2016
	„	კოლტარი	„	10.2017
		ეფდალ ოქმოსტი	„	01.2019
150	პაკლოზტერაზოლი	ბონზი 004 სკ	ზრ	01.2019
151	პარაფინის ზეთი	სიპკამოლი ე	ი	02.2016
	„	ოვიპრონი 2000	„	06. 2016
		ინსექტიციდი ქეი	„	12.2018
		ეკო ოილ სპრეი	„	03.2019
152	პენდიმეტალინი	სტომპი	3	10. 2014
	„	ვალსატოპი	„	11. 2015
	“	სტომპი	“	12.2014
	“	პანდორა	“	12.2014
	“	პენდიგანი	“	03.2015
	„	სპონსორი 330 ე	„	07. 2016
	„	ჰერბიმატი	„	05. 2017
	„	პანდა	„	12.2017
		ეფდალ პენალინი	„	02.2019



153	პენკონაზოლი	ტოპაზი	ფუნგ	10. 2014
	”	პრეფექტო	”	06. 2018
	”	პინნაკლი	”	12. 2014
	“	პენ-ფორსი	“	12.2018
	“	კობუზი	“	07. 2014
	“	ტოპკონაზოლი	“	12.2014
	“	ეფექტი	“	12.2014
	”	პესოსი	”	10.2016
	”	ეფდალ პეკოზოლი	”	06.2017
	”	პენკილერი	”	03.2018
		ფულპასი	”	04.2018
	”	ერპლანტი	”	03.2019
154	პინოქსადენი	აქსიალი	ჰ	07. 2014
155	პირაკლოსტრობინი	რეტენგო	ფუნგ.	04.2017
156	პირაკლოსტრობინი+ტრიტიკონაზოლი	ინშურ პერფორმი	ფთშ	11. 2015
157	პირიდაბენი	სამმაიტი	ი	06.2018
	“	მაიტ კილერი	“	12.2014
	”	საფმაიტი	”	11. 2015
	”	ეფდალ პირდენი	”	03.2018
158	პირიმეთანილი	სკალა	ფუნგ	03.2019
	”	რიტმი	”	04.2018
159	პირიმიფოსმეთილი	აქტელიკი	ი	10. 2014
160	პროკუინაზიდი	ტალენდი	ი	05.2018
161	პრომეტრინი	გეზაგარდი	ჰ	10. 2014
	“	პრომოტრინი	“	12.2014
	“	პრომე გოლდი	“	05.2019
162	პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი	პრევიკური	ფუნგ	12. 2014
	“	ბოტრინი	”	12.2014
	“	პროპაკურ ნ	”	03.2015
		ეფდალ პროკარი	”	02.2019



163	პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი+მანკოცები	ტატბუ	ფუნგ	12. 2014
164	პროპარგეტი	ვალსარგეტი	ი	11. 2015
	“	საფმაიტი	”	11. 2015
	“	პროპაფექტი	”	02.2019
	”	ომიტი 570 წე	”	05,2016
	”	ომნუსი 57% ეკ	”	05.2017
	”	გოლდმაიტი	”	04.2018
	”	ეფდალ პრომიოთე	”	05.2018
165	პროპაზიზაფოპი	აგილი	ჰ	12.2015
166	პროპიკონაზოლი	ტილტუსტ	”	12.2014
	“	ბამპერი	”	03.2015
	“	პროპკონაზოლი	”	12.2017
167	პროპიკონაზოლი+ტრიადიმეფონი	ტი რეკსი	”	12.2017
168	პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლი	ალტო სუპერი	ფუნგ	12.2017
169	პროპინები	ანტრაკოლი	”	12. 2014
	“	ანტრაკოლი ბლაუ	”	12.2017
	“	ფუნგიკინგი	”	12.2018
	“	საფაკოლი	”	12.2015
	”	პლაკოლი	”	04.2017
	”	კურონები	”	05.2017
	”	ფავორიტი	”	12.2017
	”	ალგაკოლი	”	01.2018
	”	ეფდალ პრონები	”	02.2018
		ფუნგიკინგი პლიუსი	”	03.2018
	”	მაიოზი	”	02.2019
170	პროპინები+ციმფოსანილი	საფაკოლი კომბი	ფუნგ	12.2015
	”	ენერკოლ კომბი	”	02.2018
	”	ეფდალ პიროქსომი	”	03.2019
171	პროსულფოკარბი-მეტრიბუზინი	არკადე	ჰ	12.2017
172	პროციმიდონი	სუმბილექსი	ფუნგ	07.2015
173	პროპექსადიონ-კალციუმი	რეგალისი	ზრ	02.2017



174	რიმსულფურონი	ტიტუსი	3	11. 2015
	“	მაისი	”	09. 2015
	“	პილოტი	”	12.2014
	“	რიმექსი	”	11.2015
	”	ესკუდო	”	12.2017
		ვიდაგერი	”	04.2018
175	რკინის (II) სულფატი	რკინის შაბიამანი	ფუნგ	11.2016
176	სპილენძიამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი	კოპერ-ქაუნთ-N	ფუნგ	02.2019
177	სპილენძის სულფატი	სპილენძის შაბიამანი	ფუნგ	03.2015
	“	კუპროქსატი	”	10. 2014
	“	კუპროსულფი	”	12.2014
	”	კუპერ სულფატ პენტაჰიდრატი	”	01.2017
	”	სპილენძის შაბიამანი	”	01.2017
178	სპილენძის სულფატი+ კალციუმ ჰიდროქსიდი	ბორდოს ნარევი	ფუნგ	11. 2015
	“	კუპერვალი	”	01.2019
	“	კუპერვალ ბლუ	”	12.2014
	“	ჰექტამ ბორდი	”	12.2018
	“	საფა ბორდოს ნარევი	”	09.2014
	“	ბორდოს ნარევი მაქსი	”	12.2014
	“	პოლტიგლია 20სფ	”	07.2015
	“	ბორდიფლო ნიუ	”	12.2015
	”	ბორდოს ნარევი 20%	”	12.2017
	”	ბლუ ბორდი დისპერს	”	01.2018

	”	პოლტიგლია მანიკა	”	01.2019
	”	ბორდი სალდეგო 20 სფ		01.2019



179	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი+მანკოცები	კუპროფიქს 30 დისპერს	ფუნგ	02.2017
180	სპილენძის სულფატი+კალციუმ ჰიდროქსიდი+ციმოქსანილი	კუპერტინ სუპერი	ფუნგ	12.2014
181	სპილენძის ქლორფანგი	კუპროფლო	„	03.2018
	„	სუპერკოპერი	„	06. 2018
	„	ნეორამი	„	11. 2015
	„	კუპერ მაქსი	„	12.2014
	„	ჰექტაშ ზაკირი	„	12.2018
	„	აზიგა პიკი	„	03.2015
	„	ოსსიქლორი	„	12.2015
	„	ოსსიქლორი 35 წზგრ	„	01.2019
182	სპილენძის ქლორფანგი + ციმოქსანილი	კურზატი რ	ფუნგ	10. 2014
	„	ექსპერტ ტიმი	„	12.2018
	„	ორდანი	„	12,2017
183	სპილენძის ქლორფანგი+მეტალაქსილი	მეტკუპერი	„	12.2017
184	სპილენძის ჰიდროქსიდი	კოსაიდი 2000	ფუნგ	10. 2014
	„	ჩემპიონი		10. 2014
	„	იროკო		01.2019
	„	ხელპი		11.2015
		პროტექტი		12.2016
		გარტი		12.2017

		ჰიდრომიკრონი		01.2019
--	--	--------------	--	---------

185	სპილენძის ჰიდროქსიდი+სპილენძის ქლორფანგი	აირონი	ფუნგ	04.2019
186	სპინოსადი A+Dსპინოზადი D	სპინტორი	ბი	11.2018
187	სპიროდიკლოფენი	ენვიდორი	ია	11. 2015
	„	სმაჩი	„	02.2018
188	სპირომესიფენი	ობერონი	ია	03.2019
189	სპიროტეტრამატი	მოვენტო	ი	02.2018



190	სპიროქსამინი+ ტებუკონაზოლი+ტრიადიმენოლი	ფალკონი	ფუნგ	12. 2014
-----	--	---------	------	----------

191	ტაუ-ფლუვალინატი	მავრიკი 240	ი	12.2015
-----	-----------------	-------------	---	---------

192	ტებუკონაზოლი	რაქსილი	ფთმ	12. 2014
	“	მისტევი	ფუნგ	01.2019
	“	როდოლიტი	ფთმ	12.2018
	“	როდოლიტ სუპერი	ფუნგ	12.2018
	“	როდოლიტ ექსტრა	”	12.2014
	“	ფოლიკური	”	12.2014
	“	ტეზიკური	ფთმ	07.2014
	“	გიზმო	”	07.2015
	”	რუბინი	”	10.2016
	”	ტეზუჯი	”	10.2016
	”	რაქსილი ულტრა	”	09.2016
	”	არბალეტი	”	12.2017
		ჯენსილი	”	12.2018
193	ტებუკონაზოლი+გოგირდი	უნეკორნი	”	12.2014

194	ტეზუფენპირატი	მასაი	ია	08.2018
-----	---------------	-------	----	---------

	”	ტალავი 20 სგ	”	07.2016
		ეფდალ ტეზუსაი	”	11.2018
	”	იაკუზა	”	03.2019
195	ტეტრაკონაზოლი	დომარკი	ფუნგ	10. 2014
196	ტეფლუტრინი	ფორსე 1,5გრ	ი	08.2016
197	ტეფლუბენზურონი	ნომოლტი	ი	02.2017
198	ტიფენსულფურონ-მეთილი	ფორმულა	”	12.2017
199	ტრიადიმენოლი	ტრიმაქსი	”	12.2017



200	ტრიადიმეფონი	ბაილეთონი	ფუნგ	12. 2014
	“	ვალსატონი	„	12. 2014
	„	აგსტარი 250 ეკ	„	03. 2017
		ბაისტარი	„	01.2019
201	ტრიასულფურონი	ლოგრანი	3	09. 2015
202	ტრიბენურონ-მეთილი	გრანსტარი	3	10. 2014
	“	ტრუი	„	12.2018
	“	გრანლენდი	„	07. 2014
	“	ექსპრესი	„	12.2014
	“	კორიდა	„	11.2015
203	ტრიტოსულფურონი+დიკამბა	სერტო პლიუსი	3	08.2016
204	ტრიფლოქსისტრობინი	ზატო	ფუნგ	12. 2014
	“	ტრიდე	„	12.2014
	„	რიფიტი	„	03.2017
		ეფდალ ლოქსბინი	„	01.2019
205	ტრიფლოქსისტრობინი+პირიმეტა ნილი	ზატო სტარი	ფუნგ	12.2017
206	ტრიფლოქსისტრობინი + ტეზუკონაზოლი	ნატივო წგრ 75	ფუნგ	12. 2017
207	ფამოქსადონი+ციმოქსანილი	იტერალი	ფუნგ	10. 2014
	„	ტანოსი	„	11.2017
208	ფენამიდონი+პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	კონსენტო	ფუნგ	03.2019
209	ფენამიფოსი	ეფდალ ფენოსი	6	02.2019
210	ფენმედიფამი+დესმედიფამი	ბელვედერი	3	12.2015
211	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი	ფურორე სუპერი	“	12.2018
	“	იგლ სუპერი	„	07.2014
212	ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი+ ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ-მექსილი	პუმა სუპერ 7.5	3	11. 2015
	„	ლასტიკ ექსტრა	„	12.2017
213	ფენპიროქსიმატი	ორდუსი	ია	03.2014
	„	რეინკალი	„	10.2016
214	ფენპექსამიდი	ტელდორი	ფუნგ	12.2017
215	ფიპრონილი	რეგენტი 20	ი	11. 2015
216	ფლუაზინამი	ნანდო	„	10.2017



217	ფლუაზიდოპ-პ-ბუთილი	ფუზილადი ფორტე	3	12.2017
	“	ბრეის სუპერი	”	09.2018
	“	ფლუენტი	”	12.2018
	“	ფლუზიტოპი	”	12.2014
	“	ტანგრა	”	12.2014
218	ფლუბენდიამიდი	ბელტი	ი	02. 2018
219	ფლუოპიკოლიდი+პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი	ინფინიტო	ფუნგ	03.2019
220	ფლუოპიკოლიდი+ალუმინის ფოსფატი	პროფაილერი	ფუნგ	03.2019
221	ფლუოპირამი+ტრიფლოქსისტრობინი	ლუნა სენსიშნ 500	ფუნგ	05. 2017
222	ფლუსილაზოლი	პანჩი	ფუნგ	10. 2014
	”	ოლიმპი	“	10.2014.
223	ფლუტრაფილი+თიბენდაზოლი	სუპერვინი	ფთშ	10.2017
224	ფლოკუმფენი	მტორმი	რ	12. 2014

225	ფოლპეტი+ ტრიადიმენოლი	შავიტი ფ	ფუნგ	03..2015
226	ფოლპეტი +ბენალაქსილი მ	ფანტიკი ფ	”	02.2015

227	ფორამსულფურონი+იოდოსულფურონ-მეთილ- ნატრიუმ+ანტიდოტი	მაისტერი	3	12.2017
228	ქლორანტრანილიპროლი	კორაგენი	ი	12.2018
229	ქლორანტრანილიპროლი+ლამბდაციპალოტრინი	ამპლიგო	ი	01.2019
230	ქლორმეკვატოქლორიდი	სტაბილანი	ზრ	12. 2014
	ქლორეტალონილი	ბრავო	ფუნგ	12.2017
	”	კორკონილი	”	10.2016
		საფკონილი 500 სკ	”	01. 2019
231	ქლორეტალონილი + სპილენძის ქლორფანგი	სკაინერი	”	06. 2017
232	ქლორპირიფოსი	დურსბანი	ი	02.2018
	”	ლოქსლი	”	09. 2015
	”	პიროელექტრა	”	02.2019
	”	სარბანი	”	09.2014
	”	პირინექსი	”	03.2015



	„	პირიფოსი	„	10. 2017
	„	ჰექტარ პრიზანი 240 უმშ	„	01. 2018
	„	ალბანი 25 სფ		02.2018
		სერბანი 4		04.2018
233	ქლორპირიფოსი+ბიფენტრინი	პირინექს სუპერი	ი	07.2018
234	ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი	ვალსარელი	ი	06. 2018
	„	ტენჩანტი	„	12. 2014
	„	ნურელ დ	„	02.2018
	„	გრანდ დ	„	07. 2014
	„	ციპი პლიუსი	„	11.2015
	„	ეფდალ ფოსტერი	„	06.2017
	„	ქლორპირიფიტი-აგრო	„	12.2017
	„	ბრენდ დ	„	12.2017
		სანსირო	„	03.2019
235	ქლორპირიფოს- ეთილი	პრიზანი-4	ი	09.2018
	„	პრიზანი 25 სფ	ი, ითშ	07.2015
236	ციკლოქსიდიმი	სტრატოს ულტრა	ჰ	05.2017
237	ციმოქსანილი+მეტალაქსილი	ზახისტი	ფუნგ	12.2017
238	ციმოქსალინი+სპილენძი	ეფდალ მოკანი	ფუნგ	01.2019
239	ცინები + სპილენძის ქლორფანგი	ციხომი ბლუ	ფუნგ	11. 2015
240	ციპერმეტრინი	არრივო	ი	10. 2014
	„	ვალსაციპერი	„	06. 2018
	„	ალექსანდერ	„	09. 2015
	„	რივომეტრინი	„	09.2018
	„	ციპერსანი	„	08.2017
	„	კრალი 250 ეკ	„	10.2016
	„	სიპერკორი	„	10.2016
	„	საირუქსი	„	02.2017
	„	ციპრინი	„	03.2018
	„	ეფდალ კიმეტრინი	„	03.2019



241	ციპროდინილი	ხორუსი	ფუნგ	09. 2015
	„	ციპრო პლიუსი	„	12.2016
	„	კორუსი	„	12.2017

		კარპაზი 50 წზგრ	„	01.2019
		სტრაფი	„	12.2018

242	ციპროდინილი +ფლუდიოქსანილი	სვიტჩი	ფუნგ	09. 2015
243	ცირამი	ზირაფლო	ფუნგ	12.2015
244	ცის-ვერბენოლი+იპსდიენოლი	აკუვიტი	ფერ	07.2016
245	ჰექსაკონაზოლი	ანტაკი	ფუნგ	11. 2015
246	პიბერელინის მჟავა	გოლდ გიბბი	ზრ	12.2015
	„	გიბგრო	„	01.2017
		ეფდალ ბლუგიბი	„	02.2019
247	პიმექსაზოლი	ტაგიანტი	ფუნგ	02. 2018

15. 30-ე მუხლს:

ა) დაემატოს 13¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

13 ¹ .	დიქლორანი	ბოტრანი	ფუნგ
-------------------	-----------	---------	------

ბ) დაემატოს 15¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

15 ¹ .	კარბოსულფანი	მარშალი 5 გ	ინ
-------------------	--------------	-------------	----

გ) დაემატოს 17¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

17 ¹ .	მეთირამი+სპილენძის დიჰიდროქსიდი	კაურიტილი	ფუნგ
-------------------	---------------------------------	-----------	------



დ) დაემატოს 22¹ პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

22 ¹ .	პიროპროუსიფენი	ადმირალი	ი
-------------------	----------------	----------	---

ე) 28-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28	სპილენძის ჰიდროქსიდი	კონსული	ფუნგ
„		პროტექტ-ოაშ 50 სფ	„

ვ) დაემატოს 28¹ -28² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28 ¹ .	ტეზუკონაზოლი	მისტიკი 250 ეკ	ფუნგ
28 ² .	ტეზუკონაზოლი+გოგირდი	ორიუსული	ფუნგ

ზ) დაემატოს 31¹ და 31² პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

31 ¹	ტრიფლუქსისტრობინი	ფლინტი	ფუნგ
31 ²	ტრიფლუქსისტრობინი+პირიმეტანილი	ფლინტ სტარი	ფუნგ

